

Менингит . Клинические СИМПТОМЫ.

Выполнила: студентка IV курса,
лечебного факультета, 20 группы
Багамаева З.С.

- Менингит - острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением мягкой мозговой и паутинной оболочек головного и спинного мозга.

Классификация:

- Бактериальные менингиты
 1. Гнойный (менингококковый, пневмококковый, стафилококковый, синегнойный)
 2. Серозные (туберкулезный, бруцеллезный, сифилитический, лептоспирозный, хламидийный)

Классификация:

- Вирусные менингиты
 1. Серозные (арбовирусные, энтеровирусные, паротитный, герпетический, гриппозный, парагриппозный, аденовирусный, микоплазменный)

Классификация:

- Грибковый менингиты (кандидамикозные, торулезный)
- Протозойные менингиты (амебный, токсоплазменный)

Пути инфицирования:

- Гематогенный путь
- Контактный путь
- Прямой путь (оперативное вмешательство, травма)

Синдромы:

1. Общемозговой
2. Менингеальный
3. Общеинфекционный
4. Ликворный

Менингиальный синдром

Симптомы, связанные с повышением чувствительности к раздражителям:

- Головная боль
- Рвота
- Общая кожная гиперэстезия
- Фонофобия, фотофобия
- Симптом Бехтерева

Менингиальный синдром

Симптомы, связанные с рефлекторным
тоническим напряжением мышц:

- Поза «легавой собаки»
- Ригидность затылочных мышц
- Симптом Кернига
- Симптомы Брудзинского
- Симптом Гиллена



Симптом Кернига

Невозможность
пассивного
разгибания ноги,
предварительно
согнутой под прямым
углом в
тазобедренном и
коленном суставах.



Симптом Брудзинского



При пассивном приведении головы к груди в положении пациента лежа на спине происходит непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах



Менингиальный синдром

Симптомы, возникающие у детей раннего возраста:

- Симптом подвешивания Лессажа
- Симптом «треножника»
- Симптом Фанкони
- Симптом Мейтуса
- Симптом « Поцелуя в колено»
- Напряжение и выбухание большого родничка

Общеинфекционный синдром

- Продромальный период (общее недомогание, повышение температуры, астения, утомляемость)
- Нейротоксический синдром (нарушение функций ЦНС, ССС, дыхательной системы, выделительной системы)

Ликворный синдром

1. Клеточно-белковая диссоциация
 - Нейтрофильный плеоцитоз (с пониженным содержанием глюкозы)
 - Лимфоцитарный плеоцитоз (с нормальным содержанием глюкозы)
 - Лимфоцитарный плеоцитоз с пониженным содержанием глюкозы)
2. Белково-клеточная диссоциация
 - Опухоли
 - Острая и хроническая полирадикулопатия



Стрептококк



Спасибо за внимание