



# «Ферменты»

Ильясов Ибрагим 10 Б

# Ферменты

*Ферменты* - это белковые вещества, играющие очень важную роль в различных биохимических процессах в организме.


Они необходимы для переваривания пищевых продуктов, стимуляции деятельности головного мозга, процессов энергообеспечения клеток, восстановления органов и тканей.

Функция каждого из ферментов уникальна, т.е. каждый фермент активизирует только один биохимический процесс.

В связи с этим в организме существует очень огромное количество *ЭНЗИМОВ*.

## Свойства ферментов

### ● Селективность и ИХ (избирательность действия)



Опре, Активатор вращать  
только данный тип субстратов в определенных  
реакциях и условиях.


# ● Высокая каталитическая активность

Добавка незначительной концентрации фермента ускоряет превращение субстрата в  $10^8 - 10^{12}$  раз.

# ● Стабильность

Сохраняет каталитическую активность

# ● Специфичность




## ● Зависимость от температуры

Многие ферменты обладают наибольшей эффективностью при температуре человеческого тела, т.е. приблизительно при этом

Человек погибает при более низких и более высоких температурах не столько из-за того, что его убила болезнь, а столько из-за того, что перестают действовать ферменты, а следовательно прекращаются обменные процессы, которые и определяют существование организма.

## ● Зависимость от pH среды

Ферменты наиболее эффективно действуют на субстрат при строго определенной среде раствора.



Важным свойством является то, что ферменты находятся в **тканях и клетках в неактивной форме** (проферменте).

Классическими его примерами являются неактивные формы пепсина и трипсина. Существование неактивных форм ферментов имеет большое биологическое значение. Если бы пепсин вырабатывался сразу в активной форме, то пепсин "переваривал" стенку желудка, т. е. желудок "переваривал" сам себя.

# Ферменты

В зависимости от того, какие виды реакций организма катализируют ферменты, они выполняют различные функции.

Чаще всего они подразделяются на две основные группы: **пищеварительные и метаболические.**

Пищеварительные ферменты выделяются в желудочно-кишечном тракте, разрушают питательные вещества, способствуя их абсорбции в системный кровоток.

Метаболические ферменты катализируют биохимические процессы внутри клеток.

# Пищеварительные ферменты

Различают три основные категории таких ферментов:  
**амилаза, протеазы, липаза.**

**Амилаза** расщепляет **углеводы** и находится в слюне, панкреатическом секрете и в содержимом кишечника. Различные виды амилазы расщепляют различные **сахара**.

**Протеазы**, находящиеся в желудочном соке, панкреатическом секрете и в содержимом кишечника, помогают переваривать **белки**.

**Липаза**, находящаяся в желудочном соке и панкреатическом секрете, расщепляет **жиры**.



# Классификация ферментов

На Международном биохимическом съезде было принято, что ферменты должны классифицироваться по типу реакции и катализируемой ими.

В названии фермента обязательно присутствует **название субстрата**, т. е. того соединения, на которое воздействует данный фермент, и окончание **-аза**. (Аргиназа катализирует гидролиз аргинина и т.д.)

По этому принципу все ферменты были разделены на 6 признаков.


# Классификация ферментов

1. **Оксидоредуктазы** - это ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции, например каталаза:



2. **Трансферазы** - ферменты, катализирующие перенос атомов или радикалов.


3. **Гидролазы** - ферменты, разрывающие внутримолекулярные связи путем присоединения молекул воды, например фосфатаза:



# Классификация ферментов

**4.Лиазы** - ферменты, отщепляющие от субстрата ту или иную группу без присоединения воды, негидролитическим путем.

- Например: отщепление карбоксильной группы декарбоксилазой:





**5.Изомеразы** - ферменты, катализирующие превращение одного изомера в другой называются:

глюкозо-6-фосфат  $\rightarrow$  глюкозо-1-фосфат

**6.Синтазы** - ферменты, катализирующие реакции синтеза.

# Амилаза



Амилаза, расщепляя крахмал и другие углеводы, обеспечивает переваривание углеводов пищи. Из организма амилазу выводят почки вместе с мочой (аммиак). Наиболее богаты амилазой поджелудочная и слюнные железы. Амилаза секретируется в кровь из этих органов. Плазма крови человека содержит  $\alpha$ -амилазы 2-х типов: **панкреатическую (Р-тип)**, вырабатываемую поджелудочной железой и **слюнную (S – тип)**, продуцируемую слюнными железами. Амилолитической активностью обладают клетки печени, кишечника, почек легких. В физиологических условиях амилаза сыворотки крови состоит на 40% из панкреатической и на 60% из слюнной амилазы.

С диагностической точки зрения наиболее информативным является определение панкреатической амилазы, на активность, которой в крови приходится до 30% , а в моче-до 70% от общей амилолитической активности.

а - Амилаза и ее активность зависит от возраста. Отмечается низкая активность амилазы в слюнной железе у 14 недельного плода, с возрастом она увеличивается, по достижении 5 –ти летнего возраста достигает величин, характерных для взрослых.

Панкреатическая амилаза в сыворотке детей до 3 - х месяцев не обнаруживается, появляется позднее и достигает величины, характерной для взрослых к 10-15 годам.

У людей разного пола существенных различий в активности амилаз не выявлено.

Амилолитическая активность сыворотки крови днем выше, чем ночью во время сна. Выделение амилазы днем в 1,5 раза выше чем ночью. Отличается содержание амилазы в сыворотке крови и выделение с мочой в течение дня, поэтому определять её активность в суточной моче.

В клинической лабораторной практике распространены две группы методов исследования активности альфа-амилазы в биологических жидкостях:

- 1. Сахарифицирующие, основанные на определении образующихся из крахмала сахаров по редуцирующему действию глюкозы и мальтозы.
- 2. Амилокластическое, основанные на определении остатка нерасщепленного крахмала по его реакции с йодом. Молекулы декстринов, имеющие 30 гексозных остатков, дают с йодом синюю окраску, молекулы, имеющие 8-10 остатков - красную, молекулы, состоящие из 4-5 остатков, окраски не дают.

Определение активности амилазы в сыворотке крови и мочи в КДЛ, проводится с целью дифференциальной диагностики острого и хронического панкреатита.



- Увеличение активности амилазы более чем в 10 раз:


При остром панкреатите активность амилазы в крови и моче увеличивается в 10-30 раз. При этом гиперамилазурия наступает позже, чем гиперамилаземия, но держится дольше, необходимо повторное исследование активности амилазы мочи на протяжении первых 1 - 3-х суток заболевания.

- Увеличение активности амилазы в 5-10 раз:

При перитоните, остром аппендиците, непроходимости кишечника и другие состояния «острого живота», острая почечная недостаточность с олигурией.

- Увеличение активности менее чем в 5 раз:

При хроническом панкреатите и раке поджелудочной железы активность амилазы в моче и крови может остаться в норме или подняться незначительно. Поражение слюнных желез, (камни, эпидемический паротит)



## **Уровень активности амилазы в норме.**

- -в сыворотке 25 - 220  
МЕ/Л или 8-32 ЕД
- -в моче 10 - 490  
МЕ/Л или 16-64 ЕД

# Применение ферментов

Ферменты используют для смягчения кожи в кожевенной промышленности.

Ферменты входят в состав стиральных порошков, отбеливателях, зубных паст.



В медицине ферменты имеют диагностическое значение – определение отдельных ферментов в клетке помогает распознаванию природы заболевания их используют для замещения недостающего фермента в организме.



# Применение ферментов


Ферменты получили широкое применение в легкой, пищевой и химической промышленности, а также в медицине.

В пищевой промышленности ферменты используют при приготовлении безалкогольных напитков, сыров, консервов, колбас, сосисок, копченостей.

В животноводстве ферменты используют при приготовлении кормов.

Ферменты используют при изготовлении фотоматериалов.

Ферменты используют при обработке овса и конопли.



## Примеры использования ферментов в промышленности

| фермент                            | промышленность | использование   |
|------------------------------------|----------------|---|
| Амилазы<br>(расщепляют<br>крахмал) | Пивоваренная   | Осахаривание содержащегося в солоде крахмала  |
|                                    | Текстильная    | Удаление крахмала, наносимого на нити во время шлихтования  |
|                                    | Хлебопекарная  | Крахмал - глюкоза. Дрожжевые клетки, сбраживая глюкозу, образуют углекислый газ, пузырьки которого разрыхляют тесто и придают хлебу пористую структуру. Хлеб лучше поджаривается и дольше не черствеет. |