

СТОЛБНЯК

Выполнила: Бляблина Анна
Группа 30СД17

Столбняк


- это острое инфекционное заболевание , обусловленное воздействием на организм экзотоксина столбнячной палочки с преимущественным поражением нервной системы, характеризующееся тоническими и судорожными сокращениями поперечно - полосатых мышц.

Клиника

Инкубационный период длится около 1-2 недели

- ⦿ Болезнь начинается остро, на фоне хорошего самочувствия, но могут предварять общие симптомы – вялость, раздражимость, усталость.
- ⦿ Первый ключевой симптом столбняка – это тризм жевательных мышц (судорожное их напряжение с очень затрудненным открыванием рта). В начале болезни такой симптом выявляется врачом при помощи особых приемов, затем он возникает самопроизвольно.

Клиника



- Сардоническая улыбка из-за спазма мимических мышц,
- Дисфагия (трудности при глотании) из-за спазматического сокращения мышц глотки и пищевода,
- Поражение мышц сверху вниз, особенно выраженное в мышцах-разгибателях,
- Ригидность мышц затылка с запрокидыванием головы, чрезмерное разгибание позвоночника с прогибанием дугой и выпрямлением конечностей
- Нарушается дыхание с поражением диафрагмы и межреберных мышц
- Возникают выраженные боли в мышцах,
- Тонические судороги от любых раздражителей (свет, звук, прикосновение) с лихорадкой, потливостью, слюноотделением и спазмом мышц промежности с трудностями физиологических отправлений,

Профилактика столбняка

Введение АС (столбнячного анатоксина)

0,5-1,0 мл в/м

Введение ПСС (противостолбнячной сыворотки)

Проводится в 3 этапа:

- 1) В/к проба с разведённой 1:100 сыворотки
0,1 мл в сгибательную поверхность предплечья
- 2) Подкожно ввести 0,1 неразведённой сыворотки
- 3) В/м вводится оставшаяся доза

Лечение

Общие принципы:

- Хирургическая обработка раны;
- Создание полного покоя;
- Нейтрализация токсина;
- Снятие или уменьшение судорожного синдрома;
- Предупреждение осложнений
- Поддержание сердечно-сосудистой деятельности .

Уход за больным

1. Больной помещается в отдельную затемнённую палату ,где исключается возможность попадания внешних раздражителей (шум ,свет);
2. Больному запрещается покидать постель;
3. Устанавливается круглосуточное наблюдение;
4. Рекомендуется питание жидкими продуктами(молоко, бульоны и т.д)

Спасибо за внимание !