

Модуль 2. Инфаркт миокарда. Медицинские аспекты.

#### ЧЕМ ОПАСЕН ИНФАРКТ?

Большинство смертей от инфаркта происходит в течение первого часа от первых его проявлений.

Из всех больных с инфарктом до прибытия в больницу доживает лишь половина.

Из попавших в больницу еще треть умирает до выписки из-за развития смертельных осложнений.

После инфаркта на его месте на всю жизнь остается рубец — своеобразный шрам на сердечной мышце. Сократительная способность миокарда снижается и развиваются симптомы сердечной недостаточности. Это чревато для больного снижением или полной потерей трудоспособности.


#### В ТВОИХ РУКАХ СПАСТИ ЖИЗНЬ

В большинстве случаев человеку можно спасти жизнь и предотвратить развитие тяжелых последствий от инфаркта!

Для этого необходимо знать признаки инфаркта миокарда, чтобы своевременно вызвать «Скорую помощь».



### ЧТО ТАКОЕ ИНФАРКТ?



#### ИНФАРКТ МИОКАРДА –

это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения. При этом пораженная часть мышцы отмирает.

### ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА:



- интенсивная сжимающая/давящая боль за грудиной (кинжальная, раздирающая, жгучая, «кол в грудной клетке»);
- боль может отдавать в руку, шею, спину, челюсть слева или область лопаток;
- боль не проходит после приема нитроглицерина и длится более 15 минут;
  - боль может сопровождаться резкой слабостью, бледностью кожных покровов, обильным холодным потом, чувством страха, учащением пульса, резкими колебаниями артериального давления (давление может быть как повышенным, так и пониженным).

# ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ

NHWYDVTV



ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ

## ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ





# БОЛЬ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА

## ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ

NHWVDVTV



# ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ БОЛЕЕ 15 МИНУТ

#### ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ



ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ



БОЛЬ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС ТЬ БОЛИ БОЛЕЕ 15 МИНУТ

# СРОЧНО 3ВОНИТЕ У n3 (П) 1 n3

# ДОВРАЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

#### До прибытия врача необходимо принять самостоятельные меры:

- 1.Посадите пострадавшего.
- 2.Откройте окно, чтобы поступал свежий воздух.
- 3.Снимите или расстегните стесняющую одежду.
- 4.Дайте 1 таблетку нитроглицерина (0,5 мг) под язык и, если боль не проходит через 3-5 минут, можно дать вторую таблетку нитроглицерина.
- 5.Дайте 250 мг (½ таблетки) аспирина, которую пациент должен разжевать во рту.

#### ПОМНИТЕ!

Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артериях сердца и остановить гибель клеток – 6 часов.

Чем раньше Вы вызовете «Скорую помощь», тем эффективнее будет лечение и меньше тяжелых последствий у больного после инфаркта!



# БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!