



Модуль 2. Инфаркт миокарда. Медицинские аспекты.

ЧЕМ ОПАСЕН ИНФАРКТ?

Большинство смертей от инфаркта происходит в течение первого часа от первых его проявлений.

Из всех больных с инфарктом до прибытия в больницу доживает лишь половина.

Из попавших в больницу еще треть умирает до выписки из-за развития смертельных осложнений.

После инфаркта на его месте на всю жизнь остается рубец — своеобразный шрам на сердечной мышце. Сократительная способность миокарда снижается и развиваются симптомы сердечной недостаточности. Это чревато для больного снижением или полной потерей трудоспособности.

В ТВОИХ РУКАХ СПАСТИ ЖИЗНЬ

В большинстве случаев человеку можно спасти жизнь и предотвратить развитие тяжелых последствий от инфаркта!

Для этого необходимо знать признаки инфаркта миокарда, чтобы своевременно вызвать «Скорую помощь».




03



103




ЧТО ТАКОЕ ИНФАРКТ?



ИНФАРКТ МИОКАРДА –

это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения. При этом пораженная часть мышцы отмирает.

ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА:



- интенсивная сжимающая/давящая боль за грудиной (кинжальная, раздирающая, жгучая, «кол в грудной клетке»);
- боль может отдавать в руку, шею, спину, челюсть слева или область лопаток;
- боль не проходит после приема нитроглицерина и длится более 15 минут;
- боль может сопровождаться резкой слабостью, бледностью кожных покровов, обильным холодным потом, чувством страха, учащением пульса, резкими колебаниями артериального давления (давление может быть как повышенным, так и пониженным).

ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА




**ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ
ЗА ГРУДИНОЙ**

ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА



**БОЛЬ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
ПОСЛЕ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА**

ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА



**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ
БОЛЕЕ 15 МИНУТ**


ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ



**ИНТЕНСИВНАЯ
БОЛЬ
ЗА ГРУДИНОЙ**



**БОЛЬ НЕ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ
ПОСЛЕ ПРИЕМА
НИТРОГЛИЦЕРИНА**



**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС
ТЬ БОЛИ
БОЛЕЕ 15 МИНУТ**

СРОЧНО ЗВОНИТЕ



03



103

ДОВРАЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

До прибытия врача необходимо принять самостоятельные меры:

- 1.Посадите пострадавшего.
- 2.Откройте окно, чтобы поступал свежий воздух.
- 3.Снимите или расстегните стесняющую одежду.
- 4.Дайте 1 таблетку нитроглицерина (0,5 мг) под язык и, если боль не проходит через 3-5 минут, можно дать вторую таблетку нитроглицерина.
- 5.Дайте 250 мг ($\frac{1}{2}$ таблетки) аспирина, которую пациент должен разжевать во рту.

ПОМНИТЕ!

Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артериях сердца и остановить гибель клеток – 6 часов.

Чем раньше Вы вызовете «Скорую помощь», тем эффективнее будет лечение и меньше тяжелых последствий у больного после инфаркта!

СРОЧНО

03  **03**  **03**

**БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!**