



**Модуль 2. Инфаркт миокарда.  
Медицинские аспекты.**

# ЧЕМ ОПАСЕН ИНФАРКТ?

Большинство смертей от инфаркта происходит в течение первого часа от первых его проявлений.

Из всех больных с инфарктом до прибытия в больницу доживает лишь половина.

Из попавших в больницу еще треть умирает до выписки из-за развития смертельных осложнений.

После инфаркта на его месте на всю жизнь остается рубец — своеобразный шрам на сердечной мышце. Сократительная способность миокарда снижается и развиваются симптомы сердечной недостаточности. Это чревато для больного снижением или полной потерей трудоспособности.

# В ТВОИХ РУКАХ СПАСТИ ЖИЗНЬ

**В большинстве случаев человеку можно спасти жизнь и предотвратить развитие тяжелых последствий от инфаркта!**

**Для этого необходимо знать признаки инфаркта миокарда, чтобы своевременно вызвать «Скорую помощь».**




**03**



**103**




# ЧТО ТАКОЕ ИНФАРКТ?



## **ИНФАРКТ МИОКАРДА –**


это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения. При этом пораженная часть мышцы отмирает.

# ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА:



- интенсивная сжимающая/давящая боль за грудиной (кинжальная, раздирающая, жгучая, «кол в грудной клетке»);
- боль может отдавать в руку, шею, спину, челюсть слева или область лопаток;
- боль не проходит после приема нитроглицерина и длится более 15 минут;
- боль может сопровождаться резкой слабостью, бледностью кожных покровов, обильным холодным потом, чувством страха, учащением пульса, резкими колебаниями артериального давления (давление может быть как повышенным, так и пониженным).

# ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА




**ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ  
ЗА ГРУДИНОЙ**

# ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА



**БОЛЬ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ  
ПОСЛЕ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА**


# ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА



**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ  
БОЛЕЕ 15 МИНУТ**




# ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ



**ИНТЕНСИВНАЯ  
БОЛЬ  
ЗА ГРУДИНОЙ**



**БОЛЬ НЕ  
ПРЕКРАЩАЕТСЯ  
ПОСЛЕ ПРИЕМА  
НИТРОГЛИЦЕРИНА**



**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС  
ТЬ БОЛИ  
БОЛЕЕ 15 МИНУТ**

# СРОЧНО ЗВОНИТЕ



**03**



**103**

# ДОВРАЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

**До прибытия врача необходимо принять самостоятельные меры:**

- 1.Посадите пострадавшего.
- 2.Откройте окно, чтобы поступал свежий воздух.
- 3.Снимите или расстегните стесняющую одежду.
- 4.Дайте 1 таблетку нитроглицерина (0,5 мг) под язык и, если боль не проходит через 3-5 минут, можно дать вторую таблетку нитроглицерина.
- 5.Дайте 250 мг (  $\frac{1}{2}$  таблетки) аспирина, которую пациент должен разжевать во рту.

## **ПОМНИТЕ!**

**Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артериях сердца и остановить гибель клеток – 6 часов.**

**Чем раньше Вы вызовете «Скорую помощь», тем эффективнее будет лечение и меньше тяжелых последствий у больного после инфаркта!**

# **СРОЧНО**

**03**  **03**  **03**

**БЛАГОДАРЮ ЗА  
ВНИМАНИЕ!**