



Тема:

Себорея. Вугрі.
Новоутворення шкіри.
Колагенози. Пухирцеві
дерматози



Актуальність теми:

Міхурцеві захворювання, червоний вовчак, склеродермія, колагенози - це хвороби з важким перебігом, які можуть закінчуватись летально. Вміння розбиратися у діагностиці цих дерматозів, правильно доглядати за такими хворими, надавати їм невідкладну медичну допомогу – одне з обов'язкових умов професійної підготовки медичного працівника.



План:

- 1.** Клінічні прояви і лікування колагенозів.
- 2.** Діагностика і лікувальні особливості пухирцевих дерматозів.
- 3.** Себорея, діагностичні критерії.
- 4.** Новоутворення шкіри, клініка, діагностика та лікування.
- 5.** Особливості перебігу злоякісних захворювань шкіри.



Колагенози-

захворювання сполучної тканини, до яких відносяться:



**Червоний
вовчак**



**Склеродермі
я**



**Червоний вовчак –
дерматоз, при якому
уражається сполучна тканина.
Протікає у двох формах :**





Клінічні


прояви:



1. Ерітема з інфільтрацією і набряком;
2. Гіперкератоз з утворенням сіруватих лусочок, які щільно прилягають одна до

3. Атрофія з гіперпігментацією;





Основний клінічний СИМПТОМ




LE

метелика»

1.Симетричність

на обох щоках і спинці





Лікування :


1. Нестероїдні протизапальні препарати (Індометацин, Диклофенак, Наклофен)





2. Антималарійні препарати (Делагіл, Плаквеніл)





3. Імуностимулятори (Декаріс, Тималін)



При важкому перебігу:

гормони

1. Преднізолон

2. Гідрокортизон


3. Дексаметазон





Місцево:

гормональні мазі




1. Дермовейт

2. Целестодерм

3. Синафлан

4. Преднізолон





Склеродермія

захворювання, яке характеризується дифузним або вогнещевим ущільненням і склерозуванням шкіри, в результаті ураження сполучних волокон.

Етіологія: не встановлена



Клінічні прояви: 1 стадія –

набряку, шкіра напружена, блискуча із синюшно-фіолетовим відтінком відтінком.





2 стадія - склерозу

Шкіра набуває воскоподібного, жовтого вигляду,
Обмежена рухомість суглобів, зникає міміка;



Шкірний покрив перетворюється на твердий панцир, відчуття стягування шкіри;
Шкіра немов «натягнута на кістки»





3 стадія атрофія

витончення шкіри та підшкірно-жирової
клітковини





Лікування:

1. Антибіотики з пробіотиками






2. Ферменти і гормони:

Лідаза, Ронідаза, Преднізолон,
Гідрокортизон






3. Вітаміни групи А, В, С





Місцево:

гормональні мазі




1.Дермовейт

2.Целестодерм

3.Синафлан

4.Преднізолон





Масаж, гімнастика, лікувальні грязі





Пухирцеві дерматози

1. Пухирчаткі

2. Герпетичформний

дерматит Дюрінга



Пухирчатка

захворювання, яке має
злоякісний перебіг, первинним
елементом
якого є пухир.



Форми:

1. Звичайна;
2. Вегетуюча;
3. Меліоруюча;
4. Себорейна;



Клінічні прояви:

1. На шкірі і слизових оболонках множинні пухирці і пухирі;
2. Ерозивні ділянки мокнуття;





Характерний симптом Нікольського



Лабораторно:
акантолітичні клітини
Тцанка в пухирях





Лікування:

1. Гормональна терапія

1. Преднізолон 2. Гідрокортизон 3.
Дексаметазон





2. Антибактеріальна терапія

1. Цефалоспорины;

2. Пеніциліни;



<http://zaharolvet.uaprom.net>



3. Препарати Калію

1. Калій Оротат;
2. Аспаркам;
3. Панангін;



4. Нестероїдні протизапальні:

1. Диклофенак;
2. Ібупрофен;
3. Індометацин;





5. Вітаміни групи А, В, С





Анілінові барвники та примочки з дезрозчинами (Розчин бриліантовий зелений, Фукорцин, Фурацилін)



Місцево:

гормональні мазі :

- 1) Дермовейт
- 2) Целестодерм
- 3) Преднізолон
- 4) Синафлан;
- 5) Бетасалік



АПТЕКА 9-1-1



Герпетиформний дерматит

Дюрінга

Клінічні прояви:

- 1.**Доброякісне протікання
- 2.**Поліморфізм висипки (вузлики, пухирці)
- 3.**Симптом Нікольського негативний
- 4.**Клітини Тцанка відсутні
- 5.** Слизові оболонки не уражаються;






Загальне лікування:

Антигістамінні препарати

Тавегіл, Супрастин, Діазолін,
Цетрин, Лоратадин, Едем,
Кларитин.






Препарати сульфонового ряду

Діаміндіфенілсульфон Нестероїдні

протизапальні

- 1. Ібупрофен;
- 2. Диклофенак;






Антималарійні препарати (Делагіл, Плаквеніл)





Вітаміни групи А, В, С





Анілінові барвники та примочки з дезрозчинами (Розчин бриліантовий зелений, Фукорцин, Фурацилін)



3. Місцево:

гормональні мазі :

- 1) Дермовейт
- 2) Целестодерм
- 3) Преднізолон
- 4) Синафлан;
- 5) Бетасалік



АПТЕКА 9-1-1





4. Мазі з антибіотиками:

1. Тетрациклінова мазь;
2. Еритромицинова мазь;
3. Олететрінова мазь;
4. Левоміколь;





Себорея — це підвищений вміст шкірного сала, обумовлений гіперфункцією сальних залоз.

Суха себорея Жирна себорея





Суха себорея

Клінічні прояви:

- 1. На обличчі шелушіння;**
- 2. Сухість шкіри;**
- 3. Волосся ламке та сухе;**





Жирна себорея

Клінічні прояви:

- 1.** На обличчі камедони;
- 2.** Волосся жирне, липке та склеєне;





Вугрі (**acne vulgaris**)

Причини:

- 1.** Гормональний дисбаланс (підвищення естрогенів у дівчат, андрогенів у хлопців);
- 2.** Дія професійних чинників або хімічних речовин;
- 3.** Порушення обмінних процесів;
- 4.** Хронічні захворювання ШКТ;



Локалізація:

шкіра спини, грудної клітки,
обличчя



Клінічні форми:

- 1. Звичайні;**
- 2. Шаровидні;**
- 3. Індуративні;**
- 4. Абсцедуючі;**



Звичайні вугрі

Клініка:




- 1.** Вузлики
- 2.** Гнійничок
- 3.** Ерозія
- 4.** Кірка
- 5.** Пігментація
або рубчик



Шаровидні вугрі

Клініка

шаровидні вугрі більших розмірів за звичайні на фоні інфільтрації





Індуративні вугрі

Клініка:

- 1. Злиті між собою шаровидні вугрі;**
- 2. Бугриста поверхня**





Абсцедуючі вугрі

Клінічні прояви:



1.Вузлики;

2.Гнійничок;

3.Ерозія;

4.Виразка з

некротичним

дном;

5.Рубець;



Загальне лікування:

Антибактеріальна терапія

1. Еритроміцин
2. Кліндаміцин
3. Далацин



Місцеве лікування

Мазі з

антибіотиками:



1. Тетрациклінова мазь;
2. Еритроміцинова мазь;
3. Олететрінова мазь;
4. Левоміколь;



Новоутворення шкіри

Лейкоплакія

Клінічні прояви:

1. Має доброякісний перебіг;
2. Ороговіння слизової щік, язика та статевих органів
3. Білуваті плями різної форми і величини
4. Шелушіння плям;
5. Гіперкератоз із сухістю;
6. Тріщини та виразки;





Лікування:

1. Хірургічне видалення в межах здорової тканини;
2. Кріодеструкція;



Хвороба Боуена

Локалізація

м'яке і тверде піднебіння, язичок, язик

Клінічні прояви:

1. Доброякісне протікання
2. Утворюється плямисто-вузликовий утвір **1** см. в діаметрі.
3. Прогресує повільно.
4. Утворюються ерозії.
5. Розвивається явище вегетації.






Родимки

Локалізація

по всьому тілу

Клінічні прояви:

1. Багаточисленні плями різних відтінків коричневого кольору;
2. В центрі родимки волосина;



Ознаки злякiсного

переродження

**Швидке
збільшення
родимки
протягом 1
року**

**Перехід
забарвлення
в сірувато-
чорне**

**Ущільненн
я родимки**

**Гіперемовани
й вінчик
навколо
родимки**

**Поколюванн
я в ділянці
родимки**



Вигляд родимок при злякiсних переродженнях



норма



меланома



Лікування:

хірургічне видалення при
травматизації





Ліпома

пухлина із скупченням жирових клітин в підшкірно-жировій клітковині.







Лікування: хірургічне видалення





Злоякісні новоутворення шкіри





Плоскоклітинний рак

Локалізація:

губи, язик, обличчя, статеві органи, ділянка очей

Клініка:

- 1.** Щільний вузлик кулястої форми діаметром до **1 см**;
- 2.** Гладка, а пізніше бугриста поверхня;
- 3.** Болюча, кровоточива, неправильної форми виразка на вузлику, яка при прогресуванні захворювання стає неболюча;
- 4.** Збільшені регіонарні лімфовузли.



Плоскоклітинний рак





Лікування:

хірургічне оперативне в межах
здорової тканини





Базаліома

Локалізація:

верхня половина обличчя

Клінічні прояви:


1. Папули **0,2-0,3**см червонуватого кольору
2. Ерозія
3. Виразка з м'ясистим дном, яка кровоточить
4. Лімфовузли не збільшені
5. Немає метастазів





Лікування:

1. Хірургічне оперативне;
2. Променева терапія;



Надія ніколи, навіть
у найскладніших
життєвих
ситуаціях, не
залишає людину...

і якщо є **віра** в краще
і любов до життя,
то все неодмінно
налагодиться !

