Формула Стирлинга

$$\boxed{n! \sim \sqrt{2\pi n}\frac{n^n}{e^n}}$$

Пример 2468: $$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n} \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n \sqrt{2\pi n}\frac{n^n}{e^n}}{n^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{2\pi n} - \text{расходится}$$

Проверяем необходимый признак: $$\lim_{n\to\infty} \sqrt{2\pi n} = \infty \neq 0$$

Д/З: $$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!}$$ **Ответ: расходится**

Контрольная работа
Вариант №0

Задача 1: Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

$y = (x-2)^3$, $y = 4x - 8$, $y > 0$.



План:

1) **Рисунок**
2) **Точки пересечения**
3) **Интеграл**

Точки пересечения:

$$\begin{cases} y = (x-2)^3 \\ y = 4x - 8 \end{cases} \Rightarrow (x-2)^3 = 4(x-2) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x - 2 = 0 \\ (x-2)^2 = 4 \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2 \\ x^2 - 4x = 0 \end{array}\right. \Rightarrow \begin{array}{l} x = 2 \\ x = 0 \\ x = 4 \end{array}$$

$$S = \int_2^4 (4x - 8 - (x-2)^3)dx = 2x^2 - 8x - \frac{(x-2)^4}{4}\Bigg|_2^4 = 24 - 16 - 4 = 4$$

Задача 2: Вычислить несобственный интеграл: $\int\limits_{1}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{1+x^6}$

$$\int\limits_{1}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{1+x^6} = \lim_{b\to+\infty} \int\limits_{1}^{b} \frac{x^2 dx}{1+x^6} = \left| \begin{matrix} t = x^3 \\ dt = 3x^2 dx \end{matrix} \right| == \lim_{b\to+\infty} \frac{1}{3} \int\limits_{1}^{b} \frac{dt}{1+t^2} =$$

$$\lim_{b\to+\infty} \frac{1}{3} arctgt \Big|_{1}^{b} = \lim_{b\to+\infty} \frac{1}{3} arctgx^3 \Big|_{1}^{b} = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{12}$$

Задача 3: Исследовать на абсолютную и условную сходимость знакопеременный ряд. Указать используемый признак сходимости:

а) $$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 \ln n} - \text{сходится абсолютно}$$

Шаг 1. Рассматриваем ряд из модулей:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln n} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \text{сходится}$$

б) $$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{4n-1} - \text{расходится}$$

Шаг 1. Рассматриваем ряд из модулей: $$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{4n-1}$$

Проверяем необходимый признак:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{4n-1} = \frac{1}{4} \neq 0 - \text{расходится}$$

Задача 4: Найти объем тела, образованного при вращении кривой вокруг оси OX: $y = 1 - x^2$ $(-1 \le x \le 1)$

$$V_x = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_{-1}^{1} (1 - x^2)^2 dx = 2\pi \int_0^1 \left(1 - 2x^2 + x^4\right) dx =$$

$$= 2\pi \left(x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right) \Bigg|_0^1 = 2\pi \left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) = \frac{16\pi}{15}$$

Задача 5: Исследовать на сходимость несобственный интеграл:

$$\int_{1}^{+\infty} \frac{(x^2+1)dx}{2x^5+x+18}$$

$$\int_{0}^{1} \frac{(x^2+1)dx}{2x^5+x} \sim \int_{0}^{1} \frac{dx}{x} - \text{расходится}$$

$$\int_{1}^{+\infty} \frac{(x^2+1)dx}{2x^5+x+18} \sim \int_{1}^{+\infty} \frac{x^2dx}{x^5} = \int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x^3} - \text{сходится}$$

Максимальная степень	Минимальная степень
$\int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \alpha > 1, \text{сходится} \\ \alpha \leq 1, \text{расходится} \end{cases}$	$\int_{0}^{1} \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \alpha \geq 1, \text{расходится} \\ \alpha < 1, \text{сходится} \end{cases}$

Задача 6: Исследовать на сходимость ряд с положительными членами. Указать используемый признак сходимости:

а) $$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 6^n}{n!} - \text{сходится}$$

Применим признак Даламбера:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^3 6^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{n^3 6^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{6}{n+1} \left(\frac{n+1}{n}\right)^3 = 0 < 1$$

б) $$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2} \frac{1}{3^n} - \text{сходится}$$

Применим радикальный признак Коши:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2} \frac{1}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{1}{3} = \frac{e}{3} < 1$$

Задача 7: Найти область сходимости степенного ряда:

а) $$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{n\sqrt{n}}$$

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|}$$

1) Найдем радиус сходимости по формуле Даламбера:

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\sqrt{n+1}}{n\sqrt{n}} = 1$$

для $x \in [-5; -3]$ ряд сходится.

для $x \in (-\infty; -5) \cup (-3; +\infty)$ ряд расходится.

2) Исследуем ряд при x=-3

x=-3 : $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3+4)^n}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} - \text{сходится}$$

3) Исследуем ряд при x=-5

x=-5 : $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5+4)^n}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{3/2}} - \text{сходится абсолютно}$$

Задача 7: Найти область сходимости степенного ряда:

б) $$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}\left(\frac{x-1}{3}\right)^n$$

1) Найдем радиус сходимости по формуле Даламбера:

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+2)3^{n+1}}{(n+1)(n+1)3^n} = 3$$

для $x \in (-2; 4)$ ряд абсолютно сходится.

для $x \in (-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$ ряд расходится.

2) Исследуем ряд при x=4

Применим необходимый признак:

x=4 : $$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}\left(\frac{4-1}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0 \text{ – расходится}$$

2) Исследуем ряд при x=-2

x=-2 : $$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}\left(\frac{-2-1}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \text{ – расходится}$$

Задача 8: Найти область сходимости функционального ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^{4x-x^2}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = \begin{cases} \propto > 1, \text{ сходится} \\ \propto \leq 1, \text{ расходится} \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^{4x-x^2}} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^{4x-x^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-1+4x-x^2}}$$

$$-1+4x-x^2 > 1 \Rightarrow x^2-4x+2 < 0 \Rightarrow \left(x-2-\sqrt{2}\right)\left(x-2+\sqrt{2}\right) < 0$$

для $x \in \left(2-\sqrt{2}; 2+\sqrt{2}\right)$ ряд сходится.

для $x \in \left(-\infty; 2-\sqrt{2}\right] \cup \left[2+\sqrt{2}; +\infty\right)$ ряд расходится.

Задача 9: Разложить в ряд Тейлора функции в окрестности точки $x_0 = 2$. $\boldsymbol{f(x) = e^{x^2-4x+1}}$

$$\boxed{\boldsymbol{f(x) = e^{x^2-4x+1}} \quad \text{по } (\mathbf{x-2})}$$

$$\mathbf{1)} \quad \boldsymbol{e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}} \qquad \boldsymbol{x} \in (-\infty; +\infty)$$

$$\boldsymbol{e^{x^2-4x+1} = e^{x^2-4x+1+3-3} = e^{(x-2)^2-3} = \frac{e^{(x-2)^2}}{e^3} = \frac{1}{e^3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left((x-2)^2\right)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^{2n}}{e^3 n!}}$$

Задача 10: Найти длину дуги кривой: $\boldsymbol{\rho = 7(1 - sin\varphi)}$

$$\rho^{/} = -7cos\varphi \qquad -\frac{\pi}{3} \le \varphi \le \frac{\pi}{3}$$

$$\boxed{1 - sin\varphi = (cos\frac{\varphi}{2} - sin\frac{\varphi}{2})^2}$$



$$l = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{\rho^2 + \rho^{/2}} d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{49(1 - sin\varphi)^2 + 49cos^2\varphi} d\varphi =$$

$$= 7\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1 - 2sin\varphi + sin^2\varphi + cos^2\varphi} d\varphi = 7\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{2 - 2sin\varphi} d\varphi =$$

$$= 7\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{(cos\frac{\varphi}{2} - sin\frac{\varphi}{2})^2} d\varphi = 7\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} |cos\frac{\varphi}{2} - sin\frac{\varphi}{2}| d\varphi = 7\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (cos\frac{\varphi}{2} - sin\frac{\varphi}{2}) d\varphi$$

$$= 14\sqrt{2}\left(sin\frac{\varphi}{2} + cos\frac{\varphi}{2}\right)\Big|_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} = 14\sqrt{2}\left(sin\frac{\pi}{6} + cos\frac{\pi}{6} - sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) - cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = 14\sqrt{2}$$

Пример 2516: $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{e^{n\sin x}}$$

1) **Ряд существует на всей действительной оси.**

2) **Проверяем необходимый признак:**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{e^{n\sin x}}=\begin{cases}\infty, & x\epsilon(\pi+2\pi k;2\pi+2\pi k)\\ 1, & x=\pi k\\ 0, & x\epsilon(0+2\pi k;\pi+2\pi k\end{cases}$$

Для $x\in[\,\pi+2\pi k;2\pi+2\pi k]$ ряд расходится.

3) **Рассматриваем ряд из модулей:**

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{e^{n\sin x}}$$



Применим признак радикального Коши :

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|f_n|}=$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{e^{n\sin x}}}=\frac{1}{e^{\sin x}}<1\Rightarrow e^{\sin x}>1\Rightarrow \sin x>0$$ – ряд сходится

Для $x\in(\,0+2\pi k;\pi+2\pi k)$ ряд абсолютно сходится.