

ГЕЛЬМИНТОЗЫ

Что это такое и с чем их едят

Шо это такое

- Глисты – это паразитические черви различной формы и размеров. Они живут в организме диких и домашних животных, а некоторые и в теле человека. Глисты питаются готовыми питательными веществами, выделяют яды, которые отравляют организм хозяина.

Наиболее часто человек заражается:

- Острицами
- Аскаридами
- Цепнями



Паразитолог: “Целый сверток глистов и паразитов выскочит, если выпить утром...”

Читать

Острицы – мелкие чуть более сантиметра, тонкие круглые черви, серо-белого цвета. Заболевание, возникающее при заражении ими, называется энтеробиоз. Заражение этими глистами происходит при попадании яиц паразита через рот с плохо вымытыми овощами и фруктами, с невымытых рук, после контакта с почвой или зараженными домашними животными.



Аскариды – крупные круглые черви, красно-желтого цвета, во взрослом состоянии достигающие длины до 40 см. Заболевание, вызываемое ими, называется «аскаридоз». Развитие паразита начинается после попадания яиц через рот в кишечник, вылупившиеся личинки, проникают через кишечную стенку в кровь. Проходя по пути миграции через стенку кишечника, печень в легкие, личинки аскарид оказывают травмирующее действие на ткани, вызывая кровоизлияния и воспалительные изменения в них. К концу своего пути, в легких, личинка аскариды вырастает до 2-х мм. В легких личинка проникает в альвеолы, из них в бронхи и вместе с мокротой попадает вновь в желудочно-кишечный тракт, где и развивается во взрослую особь.



Свиной и бычий цепень – сходные по строению ленточные черви длиной до 6 метров. У человека паразитируют в тонком кишечнике. Заражение происходит при употреблении мяса свиней или крупного рогатого скота, содержащего одну из промежуточных форм цепня – финны (белесые пузырьки размером до 0,5 см). В тонком кишечнике зародыш прикрепляется к стенке и через три месяца превращается в половозрелого паразита



Признаки

- Признаки Люди, заражённые глистами, - быстрее утомляются, - становятся рассеянными, - появляются головные боли, - тошнота, - рвота, - может развиться малокровие.

**ОНИ БОЯТСЯ ЭТОГО,
КАК ОГНЯ...**



Переносчики

Переносчики Распространению яиц глистов способствуют мухи Заражение чаще всего происходит через грязные руки, немытые фрукты и овощи, при общении с бродячими и домашними животными Заразиться цепнями можно через плохо проваренные или не прожаренные мясо и рыбу Заражённый глистами человек нередко становится источником заражения других людей

Профилактика и первая помощь

- Профилактика и первая помощь
Соблюдать гигиену питания Употреблять в пищу хорошо проваренное и прожаренное мясо и рыбу Бороться с мухами Для лечения необходимо обратиться к врачу, точно соблюдать его предписания

Профилактика

- Профилактика Мытьё рук после посещения туалета, а также перед едой является обязательным Необходимо систематически стричь ногти, так как под ними чаще всего задерживаются яйца паразитических червей. Источником заражения глистными заболеваниями может явиться недоваренная рыба, плохо прожаренное мясо.