

**Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**



**Кафедра акушерства и гинекологии № 2**

**Лекция на тему:**

# **НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

**К.МЕД.Н., ДОЦЕНТ  
ПРУГЛО А.К.**

**г.Симферополь 2019г.**

**Невынашивание беременности** – это  
самопроизвольное прерывание ее в  
различные сроки от зачатия до 37  
недель.


Частота этого осложнения варьирует от 10 до 25 % и  
не имеет тенденции к снижению. Приблизительно  
15 % распознанных беременностей заканчиваются  
невынашиванием беременности.

# КЛАССИФИКАЦИЯ

(согласно Протоколу “Привычное невынашивание беременности (привычный выкидыш)” от 03.11.2008 № 624

- ✓ *ранний спонтанный аборт* - спонтанное (самопроизвольное) прерывание беременности до 11 недель + 6 дней;
- ✓ *поздний спонтанный аборт* - с 12 недель до 21 недели + 6 дней;
- ✓ *преждевременные роды* - с 22 недель до 36 недель + 6 дней

# ЭТИОЛОГИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ



## *Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез*

## *Осложнения текущей беременности*

*АбORTы, виДимые*

*Преждевременные роды*

*Генитальный инфантилизм*

*Нарушения менструальной функции*

*Эндометриты, цервициты  
Эндометриоз, миома*

*Предлежание плаценты*

*Преждевременная отслойка плаценты*

*Истмико-цервикальная недостаточность*

*Тяжелый гестоз*

*Антифосфолипидный синдром*

## *Экстрагенитальная патология*

## *Социально-экономические факторы*

*Инфекционные болезни во  
время беременности*

*Стрессовые ситуации*

*Эндокринные болезни*

*Большие физические  
нагрузки*

*Тяжелые соматические  
болезни*

*Плохие материально-  
бытовые условия*

*Слишком молодой  
или пожилой возраст*

# **ПЛОДОВЫЕ ФАКТОРЫ**

*Генетические (хромосомные)  
нарушения*

*Внутриутробное  
инфицирование*

*Резус-конфликт*

*Многоводие*

*Многоплодие*

*Неправильное предлежание*

# **ЭТИОЛОГИЯ**

**Механизмами прерывания беременности при гормональных расстройствах являются:**

- недостаточная подготовка эндометрия к беременности,
- неполноценная имплантация плодного яйца,
- повышенная возбудимость миометрия,
- первичная плацентарная недостаточность во II триместре
- нарушения развития плода.

# **Анатомические причины:**

Истмико - цервикальная недостаточность, развивающаяся в результате травм шейки матки во время родов, абортов или каких - либо воздействий на шейку матки, является основной причиной невынашивания беременности (до 40 %) во II триместре;

В 10 - 15 % случаев причиной невынашивания являются пороки развития матки (внутриматочная перегородка, двурогая, седловидная, однорогая или двойная матка); в 5 - 6 % - опухоли матки и придатков (миома матки, киста, кистома яичника), послеоперационный рубец на матке.

# Генетические причины

Около 50 % репродуктивных потерь принадлежит хромосомным и геномным мутациям, а эмбрионы с хромосомными аномалиями составляют до 73 % среди абортов ранних сроков.

При грубых хромосомных нарушениях (три- и тетраплодия) беременность прерывается в сверхранние и ранние сроки (до 3 - 4 недель).

Тем самым осуществляется естественный отбор, более 95 % всех возникающих мутаций заканчивается прерыванием.

# Инфекционные заболевания матери

Латентно и хронически протекающие заболевания мочеполовых органов (хламидиоз и мико - уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, листериоз, токсоплазмоз), вирусные заболевания (грипп и парагрипп, цитомегаловирус, краснуха, вирус простого герпеса) и другие.

При этом возможно непосредственное поражение плодного яйца (плаценты, оболочек и эмбриона) трансплацентарно или восходящим путем, тератогенное (до 9-12 недель) воздействие гипертермии и интоксикации матери с последующей гибелью эмбриона.

# Нарушение иммунных реакций организма женщины

Плод является наполовину чужеродным для матери организмом, потому что половину своих белков он наследует от отца.


Созревание зародыша происходит при условии полной гетерозиготности матери и плода по антигенам тканевой совместимости. При беременности возможно развитие сенсибилизации матери к тканевым антигенам плода. Кроме того, в невынашивании беременности может иметь значение аутоиммунное состояние, обусловленное появлением аутоантител к хорионическому гонадотропину (ХГЧ).

# КЛАССИФИКАЦИЯ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ

**Самопроизвольные аборты  
(спонтанные выкидыши)**

**Раннего срока  
(до 12 недель)**


**Позднего срока  
(до 22 недель)**



**Преждевременные роды (ПР)**

**Очень ранние ПР  
(22-27 недель)**

**Ранние ПР  
(28-33 недели)**




**Собственно ПР  
(34-37 недель)**

# САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ АБОРТ (ВЫКИДЫШ)

Самопроизвольные выкидыши происходят в 15—20 % всех желанных беременностей.

Считают, что самопроизвольные выкидыши в I триместре служат проявлением естественного отбора. Подтверждением этого является тот факт, что при исследовании abortного материала находят от 60 до 80 % эмбрионов с хромосомными аномалиями.



- ◎ Для самопроизвольного прерывания беременности характерно появление сокращений матки, приводящих к отслойке плодного яйца и изгнанию его из полости матки.



**Плодное яйцо в полости матки**

# Угрожающий аборт

Угрожающий аборт — повышение сократительной активности матки, плодное яйцо сохраняет связь со стенкой матки.

Клинически проявляется ощущением тяжести или несильными тянущими болями внизу живота и в области крестца. При позднем аборте могут отмечаться схваткообразные боли. Кровяные выделения отсутствуют. Шейка матки не укорочена, внутренний зев закрыт, тонус матки повышен.



# **ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА**

- ◎ При наличии клинических признаков угрожающего аборта в сроке беременности менее 8 недель и неблагоприятных признаков прогресса беременности проведение терапии, направленной на сохранение беременности не рекомендуется.
- ◎ Если пациентка настаивает на проведении терапии, направленной на сохранение беременности, она должна быть соответствующим образом проинформирована о :
  - высоком удельном весе хромосомных аномалий на данном сроке беременности, которые являются наиболее достоверной причиной угрозы ее прерывания;
  - низкую эффективность любой терапии.
- ◎ Причиной 70% спонтанных абортов, которые происходят на сроке до 12 недель и 30%, которые происходят на сроке после 12 недель, есть хромосомные аномалии (наследственные или приобретенные).
- ◎ Максимальное количество хромосомных аномалий элиминируется путем спонтанного аборта в сроке 4-5 недель.
- ◎ На основе полученной информации пациентка принимает решение относительно целесообразности применения терапии, направленной на сохранение беременности.
- ◎ Решение беременной фиксируется подписанием информированного согласия.

- При угрозе прерывания беременности в сроке больше 8 недель и при отсутствии признаков неблагоприятного прогноза применяются мероприятия, направленные на сохранение и поддержку развития беременности:

- **Постельный режим** и воздержание от половой жизни(по данным разных исследований эффективность умеренная).

- **Спазмолитическая терапия, Седативная терапия**(Нет доказательств эффективного и безопасного применения с целью предупреждения прерывания беременности).



- Препараты прогестерона

- **Показание для применения прогестерона:**


- Наличие в анамнезе двух и большеспонтанных выкидышей в первом триместре (привычный выкидыш)

- Доказанная до беременности недостаточность лuteиновой фазы


- Вылеченное бесплодие

- Беременность в результате вспомогательных репродуктивных технологий






Угрожающий аборт



Начавшийся аборт



Неполный аборт


# **Начавшийся аборт**

При начавшемся aborte на фоне усилившимся сокращений матки происходит частичная отслойка плодного яйца от ее стенки.


Усиливаются боли, схваткообразного характера, и появляются кровяные выделения из влагалища.

Плодное яйцо отслаивается на небольшом участке, поэтому величина матки соответствует сроку беременности.


**Угроза выкидыша**



**Неизбежный  
выкидыш**




**Неполный выкидыш**



# Лечение

Лечение угрожающего выкидыша должно быть комплексным:

- постельный режим,
- седативные средства,
- спазмолитики
- иглоукалывание,
- электроаналгезия,
- противоболевая чрескожная стимуляция.



- При позднем угрожающем выкидыше (после 20 нед) используют В-миметики, индометацин.
- При начавшемся аборте лечение в основном такое же, как и при угрожающем.
- Назначают этамзилат (дицинон), аскорутин. В случае недостаточности желтого тела в I триместре назначают гестагены, у беременных с гипоэстрогенией возмож но применение эстрогенов. При подтекании околоплодных вод беременность сохранять нецелесообразно.



## ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ

Роды (схватки, приводящие к открытию шейки матки), начавшиеся до 37 недель, считаются преждевременными. Факторы риска включают ПРПО, поражения матки, инфекции, несостоятельность шейки матки, преждевременные роды в анамнезе, многоплодную беременность, патологию плаценты. Диагноз ставится на основе клинических данных. Выявляют причины и по возможности их устраниют.

## *Классификация ПР в соответствии со сроком гестации:*

- до 28 недель (27 недель 6 дней включительно) - очень ранние ПР, 5% всех преждевременных родов. При этом новорожденные являются глубоко недоношенными, имеют экстремально низкую массу тела (до 1000 г), выраженную незрелость легких (хотя в ряде случаев профилактика РДС эффективна). Прогноз для них крайне неблагоприятный. Показатели заболеваемости и смертности новорожденных крайне высокие.
- 28-30 недель 6 дней - ранние ПР, около 15% всех преждевременных родов. Для новорожденных (тяжелая недоношенность) характерна очень низкая масса тела (до 1500 г), легкие плода незрелые, с помощью кортикостероидов удается добиться их ускоренного созревания. Исход родов для плода и постнатальный прогноз более благоприятны.
- 31-33 недели 6 дней - преждевременные роды, около 20% всех преждевременных родов. У новорожденных имеет место недоношенность средней степени.
- 34-36 недель 6 дней - поздние преждевременные роды, 70% всех преждевременных родов. Легкие плода практически зрелые и не требуют введения средств для стимуляции созревания (сурфактанта). Инфекционная заболеваемость новорожденных, родившихся в 34-37 недель беременности, значительно ниже, чем родившихся в более ранние сроки. Пролонгирование беременности при этом сроке не оказывает существенного влияния на показатели смертности новорожденных

Преждевременные роды могут быть спровоцированы:

- преждевременным разрывом околоплодных оболочек;
- хориоамнионитом;
- восходящей внутриутробной инфекцией (обычно из-за стрептококков группы В);
- многоплодной беременностью;
- аномалиями плода или плаценты,
- патологиями матки;
- пиелонефритом
- некоторыми заболеваниями, передающимися половым путем (ЗПП).

# ДИАГНОСТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Диагностика преждевременных родов связана с определенными трудностями, так как отсутствует специфическая симптоматика.

Диагноз начала преждевременных родов может быть уточнен с помощью трансвагинального УЗИ с измерением длины шейки матки или определения фибронектина плода в шеечно-влагалищном секрете. В целях определения риска преждевременных родов используют доступные в нашей стране экспресс-тест-системы для определения фосфорилированного протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (ГТСИФР-1) в цервикальном секрете [32, 33, 34, 35]. Указанные методы повышают диагностическую точность и снижают риск ятрогенных осложнений, так как препятствуют гипердиагностике преждевременных родов.

Для диагностики активных преждевременных родов важны два показателя: регулярные схватки (не менее 4 за 20 мин наблюдения) и динамические изменения шейки матки (укорочение и сглаживание).

Степень раскрытия шейки матки является индикатором прогноза эффективности токолиза. При раскрытии зева более 3 см (признак активной фазы первого периода) токолиз скорее всего будет неэффективен.

# БЫСТРЫЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ

Клиническими проявлениями быстрых преждевременных родов являются частые болезненные продолжительные схватки.

Сократительная деятельность матки при быстрых преждевременных или осложненных чрезмерно активной родовой деятельностью родах характеризуется рядом особенностей: скорость раскрытия шейки матки превышает 0,8–1 см/ч в латентную и 2,5–3 см/ч в активную фазу родов, частота схваток 5 за 10 мин и более, интенсивность схваток более 5 кПа, маточная активность 2100 АЕ (александрийские единицы) в латентную и 2430 АЕ в активную фазу родов.

С целью прогнозирования быстрых преждевременных родов необходимо при поступлении пациенток проводить запись токограмм в течение 10–20 мин для оценки интенсивности схваток, а также производить повторное влагалищное исследование через 1 ч для определения скорости раскрытия шейки матки.

Наиболее эффективными средствами для нормализации сократительной деятельности матки в родах являются ВВ-адреномиметики. Другие ингибиторы (индометацин, раствор магния сульфата) менее эффективны, и для реализации их действия требуется больше времени.

Использование токолитиков при ведении быстрых преждевременных родов способствует снижению скорости раскрытия шейки матки, более плавному течению родов и нормализации сократительной деятельности матки, что выражается в снижении частоты и интенсивности схваток, увеличении пауз между ними, наряду с отсутствием достоверного уменьшения длительности схваток.

# ВЕДЕНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПРИ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Средства, стимулирующие сокращения матки, следует вводить осторожно. Наиболее эффективным методом родостимуляции является сочетанное применение окситоцина (2,5 ЕД) и простагландина F2a (2,5 мг в 500 мл 0,9 % раствора натрия хлорида).

Их следует вводить, начиная с 5–8 капель в минуту. В дальнейшем дозу увеличивают каждые 10–20 мин на 4–5 капель до появления регулярных схваток с частотой 3–4 за 10 мин. После этого введение утеротонических средств прекращают и внутривенно вводят 0,9 % раствор натрия хлорида.

Если регулярная родовая деятельность в дальнейшем продолжается, то утеротонические средства используют для профилактики кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах. Если же родовая деятельность вновь ослабевает, то продолжают введение этих средств.

При возникновении слабости родовой деятельности во втором периоде родов можно использовать эндоназальное введение окситоцина. Для этого из ампулы, содержащей 5 ЕД окситоцина, набирают раствор в пипетку и вводят по 1–2 капле в каждую половинку носа через 20 мин.

# ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ДОРОДОВОМ ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Вероятность развития родовой деятельности при излитии околоплодных вод находится в прямой зависимости от гестационного срока: чем меньше срок, тем больше период до развития регулярной родовой деятельности (латентный период).

В пределах первых суток после преждевременного излития вод спонтанные роды в 26 % случаев начинаются при массе плода 500-1000 грамм, в 51% - при массе плода 1000-2500 грамм, в 81 % - при массе плода более 2500 грамм.

Пролонгирование беременности при сроке до 22 недель нецелесообразно из-за неблагоприятного прогноза для плода (ниже срока жизнеспособности) и высокой частоты гнойно-септических осложнений у матери. Рекомендуется прерывание беременности.

При сроке беременности 22-24 недель прогноз также неблагоприятен. Родители должны быть осведомлены, что дети, родившиеся до 24 недель, вряд ли выживут, а те, кто выживут, вряд ли будут здоровыми.

Выбор тактики ведения при ДИВ при недоношенной беременности должен быть оформлен в виде информированного согласия пациентки.

Одна из основных задач при поступлении пациентки с подозрением на отхождение вод - как можно более точно определить срок беременности, так как от этого зависит выбор тактики.

При сроке до 34 недель при отсутствии противопоказаний показана выжидательная тактика (В-За). Однако в последнее время появились данные о нецелесообразности пролонгирования беременности более 28 нед, которое не снижает частоту тяжелых неонатальных инфекционных осложнений.

# ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Первичная профилактика (вне беременности)

Рекомендуется:

- ограничение повторных внутриматочных манипуляций (выскабливание полости матки);
- информирование общественности о повышенном риске преждевременного рождения детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

## Вторичная профилактика (в период беременности)

Рекомендуется:

- внедрение антиникотиновых программ среди беременных (A-1а) [9]
- назначение вагинального прогестерона в капсулах беременным с короткой шейкой матки (10-25 мм) или с преждевременными родами в анамнезе

# АБОРТ В ХОДУ, НЕПОЛНЫЙ И ПОЛНЫЙ АБОРТ

**Плодное яйцо полностью отслаивается  
от стенки матки и опускается в ее  
нижние отделы**

## Аборт в ходу



- боль схваткообразного характера;
- кровотечение разной интенсивности;
- структурные изменения шейки матки .

### *Гинекологическое исследование:*

- Тело матки меньше предполагаемого срока беременности.
- Определяются регулярные схваткообразные сокращения миометрия.
- Возможно подтекание околоплодных вод в более поздние сроки беременности.
- Внутренний и наружный зевы раскрыты.
- Элементы плодного яйца находятся в канале ш.м., нижний его полюс может выступать во влагалище.

# НЕПОЛНЫЙ АБОРТ

Беременность прервалась, но в полости матки имеются задержавшиеся элементы плодного яйца. Отсутствие полноценного сокращения матки и смыкания ее полости приводит к продолжающемуся кровотечению. Чаще встречается с 12 нед. беременности, когда выкидыши начинается с излития околоплодных вод.

## ***Гинекологическое исследование:***

Матка меньше предполагаемого срока беременности, мягкой консистенции. Канал ш.м. раскрыт, обильные кровяные выделения из цервикального канала.

## ***Лечение:***

- Удаляют остатки плодного яйца
- Внутривенное вливание кровезаменителей; окситоцина с изотоническим р-ом (30 ЕД окситоцина/1000мл р-ра – 200мл/ч)
- Антибактериальная терапия

# ПОЛНЫЙ АБОРТ

Плодное яйцо полностью изгоняется из полости матки.  
Матка сокращается, кровотечение прекращается.

## **Лечение:**


- В ранние сроки – контрольное выскабливание, в более поздние сроки не производят.
- Антибиотики
- Кровезаменители



# НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВЫКИДЫШ

## Неразвивающаяся беременность

- Гибель эмбриона (до 9 недель) или плода на сроке до 22 недель беременности при отсутствии экспулсии продуктов зачатия из полости матки.
- Отставание размера матки от гестационного срока. Низкий уровень  $\beta$ -ХГЧ.



Неразвивающаяся  
беременность по  
типу гибели  
эмбриона. УЗИ

# ДИАГНОСТИКА

Оценка состояния пациентки и DS ставится на основе анализа жалоб, физикального осмотра и дополнительных клинических исследований. УЗИ должно быть выполнено как можно быстрее.

**Жалобы:** на кровяные выделения из половых путей, боли внизу живота и поясничной области, возникшие на фоне задержки менструации.

**Физикальное обследование:**

Температура, ЧСС, ЧДД, АД; обследование области живота

**Влагалищное исследование:**

*Осмотр при помощи зеркал:* источник и объем кровотечения, наличие продуктов зачатия в цервикальном канале;

**Бимануальное исследование:** консистенция и длина ш.м., состояние цервикального канала и внутреннего зева ш.м, величина матки, состояние и болезненность придатков, сводов влагалища.

# СЕПТИЧЕСКИЙ АБОРТ

При:

Криминальных вмешательствах

Длительном подтекании околоплодных вод

Наличии швов на шейке матки

Наличии спиралей в полости матки

## **Стадии распространения инфекции:**

- I. В процесс вовлечены эндометрий и миометрий
- II. В процесс вовлечены придатки
- III. Генерализованный перитонит и сепсис

## **Септический аборт**

- Прерывание беременности, сопровождающееся лихорадкой, ознобом, недомоганием, болями внизу живота, кровяными, иногда гноевидными выделениями из половых путей.
- Физикальное обследование: тахикардия, тахипноэ, дефанс мышц ПБС.
- Гинекологическое исследование: болезненная матка мягкой консистенции.
- Воспалительный процесс чаще всего вызван золотистым стафилококком, Гр- МО, Гр+ кокками. При отсутствии лечения возможна генерализация инфекции в виде сальпингита, локального/разлитого перитонита, септицемии.

## **Терапия**

Мониторинг жизненно важных функций

Антибиотики широкого спектра действия

Хирургическое вмешательство

**Привычное невынашивание — осложнение беременности, в основе которого лежат нарушения функции репродуктивной системы.**



# **Привычное невынашивание**

- Наличие в анамнезе у женщины подряд 3 и более самопроизвольных прерываний беременности в сроках до 22 нед.**

# ◎ Методы исследования

При ведении пациенток с привычным невынашиванием необходимо исследование репродуктивной системы супружеской пары вне беременности.



- При наступлении беременности осуществляют контроль за уровнем ХI и ТБГ, проводят УЗИ.
- Для профилактики осложнений рекомендуется выполнить иммуноцитотерапию лимфоцитами мужа (или донора, если супруги совместимы по HLA либо муж болел гепатитом).
- После введения лимфоцитов мужа в организме женщины увеличивается секреция белков и гормонов плаценты, в результате чего повышаются блокирующие свойства сыворотки крови беременной, исчезает угроза прерывания беременности и раннего токсикоза.

## Гиперандрогения

Пациенткам с гиперандрогенией во время беременности назначают дексаметазон. Дозу препарата подбирают индивидуально под контролем экскреции 17-КС. При высоком уровне дегидроэпиандростерона и нормальном уровне экскреции 17-КС — дексаметазон принимает только до 16 нед беременности. Если же экскреция 17-КС не нормализуется, то продолжительность приема дексаметазона увеличивается, иногда до 34—35 нед.

Перед отменой дексаметазона дозу препарата постепенно снижают.

Сроки беременности 13, 20—24 и 28 не являются критическими для пациенток с гиперандрогенией из-за начала продукции гормонов плодом.

В эти сроки необходимо оценить уровень экскреции 17-КС и уточнить дозу дексаметазона.

Для этих пациенток характерна функциональная истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), поэтому после 12 нед. беременности необходим контроль за состоянием шейки матки.



## ◎ Лечение истмико-

## **цервикальной недостаточности (ИЧН)**

Метод, предложенный В.Сценди (1961), заключается в следующем.

Шейку матки обнажают в зеркалах. С помощью мягких кишечных зажимов фиксируют переднюю губу шейки матки и вокруг наружного зева иссекают слизистую оболочку на ширину 0,5 см.



То же самое производят на задней губе шейки. После этого переднюю и заднюю губы шейки матки сшивают отдельными кетгутовыми или шелковыми швами.

Широкое применение нашла модификация



Любимовой—Мамедалиевой

(1978) — наложение двойного П-образного шва в области внутреннего зева

# Ушивание шейки матки по методу Сценди (1961)



# Двойной П-образный шов на шейку матки по методу А.И. Любимовой и Н.М. Мамедалиевой (1981)



# ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ АБОРТА В ХОДУ

- ◎ Срок беременности меньше 16 недель
- ◎ Проводят вакуум аспирацию или кюретаж стенок полости матки в ургентном порядке под адекватным обезболиванием и мероприятия, направленные на стабилизацию гемодинамики, в зависимости от объема кровопотери. Обязательное патогистологическое исследование удаленной ткани.
- ◎ Срок беременности больше 16 недель.
- ◎ После спонтанного изгнания продукта оплодотворения проводят вакуум-аспирацию или кюретаж стенок полости матки и мероприятия, направленные на стабилизацию гемодинамики в зависимости от объема кровопотери.
- ◎ В случае кровотечения под адекватным обезболиванием:

при наличии условий проводят эвакуацию содержимого матки (не ожидают спонтанного изгнания продукта оплодотворения) и мероприятия, направленные на стабилизацию гемодинамики в зависимости от объема кровопотери; при отсутствии условий - абдоминальное прерывание беременности.

- ◎ В случае необходимости и при отсутствии противопоказаний возможно использования утеротоников:
- ◎ окситоцина 10 ЕД в/м или в/в капельно в 500 мл изотонического раствора хлорида натрия со скоростью до 40 капель в минуту;
- ◎ эргометрина 0,2 мг в/м или в/в (в случае необходимости, возможно, повторить введение указанной дозы, максимальная суточная доза не больше 1 мг);
- ◎ мизопростол 800 мкг ректально.

# Характеристика недоношенного ребенка



- ◎ **Пропорции у недоношенного ребенка** – голова относительно большая и составляет 1/3 от длины тела. Конечности относительно короткие. Пупок расположен несколько выше над лоном.
- ◎ **Состояние кожи** – тонкая, морщинистая, темно-красного цвета, обильно покрыта сыровидной смазкой и пушком (*lanugo*). При значительной степени недоношенности на коже живота просматриваются сосуды разного калибра.
- ◎ **Подкожножировая клетчатка выражена слабо.** Соски и околососковые области грудных желез едва заметны. Ушные раковины плоские, легко деформируются, прижаты к голове.
- ◎ **Ногти тонкие**, у глубоконедоношенных детей не доходят до краев ногтевых лож.
- ◎ **Роднички черепа открыты.** Кости черепа на первых неделях жизни находят друг на друга, тонкие, податливые. Швы черепа в дальнейшем открываются.



# **Нервная система**

Анатомо-физиологическая незрелость нервной системы. Для недоношенных детей характерны

- ◎ **слабость и быстрое угасание физиологических рефлексов** (у глубоко недоношенных – включая сосательный и глотательный);
- ◎ **замедленная реакция на раздражения; несовершенство терморегуляции;**
- ◎ **мышечная гипотония.**

Реакция на раздражения отличается генерализованностью, слабостью активного торможения, иrrадиацией процесса возбуждения. Незрелость коры обуславливает преобладание подкорковой деятельности: движения хаотичны, возможны вздрагивания, трепет рук, клонус стоп. Повышенная проницаемость гематоэнцефалического барьера приводит к высокому риску развития билирубинового и инфекционного поражения ЦНС.



## Дыхательная система

Дыхание **поверхностное, аритмичное, ослабленное**; ЧДД - 28-76/мин, объем дыхания по сравнению с доношенными детьми снижен. Наблюдают недостаточное развитие альвеол, легочных сосудов, **сниженное содержание сурфактанта**, низкую растяжимость легких,

## ◎ Сердечно-сосудистая система

**Пульс у недоношенного лабилен, слабого наполнения, частотой 120-160 в минуту.** При глубокой недоношенности встречается пульс типа эмбриокардии.

**Артериальное давление у недоношенных - систолическое – 50-80 мм рт. ст., диастолическое -20-30 мм рт. ст.**

При инфекционных заболеваниях у недоношенных легко развивается недостаточность кровообращения, различные варианты кардиопатий.

## ◎ Желудочно-кишечный тракт

Для недоношенных характерен большой язык, отсутствие на лице жировых комочков Биша. В слюне отмечается низкое содержание лизоцима и высокая активность амилазы.

**Желудок недоношенного ребенка имеет малые размеры (2 мл/кг массы тела).** Характерно преобладание тонуса пилорического сфинктера над кардиальным.

Активность пищеварительных ферментов снижена.

Для кишечника характерна сниженная перистальтика, монотонный характер моторики, снижение секреции иммуноглобулинов и высокий уровень пептидаз.

Система желчевыведения имеет склонность к дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу и снижению продукции желчных кислот.

Стерильная фаза в кишечнике у недоношенных, как правило, продолжается 1-е сутки жизни, а фаза заселения удлиняется до 2 недель. Нормализация кишечной флоры занимает несколько месяцев.

## ● Иммунная система

Находится в состоянии супрессии.

Гуморальные защитные реакции обеспечиваются в основном материнскими антителами.

Система комплемента недостаточно активна, как и многие другие факторы неспецифического и специфического иммунитета.

Недоношенный новорожденный проявляет слабую резистентность к условнопатогенной, грамотрицательной флоре; склонность к генерализации процесса, септическим состояниям и высокую чувствительность к вирусным инфекциям, которые часто протекают малосимптомно.

- Оценка состояния ребенка по шкале Апгар была предложена для доношенного новорожденного, но эта шкала с успехом может быть использована и при недоношенности.
- По данным многих исследователей, состояние примерно 50 % детей с массой тела до 1500 г оценивают по шкале Апгар в 0—3 балла, в то время как при массе 3000 г такую оценку получают только 5—7 % новорожденных.

# Шкала Апгар

Признак	Число баллов		
	0	1	2
ЧСС	Не определяется	<100 в мин	>100 в мин
Дыхание	Отсутствует	Слабый крик, гиповентиляция	Громкий крик
Мышечный тонус	Атония	Слабое сгибание конечностей	Активные движения
Рефлекторная реакция	Отсутствует	Слабо выражена (grimаса)	Хорошо выражена (крик)
Цвет кожи	Бледный, цианотичный	Туловище розовое, конечности цианотичные	Розовый

◎ Для оценки функции дыхания в момент рождения и в последующие дни у новорожденных применяют шкалу Сильвермана, в соответствии с которой дыхательная функция новорожденного характеризуется:

- 1) движением грудной клетки и втяжением передней брюшной стенки на вдохе;
- 2) втяжением межреберий;
- 3) втяжением грудины;
- 4) положением нижней челюсти и участием крыльев носа в акте дыхания;
- 5) характером дыхания (шумное, со стоном).

Каждый из этих симптомов оценивают от 0 до 2 баллов по мере нарастания его тяжести.

Сумма баллов дает представление о функции дыхания у новорожденного: чем меньше эта сумма, тем менее выражены проявления легочной недостаточности

# **ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ:**

- ◎ Изучение анамнеза (менструальная, генеративная функция заболевания)
- ◎ Осмотр специалистов по показаниям (эндокринолога, иммунолога, генетика, нефролога, психотерапевта, ЛОР, терапевта, невролога)
- ◎ Бактериологическое, бактериоскопическое и вирусологическое обследование на урогенитальные инфекции
- ◎ Тесты функциональной диагностики (базальная температура), кольпоцитология
- ◎ Определение гормонов и их метаболитов по показаниям (половые гормоны, гипофиза и щитовидной железы в крови; экскреция ДЕАС, кортизолу, 17-КС 17- гидропрогестерона)
- ◎ УЗИ

- Состояние гипофиза (МРТ, RO -графия турецкого седла) по показаниям
- Иммунологическое обследование по показаниям (АВО и Rh антител; антитела к фосфолипидам, кардиолипинам p2 гликопротеида и фетальных антигенов, определения волчкового антикоагулянта)
- Антитела к хорионичному гонадотропину; антиспермальные и антиоварийные антитела по показаниям
- Генетическое обследование (кариотип супругов)
- Пренатальная диагностика
- Гистеросальпингография и гистероскопия по показаниям
- Гемостазиограмма Исследование системы гемостаза
- Определение состояния шейки матки

# ПРОФИЛАКТИКА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Всех женщин после самопроизвольного аборта и преждевременных родов берут на диспансерное наблюдение, включающее специальное обследование:

- целенаправленный сбор анамнеза;
- выяснение особенностей менструальной функции по тестам функциональной диагностики;
- гистеросальпингография;
- ультразвуковое сканирование;
- бактериологическое, вирусологическое, иммунологическое и генетическое исследование;
- лечение выявленных отклонений.

- Во время беременности выделяют группу риска по невынашиванию, намечают сроки и способы лечебно -профилактических мероприятий, санации очагов инфекции, создание оптимальных условий для развития беременности.
- Всех беременных с самопроизвольными выкидышами в анамнезе госпитализируют для обследования и лечения до проявления клинических признаков угрозы прерывания (за 2 недели до сроков предшествующих выкидышей).
- Следующую беременность можно планировать не ранее, чем через 1 год после выкидыша. Этот промежуток необходимо использовать для обследования и выявления причины выкидыша, лечения и укрепления организма.

# ПЕРЕНОШЕННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ



Переношенней  
считают  
беременность,  
продолжительность  
которой превышает  
42 недели (294 дня) и  
заканчивается  
рождением ребенка  
с признаками  
перезрелости




- Различают **истинное (биологическое)** перенашивание беременности и **мнимое (хрониологическое)** перенашивание, или **пролонгированную беременность.**
- Истинно переношенная беременность продолжается более 10-14 дней после ожидаемого срока родов (290-294 дня). Ребенок рождается с признаками перезрелости.
- Пролонгированная беременность продолжается более 294 дней и заканчивается рождением доношенного, функционально зрелого ребенка без признаков перезрелости.
- Частота перенашивания составляет 1,4-14%, в среднем 8%.

- **Перенашивание беременности** означает несвоевременное (запоздалое) возникновение родовой деятельности, при ее развитии часто наблюдаются нарушения сократительной активности матки, что ведет к увеличению числа оперативных вмешательств, к внутриутробному страданию плода и повышению перинатальной смертности.
- При **пролонгированной беременности** более правильно роды называть своевременными, а при истинном перенашивании – запоздалыми родами перезрелым плодом.

# ЭТИОЛОГИЯ

- Возраст старше 30 лет (первые роды)
- нарушение менструальной функции
- воспалительные заболевания либо инфекции женских половых органов
- эндокринная патология (низкое количество эстрогена)
- гормональная недостаточность плаценты
- Гестоз
- отсутствие родовой доминанты
- малое накопление в матке гликогена, аденоцитрифосфорной кислоты, катехоламинов
- пороки развития и нарушения в гипофизарно-надпочечниковой системе плода.



## **Главными патогенетическими моментами, перенашивания беременности, являются:**

- Функциональные сдвиги в центральной нервной системе,
- Вегетативные нарушения
- Эндокринные нарушения (нарушение выработки эстрогенов, прогестерона, кортикоидов, окситоцина, некоторых тканевых гормонов (ацетилхолин, катехоламины, серотонин, кинины, гистамин, простагландины), ферментов, электролитов и витаминов).
- Определенное значение имеет также состояние плаценты и плода.



## **Клиническая картина:**

При истинном перенасыщении беременности более 41 недели часто наблюдается:


- Отсутствие нарастания массы тела беременной или ее снижение более чем на 1 кг;
- Уменьшение окружности живота на 5-10 см, что обычно связано с уменьшение количества околоплодных вод;
- Снижение тургора кожи;
- Падение массы тела, обусловленное вторичной гипотрофией переношенного плода;
- Маловодие и зеленое окрашивание околоплодных вод;
- Отсутствие болезненности при положении лежа на матке или при надавливании на матку (признак Дольфа);
- Более высокое стояние дна матки;
- Выделение молока, а не молозива из молочных желез;
- Усиление или ослабление движений плода, что указывает на дистресс плода вследствие нарушения маточно-плацентарного кровообращения;
- Изменение частоты, ритма и тембра сердечных тонов плода;
- Незрелость или недостаточная зрелость шейки матки;
- Крупные размеры плода;
- Увеличение плотности костей черепа, узость швов и родничков.

## **Внутриутробной гипоксии плода способствует:**

- пониженная функция надпочечников плода,
- чувствительность к кислородной недостаточности во время родов вследствие повышенной зрелости центральной нервной системы,
- пониженная способность головки плода к конфигурации,
- значительные размеры плода,
- частые нарушения сократительной деятельности матки,
- возбуждение или стимуляция родовой деятельности,
- частые оперативные вмешательства во время родов.



При перенашивании беременности на одну неделю количество околоплодных вод уменьшается в среднем на 100–200 мл, составляя 600–700 мл (в норме 800–900 мл). В 42 нед беременности количество околоплодных вод в 2 раза меньше, чем в норме (350–400), а при перенашивании на 3 нед и более наблюдается резко выраженное маловодие (200–300 мл). Далеко зашедшее перенашивание (44 нед и более) характеризуется практически полным отсутствием околоплодных вод (их количество может составлять 40–60 мл).



По Клиффорду выделяют следующие степени переношенности плода:

1 степень - новорожденный сухой, но кожа нормального цвета. Сыровидная смазка выражена слабо. ОВ светлые, но количество их снижено. Общее состояние новорожденного удовлетворительное.

2 степень- сухость кожных покровов выражена сильно, есть признаки гипотрофии. ОВ, пупочный канатик, кожа новорожденного окрашена меконием в зеленый цвет.

3 степень- ОВ желтого цвета. Кожа и ногти новорожденного имеют жёлтую окраску (признаки глубокой гипоксии)



При нахождении плода в матке 42 нед и более его кожные покровы начинают терять первородную смазку. С утратой этого защитного слоя непосредственно контактирует с околоплодными водами и сморщивается. Рост волос и ногтевых пластинок



При перенашивании беременности плод нередко крупный, размеры головки приближаются к верхней границе нормы или превышают ее. Однако масса переношенного новорожденного может быть и небольшой вследствие развивающейся внутриутробной задержки роста плода. Длина плода при перенашивании превышает нормальные показатели и составляет 54–56 см и более.



# Диагностика.

Диагноз переношенной беременности часто ставят на основании анамнеза и данных, полученных при клинических, лабораторных и инструментальных методах исследования.

Следует оценить:

- общее состояние беременной,
- течение данной беременности (гестозы),
- установить срок появления менархе,
- особенности менструального цикла,
- наличие генитального инфекции,
- наличие эндокринных заболеваний,
- перенесенные воспалительные заболевания половых органов,
- аборты,
- перенашивание беременности в анамнезе.

## Диагностика - продолжение


**Дополнительными методами исследования являются:**

- амниоскопия, которую проводят, начиная с 6-го дня после предполагаемого срока родов через каждые 2 дня; позволяет своевременно обнаружить типичные для перенашивания изменения: уменьшение количества околоплодных вод и зеленое их окрашивание, небольшое количество или отсутствие хлопьев сыровидной смазки.
- фено- или электрокардиография плода выявляет монотонность сердечного ритма, повышение вольтажа желудочкового комплекса, расщепление зубца R на верхушке, увеличение длительности комплекса PQ плода; неравномерность амплитуды тонов на ФКГ, отсутствие или извращение реакции сердечной деятельности плода на дыхательные пробы.

Объективные признаки, свидетельствующие о перенашивании беременности, наблюдаются как у матери, так и у плода.

У матери выявляют следующие признаки перенашивания:

- отсутствие биологической готовности шейки матки при доношенной беременности (38–40 нед);
- уменьшение окружности живота после 40-й недели беременности (косвенное свидетельство уменьшения количества околоплодных вод);
- увеличение высоты дна матки из-за более крупных размеров плода и гипертонуса нижнего сегмента, высокого расположения предлежащей части плода;
- снижение эстрогенной насыщенности



# ПРИЗНАКИ ПЕРЕНОШЕННОГО ПЛОДА

Признаки

перезрелости плода

Мацерация кожи,  
особенно на кистях и  
стопах ("банные"  
стопы и кисти)

)Уменьшение  
количество  
сыровидной смазки

Истощение подкожной  
жировой клетчатки и  
образование складок,  
снижение тургора  
кожи

Крупные размеры  
ребёнка

Длинные ногти на  
руках

Плотные кости черепа,  
узкие швы и роднички





## Банные стопы



# Диагностика - продолжение


## При ультразвуковом исследовании характерны:

- уменьшение количества околоплодных вод или маловодие,
- отсутствие увеличения бипариетального размера головки плода в динамике,
- отсутствие увеличения роста плода в динамике,
- истончение плаценты и III степень ее зрелости,
- патологическое изменение структуры плаценты в виде кальциноза,
- более выраженные контуры костей головки плода.



# При исследовании плаценты обнаруживают:

- петрификаты, жировые перерождения,
- оболочки зеленого цвета, «тощую» пуповину,
- увеличение массы и размеров плаценты, уменьшение ее толщины,
- выраженные склеротические и дистрофические изменения плаценты,
- участки некроза плаценты,
- снижено содержание гликогена, нейтральных сахаридов, функционально-активных и ряда окислительно-восстановительных ферментов.



После 40 нед беременности УЗИ рекомендуется проводить 2 раза в неделю для своевременного выявления уменьшения объема околоплодных вод и появления петрификатов в плаценте. К 42 нед беременности, как правило, наблюдается выраженное уменьшение количества амниотической жидкости, при этом наибольший вертикальный размер кармана свободного от эхоструктур плода участка около плодных вод составляет менее 2 см. В ряде наблюдений изменяется эхографическая характеристика околоплодных вод: визуализируется мелкодисперсная эхопозитивная взвесь, что обусловлено примесью сырovidной смазки, пушковых волос и эпидермиса, а также, возможно, мекония.

CMI  
GE

COFFMAN, LISA

10/20/08 11:35:50 AM ADM 39WEEKS, GA(LMP)=39w0d

MI 0.18 Tls 0.0 3.5C

OB-2/3

GE  
L9



PHILIPS

MAYFIELD, JENNA S

lsw UN01576534

HARMONY IMAGING

11/04/2010 12:28:50PM TIB0.3 MI 1.2

C5-2/OB2ND

AGC

M3

R 31Hz

S

0.8

D

65%

58


Med

Res

P



При  
допплерометриче-  
ском  
исследовании  
регистрируется  
разной степени  
выраженности  
снижение  
маточно-  
плацентарного и  
плодово-  
плацентарного  
кровотока,  
свидетельствующ



## ВЕДЕНИЕ РОДОВ

Ведение беременности при перенашивании имеет особенности. При сроке беременности 41 нед, отсутствии признаков родовой деятельности, недостатке точной готовности организма беременной к родам (незрелая или недостаточно зрелая шейка матки, гипотонус и снижение возбудимости матки) показана госпитализация в родильный дом в связи с необходимостью дополнительного обследования, постоянного наблюдения за состоянием матери и плода, подготовки к родоразрешению.

В стационаре решают вопрос о сроке и методе родоразрешения (через естественные родовые пути или путем кесарева сечения). Для этого необходимо:

- установить наличие и степень перенашивания беременности (срок беременности, предполагаемый срок родов, число дней или недель перенашивания);
- оценить состояние плода по результатам объективного и дополнительных исследований (КТГ, УЗИ, допплерометрическая оценка кровотока);
- определить состояние плаценты: соответствие ультразвуковых признаков зрелости плаценты гестационному сроку, наличие патологических структурных изменений в плаценте, степень маловодия; установить степень готовности шейки матки к родам (зрелая, недо-стадионная, зрелая).

## Лечение.

- За женщинами, отнесенными к группе риска с учетом возможного перенашивания беременности, в женской консультации осуществляют интенсивное наблюдение и госпитализируют на 40-41 недел.
- Тактика врача при перенашивании беременности должна определяться не временем перенашивания, а его характером (перенашивание или пролонгирование беременности).
- Госпитализацию беременных с перинашиванием желательно проводить в лечебные учреждения не ниже III уровня аккредитации.

- В родильном отделении проводят уточнение срока беременности, состояния беременной и плода, оценивают результаты клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования.
- При удовлетворительном состоянии плода и отсутствии признаков перинашивания беременности рекомендована выжидательная тактика.
- При наличии первых признаков перинашивания беременности показана подготовка родовых путей с дальнейшей индукцией родовой деятельности.

В связи с большими размерами и плохой конфигурацией головки переношенного плода особое внимание уделяют функциональной оценке таза в процессе родов. При выявлении мекония в околоплодных водах особую опасность представляет аспирация околоплодными водами, поэтому в родах проводят ме дикаментозную защиту плода (2 мл 1 % раствора седуксена) или решают вопрос об оперативном родоразрешении . С целью профилактики родового травматизма матери и плода целесообразно применять эпидуральную и (или) пудендальную анестезию, рассече ние промежности.

Подготовка шейки матки к индукции родов при ее незрелости в сроке после 40 недель беременности приводится одним из методов:

- Медикаментозный – простогландины Е1 и Е2;
- Немедикаментозный – акушерские ламинарии, используются при оценке степени зрелости шейки матки по шкале Бишопа менее 5 баллов.

## Показания и условия

к индукции родов:

- срок беременности 42 недели и более;
- состояние плода по результатам биофизического профиля – 7-8 баллов и более;
- зрелость шейки матки не менее 6 баллов по шкале Бишопа;
- соответствие размеров плода и таза матери;
- отсутствие плодного пузыря (амниотомия).

## Методы индукции родов:

- пальцевое отслаивание нижнего полюса плодного пузыря;
- амниотомия;
- капельное внутривенное введение раствора окситоцина.

- Если в первом периоде родов выявляются признаки страдания плода и особенно если имеются осложнения у роженицы (отсутствие эффекта от родовозбуждения в течение 3-5 часов при вскрывшемся плодном пузыре; аномалии родовой деятельности, не поддающиеся лечению; клинически узкий таз, возраст и др.), следует произвести кесарево сечение.
- Во втором периоде родов из-за слабости родовых сил, гипоксии плода нередко прибегают к вакуум-экстракции плода, наложению акушерских щипцов, извлечению плода за тазовый конец.
- В третьем периоде родов необходимо проведение мероприятий, направленных на профилактику гипотонического кровотечения в связи с частым возникновением гипотонического и атонического маточного кровотечения, обусловленного пониженной сократительной способностью матки, а также нарушением процессов отслойки плаценты.

## Показанием к кесареву сечению служат:

- анатомически и клинически узкий таз,
- нередко в сочетании с крупным плодом,
- внутриутробная гипоксия плода,
- осложненный акушерский анамнез,
- возраст первородящих старше 30 лет,
- неэффективность родовозбуждения,
- отсутствие готовности организма к родам,
- аномалии родовой деятельности, не поддающиеся лечению.

**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**

