

# Эпидемический паротит

# Эпидемический паротит

- Острое инфекционное заболевание, с негнойным поражением железистых органов (слюнные железы, поджелудочная железа, семенники) и ЦНС, вызванное парамиксовирусом. Считается лёгким детским заболеванием. Заболеванию свинкой в значительной мере подвержены дети в возрасте от трех до пятнадцати лет. -- Чаще эпидемическим паротитом заболевают мальчики - примерно в полтора раза чаще, чем девочки. Если заболевание приходится на взрослый возраст то проходит тяжело.



# СИМПТОМЫ

1. Острое увеличение температуры
2. Мигрень
3. Общее недомогание
4. болезненное опухание слюнных желёз, из-за чего лицо больного (особенно щёки) становится отёкшим.  
воспаляются околоушные слюнные железы.
5. Затрудненность в глотке из-за отёка, трудно жевать и боли.

Передаётся воздушно-капельным

# Лечение

Неосложненный эпидемический паротит лечат на дому, госпитализация показана только в случаях тяжелых осложнений, либо в карантинных целях.

При развитии осложнений эпидемического паротита показана консультация андролога, гинеколога, отоларинголога и сурдолога.

- рекомендован постельный режим
- потреблять жидкую и полужидкую пищу, чаще пить воду или чай.
- следить за гигиеной рта, полоскать кипяченой водой или слабым раствором соды, тщательно чистить зубы
- На область воспаленных желез накладывают сухие согревающие компрессы

# Осложнения

Осложнений могут быть много и очень серьёзны, вплоть до летального исхода

- Энцефалит, Паротитный энцефалит
- Отёк головного мозга
- Потеря слуха
- Воспаление половых органов
- поражение поджелудочной железы и яичек ( из-за этого может развиваться или панкреатит или сахарный диабет 1 типа)
- Поражение почек

# Сестринский уход

Изолировать больного на 9 дней, профилактика распространения

Уменьшается концентрация возбудителей во внешней среде.

Обеспечивается чистота воздуха.

5. Обеспечить ребенку правильное питание. Пища должна быть:

а) механически щадящей;

б) легкоусвояемой, нежирной;

в) содержать кислые соки (пить т. лучше через соломинку, так как они раздражают воспаленный стенозов проток)

Тщательно ухаживать за полостью рта ребенка( возможно развитие стоматита) Организовать и следить за соблюдением в течение острого периода постельного режима. Обеспечить его постепенное расширение по мере улучшения состояния ребенка.

Если лечение на дому объяснить выше.

# Профилактика

Как таковой профилактики нет

Основное это Вакцинация паротитная культуральная живая,  
После паротитной прививки общие нормальные  
вакцинальные реакции бывают редко и проявляются в виде  
повышения температуры тела, покраснения зева, насморка. В  
редких случаях отмечается кратковременное (в течение 1-3  
дней) увеличение околоушных слюнных желез (с одной или  
двух сторон).