

# Симптомы острого и хронического отравления снотворными средствами и меры помощи при этих состояниях.



ЛД<sub>2</sub>А-С<sub>14</sub>  
Кулагина Е.А.

Отравление - патологический процесс, развивающийся вследствие попадания в организм человека токсических доз химических веществ (в том числе лекарственных).



# Основные группы снотворных, вызывающие отравления

## Барбитураты



## Бензодиазепины





Симптомы острого отравления ББ наступают при употреблении 10-кратных разовых ТД у взрослых (от 2,0-5,0 до 20,0-22,0). У детей 1-3 лет интоксикация с летальным исходом может наступить от 1-кратной ТД взрослых. Смертельные исходы нечасты и наступают при комбинации с этанолом, АД, НЛ - составляет около 1-3%. Коматозное состояние наступает в 20% случаев.



Симптомы отравления связаны с угнетением ЦНС.

При легких формах интоксикации ББ-сонливость и снижение рефлексов, БД – оглушение.

При тяжелом отравлении наступает


- глубокий сон, переходящий в кому, сознание отсутствует
- исчезают рефлексы (сухожильные, роговичный, зрачковый)
- миоз, затем мидриаз
- снижается чувствительность, мышечный тонус,
- снижается объем дыхания (угнетение ДЦ) и АД (ББ-угнетение СДЦ, ганглиоблокирующее, миотропное сосудорасширяющее действие, снижение МОС)
- бронхорея, отёк лёгких
- гипоксия, дыхательный и метаболический ацидоз
- сердечная недостаточность, коллапс
- анурия
- снижается температура тела



**Смерть от паралича ДЦ!**





После ликвидации симптомов острого отравления БД – длительные нарушения ЦНС (когнитивных функций) и ВНС, легко возникает бронхопневмония, инфицирование мочевого пузыря при его катетеризации, трофические поражения кожи, печени, почек, иммунной системы.



# Лечение

## Этиотропная терапия:

1. Промывание желудка
2. Активированный уголь
3. Солевые слабительные
4. Форсированный диурез
5. Гемосорбция
6. Плазмоферез





## Патогенетическая терапия:

1. При отравлении ББ –  
дыхательные analeптики  
(\*бемегрид, коразол)
2. При отравлении БД –  
флумазенил





## Симптоматическая терапия:

1. ИВЛ и кислородотерапия
2. Адреномиметики (\*мезатон)
3. Сердечные гликозиды



Хроническое отравление возникает при длительном приёме снотворных средств






# Симптомы хронического отравления

- Апатия
- Сонливость
- Слабость
- Нарушение равновесия
- Головокружение
- нечленораздельная речь
- Галлюцинации
- Судороги
- психомоторное возбуждение
- Нарушение функций внутренних органов
- Лекарственная зависимость



# Лечение

- Постепенная отмена препарата
- Симптоматическая терапия





Спасибо за внимание

