



Вакцинопрофилактика гриппа


2021

Национальный календарь профилактических прививок

	ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ											ВЗРОСЛЫЕ								
	МЕСЯЦЫ										ГОДЫ				ГОДЫ					
	0	1	2	3	4,5	6	12	15	18	20	6	7	14	15-17	18-25	26-35	36-55	56-59	60+	
Туберкулез	3-7 д.										RV									
Гепатит В	V1	V2				V3														
	V1	V2	V3				V4													
Пневмококковая инфекция			V1		V2					RV										
Коклюш																				
Дифтерия				V1	V2	V3				RV1										
Столбняк											АДС-м RV2	АДС-м RV3							Каждые 10 лет с момента последней ревакцинации (АДС-м)	
Полиомиелит				ИПВ	ИПВ					ОПВ	ОПВ				ОПВ					
						ИПВ					ИПВ	ИПВ				ИПВ				
Гемофильная инфекция				V1	V2	V3					RV									
Корь																				
Краснуха								V1					RV					Девушки		
Эпидемический паротит																				
Грипп														Ежегодно						

 Всем лицам данной возрастной группы

 лицам из групп риска, по показаниям, призывники (грипп)


 Ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений и однократно привитые (для кори и краснухи)

Подлежат обязательной вакцинации от гриппа

- Дети
- Учащиеся 1-11 классов
- Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и студенты ВУЗов
- Работники медицинских, образовательных организаций, транспорта, сферы предоставления услуг, ЖКХ
- Лица, работающие вахтовым методом
- Сотрудники правоохранительных органов, таможни
- Работники организаций социального обслуживания, МФЦ
- Государственные гражданские и муниципальные служащие
- Беременные женщины
- Призывники
- Лица старше 60 лет
- Лица с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, органов дыхания, сахарным диабетом, ожирением и др.)


Поступление вакцины в Кузбасс

Вакцина для взрослых «Совигрипп»






*Адьювант Совидон обладает
иммуномодулирующим, детоксицирующим,
антиоксидантными и мембранопротекторным
свойствами.*

Вакцина для детей «Ультрикс»



Противопоказания для вакцинации против гриппа

-  **Аллергическая реакция на предшествующее введение вакцины**
-  **Острые респираторные заболевания**
-  **Обострение хронических заболеваний**
-  **Повышенная чувствительность к куриному белку**

Вакцинация против гриппа и COVID-19



*Интервал после
вакцинации против COVID-19 – не
менее 30 дней*

Не забывайте про маски!

Не стоит пренебрегать этим средством защиты, чтобы оставаться здоровым. В идеале, чем больше людей в общественных местах правильно носят маски, тем лучше.



НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ



**Благодарим
за внимание!**



КУЗБАСС
время быть первыми