

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САРОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА РОССИИ»**

Презентация

на тему:

**«Раны. Определение. Классификация. Общие и местные
симптомы. Принципы лечения. Действия медсестры»**

Выполнила: Кусмарцева Алена
Андреевна
студентка 3 курса группы 30СД18
специальность 34.02.01
Сестринское дело
Руководитель проекта:
Константин Петрович

Саров, 2019 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Раны – нарушение целостности покровных тканей (кожи и слизистых оболочек).



КЛАССИФИКАЦИЯ:

- ❖ по обстоятельствам возникновения;
- ❖ по характеру ранящего агента;
- ❖ по степени инфицирования;
- ❖ по отношению к полостям тела.



По обстоятельствам возникновения:

- ❖ случайные,
- ❖ боевые,
- ❖ операционные.



По ХАРАКТЕРУ РАНЯЩЕГО АГЕНТА:

- ❖ резаные - нож,
- ❖ рваные – тупой предмет,
- ❖ рубленые - топор,
- ❖ колотые - шина,
- ❖ ушибленные - палка,
- ❖ огнестрельные - пуля,
- ❖ укушенные - животные,
- ❖ размозженные – молоток,
- ❖ ожоговые – физические и химические агенты,
- ❖ отравленные – змея.
- ❖ Существуют также раны, имеющие смешанный характер, например, рвано-ушибленные и колото-резаные.



По степени инфицирования:

- ❖ Асептические – микробы отсутствуют (при проведении медицинских манипуляций),
- ❖ Микробнозагрязненные – все случайные раны, но без признаков инфекционных процессов,
- ❖ Гнойные – выраженные признаки инфекционных процессов.



По отношению к полостям тела:

- ❖ проникающие – с повреждением оболочки внутренних полостей организма,
- ❖ брюшная полость – париетальная брюшина,
- ❖ плевральная полость – париетальная плевра,
- ❖ полость черепа – твердая мозговая оболочка,
- ❖ непроникающие – без повреждения оболочек внутренних полостей.



ХАРАКТЕРИСТИКА РАН:

Характеристика	резаные	колотые	ушибленные	рваные	Рубленые	укушенные
Боль	++	+	+++	+++	+++	++
кровотечение	+++	+	+	+++	+++	++
зияние	+++	+	+	++	+++	++
Риск инфицирования	++	+++	+	+++	+++	+++ +
Вид заживления	П,В	П,В	С,В	В	В	В



ОБЩИЕ СИМПТОМЫ:

- ❖ экссудация – интоксикационный, астенический синдром;
- ❖ пролиферация – восстановление показателей общего состояния.



МЕСТНЫЕ СИМПТОМЫ:

- ❖ боль;
- ❖ нарушение кровотечения из раны;
- ❖ зияние раны;
- ❖ нарушение функций (от нескольких минут до нескольких часов).



ЛЕЧЕНИЕ РАН.

◆ Случайные:

1. Оказание ПМП;
2. Классифицированная (профилактика столбняка, коррекция нарушений гомеостаза).

◆ Преднамеренные:

1. Лечение и уход в послеоперационный период: (лечение операционной болезни, профилактика и лечение осложнений).



ДЕЙСТВИЯ МЕДСЕСТРЫ:

- ❖ остановить кровотечение;
- ❖ повязка;
- ❖ обезболить;
- ❖ иммобилизация (при повышенном объеме потери крови);
- ❖ в тяжелых случаях – противошоковая терапия;
- ❖ вызвать хирурга – “сортировка” случая.

