

# **Тема :** “Дородовый разрыв плодных оболочек”

**Выполнили :** Кабдыгалиева А.  
Хасенова С.

**Группа :** 105

**Проверила :** Назарбаева Р.

- Клинический протокол преждевременный разрыв плодных оболочек. Дородовый разрыв плодных оболочек .
- Утверждено на Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан протокол № 10 от «04» июля 2014 года
- **Ссылка :**  
<https://diseases.medelement.com/disease/преждевременный-разрыв-плодных-оболочек/13991>

- В данном протоколе описывается , что в доношенном сроке , точнее в гестационном сроке 37 и более недель показана выжидательная тактика . Было бы лучше , если отказаться от выжидательной тактики в данном сроке , так как можно предотвратить осложнения оказывающие влияние и для матери и для ребенка , самое главное - **снизить перинатальную смертность !!**  
**!**

- **P** – беременные с дородовым излитием околоплодных вод
- **I** – активная тактика
- **S** - выжидательная тактика
- **O** – снижение частоты перинатальных смертностей

# Вопрос:

- Снижает ли частоту перинатальных смертностей при применении активной тактики по сравнению с выжидательной тактикой у беременных с дородовым излитием околоплодных вод?