

НУО КАЗАХСКО-РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Тема: Цистит

Подготовил: 3 курс 305Б

«общая медицина» Акбергенов

М.А

ЦИСТИТ


ЦИСТИТ - ЭТО ...

... - Это воспаление стенок мочевого пузыря.




Причины

кишечная палочка,
стафилококк
у женщин обусловлен
малой длиной и
широким просветом
мочеиспускательного
канала и
расположением
относительно других
органов




- Длительность клинических проявлений при остром цистите обычно составляет 5-7 суток.
- Для хронического цистита характерны те же симптомы, что и для острого, однако они менее выражены.

- Цистит – воспалительные изменения слизистой оболочки мочевого пузыря, сопровождающиеся нарушением его функции.




● Цистит бывает первичным и вторичным. По течению злобная болячка бывает острой и хронической. Причем многие даже и не подозревают, что имеют хроническую форму цистита. Самое страшное осложнение, которое может быть это интерстициальный цистит



○ Симптомы острого цистита

- ✓ частое, малыми порциями, болезненное, с ощущениями рези и жжения мочеиспускание
- ✓ императивные позывы к мочеиспусканию
- ✓ боль в надлобковой области, усиливающаяся при пальпации и наполнении мочевого пузыря
- ✓ повышение температуры тела до субфебрильных цифр
- ✓ слабость, снижение трудоспособности.

- Длительность клинических проявлений при остром цистите обычно составляет 5-7 суток.
- Для хронического цистита характерны те же симптомы, что и для острого, однако они менее выражены.



В развитии цистита немаловажную роль играют нарушения функции мочевого пузыря, обусловленные беременностью

- - снижение тонуса
- - увеличение ёмкости
- - повышенная смещаемость.

Беременность на фоне цистита, как правило, протекает без осложнений.

• Как правило предпочтения отдают следующим препаратам:

- Амоксициллин
- Амоксиклав
- Ампициллин
- Растительные уросептики




● **Чтобы не заболеть циститом надо соблюдать следующие правила:**

- Не допускать переохлаждения (не сидеть на холодном, избегать купаний в холодных водоемах, одеваться по погоде)
- Заняться искоренением своих хронических болячек, таких как: тонзиллит, ангина, кариес, желудочно-кишечные проблемы
- Следить за питанием, не следует злоупотреблять острой, жареной, маринованной, кислой пищей
- Соблюдать правила личной гигиены утром и вечером.

ЦИСТИТ

- Воспаление мочевого пузыря
- Инфицирование:
 - Из лоханок
 - Восходящим путём
- Течение:
 - Острое
 - хроническое



Антибактериальные препараты для лечения острого цистита

- Фторхинолоны
- Ампициллин
- Амоксициллин
- Амоксициллин/клавуланат
- Ко-тримоксазол
- Нитрофурантоин
- Фосфомицин

Цистит



Основной причиной **цистита** является инфекция.

Основным возбудителем является кишечная палочка.

Профилактика цистита.

1. Опорожнять кишечник и мочевой пузырь,
2. Не допускать запоров.
3. Вести активный образ жизни, больше двигаться, так как это способствует устранению застойных явлений в органах брюшной полости.
4. Соблюдать правила личной гигиены, особенно половых органов.

Обострение хронического цистита


Персистирующая инфекция

Переохлаждение

Возраст

Оперативное
вмешательство

Сахарный диабет



ЦИСТИТ

Воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря

Симптомы:

- *недомогание;*
- *повышение температуры;*
- *частое мочеиспускание (каждые 20-30 минут);*
- *болезненные ощущения в области малого таза или за лобком;*
- *моча становится мутной, иногда с хлопьями слизи, иногда с кровью.*





Спасибо за внимание