

ОПП


ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ

К.А.МИКАЕЛЯН

ОПН

- 35-65% в ОРИТ
- 5-20% всех госпитализаций
- значительно увеличена смертность

RIFLE criteria [2004]



RIFLE vs AKIN


Table 34.1 RIFLE and AKIN Criteria for Acute Kidney Injury

Categories	Serum Creatinine Criteria	Urine Output Criteria†
RIFLE:		
Risk	↑ in SCr to 1.5–<2 × baseline	UO: <0.5 mL/kg/hr for 6 hrs
Injury	↑ in SCr to 2–<3 × baseline	UO: <0.5 mL/kg/hr for 12 hrs
Failure	↑ in SCr to ≥3 × baseline	UO: <0.3 mL/kg/hr for 24 hrs or anuria for 12 hrs
Loss	Loss of kidney function for >4 wks	
ESRD	Loss of kidney function for >3 mos	
AKIN*:		
Stage 1	↑ in SCr to ≥0.3 mg/dL or to 1.5–2 × baseline	UO: <0.5 mL/kg/hr for >8 hrs
Stage 2	↑ in SCr to >2–3 × baseline	UO: <0.5 mL/kg/hr for >12 hrs
Stage 3	↑ in SCr to >3 × baseline or SCr ≥ 4 mg/dL with an acute increase of ≥0.5 mg/dL	UO: <0.5 mL/kg/hr for 24 hrs or anuria for 12 hrs

*The AKIN criteria require the increase in serum creatinine to occur within 48 hrs.

†Ideal body weight is recommended for urine output determinations.

From References 1 and 2. ESRD=end-stage renal disease; SCr=serum creatinine; UO=urine output.



Chang C-H, Lin C-Y, Tian Y-C, et al. Acute kidney injury classification: comparison of AKIN and RIFLE criteria. Shock 2010; 33:247–252.

**+ ПАЦИЕНТЫ НА ЗПТ = STAGE 3 НЕЗАВИСИМО
ОТ СОСТОЯНИЯ НА МОМЕНТ ИНИЦИАЦИИ
ЗПТ**

• 2.1.1 ОПН классифицируется как любое из
нижеперечисленного:

- увеличение $SCr \geq 26.5$ мкмоль/л в течение 48 ч; **ИЛИ**
- увеличение SCr в ≥ 1.5 р от исходного уровня, которое достоверно или предположительно произошло в течение последних 7 дней;
ИЛИ
- темп диуреза <0.5 ml/kg/h в течение 6 ч

KDIGO: СТАДИИ ОПП

СТАДИЯ	УРОВЕНЬ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ	ОБЪЕМ ВЫДЕЛЯЕМОЙ МОЧИ
1	1,5-1,9 РАЗА ВЫШЕ ИСХОДНОГО, ИЛИ	<0,5 МЛ/КГ/Ч ЗА 6-12 Ч
	ПОВЫШЕНИЕ $\geq 26,5$ МКМОЛЬ/Л	
2	В 2,0-2,9 РАЗА ВЫШЕ ИСХОДНОГО	<0,5 МЛ/КГ/Ч ЗА ≥ 12 Ч
3	В 3,0 РАЗА ВЫШЕ ИСХОДНОГО, ИЛИ	<0,3 МЛ/КГ/Ч ЗА ≥ 24 Ч, ИЛИ АНУРИЯ В ТЕЧЕНИЕ ≥ 12 ЧАСОВ
	ПОВЫШЕНИЕ ДО $\geq 353,6$ МКМОЛЬ/Л ИЛИ	
	НАЧАЛО ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ ИЛИ	
	У БОЛЬНЫХ < 18 ЛЕТ, СНИЖЕНИЕ СКФ ДО <35 МЛ/МИН/1,73 М ²	

ОЛИГУРИЯ – ДИУРЕЗ $< 0,5$ МЛ/КГ/Ч ЗА 6 Ч ИЛИ < 500 МЛ/СУТ

АНУРИЯ – ДИУРЕЗ < 50 МЛ/СУТ






FIGURE 11.1 Clinical, biochemical, and functional evolution of acute kidney disease from the early phases to the latest outcomes. At every point, damage biomarkers or serum creatinine describe the actual situation. Apparent full recovery may occur when serum creatinine and baseline glomerular filtration rate (GFR) go back to normal, but renal functional reserve (RFR) is impaired. *CKD*, Chronic kidney disease.

Этиология ОПН в линейных отделениях и в ОРИТ





Etiology of acute kidney injury, as reported by the treating physicians, in the BEST Kidney¹¹ and AKI-EPI studies.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОПН

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ	ПОВРЕЖДАЮЩИЙ ФАКТОР
<ul style="list-style-type: none">▪ ХБП▪ ВОЗРАСТ▪ ЖЕНСКИЙ ПОЛ▪ НЕГРОИДНАЯ РАСА▪ АЛИМЕНТАРНАЯ ГИПОВОЛЕМИЯ▪ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ▪ ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ▪ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ▪ ПРИМЕНЕНИЕ НПВС▪ ПОДАВЛЕНИЕ РААС (иАПФ, БРА)▪ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ▪ БЕРЕМЕННОСТЬ	<ul style="list-style-type: none">• СЕПСИС• ЦИРКУЛЯТОРНЫЙ ШОК• КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА / АИК• ОЖОГИ• ТРАВМА, РАБДОМИОЛИЗ• НЕФРОТОКСИЧЕСКИЕ ЛС (АМИНОГЛИКОЗИДЫ, АМФОТЕРИЦИН-В, ЦИСПЛАТИН)• ВВЕДЕНИЕ РЕНТГЕН-КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ• ТОКСИНЫ (ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ИТД)

ОПН

```
graph LR; OPN[ОПН] --- A[ПРЕРЕНАЛЬНАЯ]; OPN --- B[РЕНАЛЬНАЯ]; OPN --- C[ПОСТРЕНАЛЬНАЯ];
```

ПРЕРЕНАЛЬНАЯ

РЕНАЛЬНАЯ

ПОСТРЕНАЛЬНАЯ

ПРЕРЕНАЛЬНАЯ ОПН • ОЛИГУРИЯ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО КРОВотоКА

ГИПОВОЛЕМИЯ:

- **АБСОЛЮТНАЯ**
 - ГЕМОРАГИЧЕСКИЙ ШОК
 - ДИАРЕЯ
 - ДИУРЕТИКИ
 - ЛИХОРАДКА
- **ОТНОСИТЕЛЬНАЯ**
 - СЕПСИС
 - ГЕПАТОРЕНАЛЬНЫЙ С-М

СНИЖЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА

- КАРДИОГЕННЫЙ ШОК
- ТЭЛА
- ИВЛ

СОСУДИСТЫЕ ПРИЧИНЫ

- СТЕНОЗ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
- АБДОМИНАЛЬНЫЙ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ (ВБД > 20 mm Hg)
- ПРИЕМ НПВС, иАПФ, АРА, ИНГИБИТОРОВ

• **ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОБРАТИМОЕ НАРУШЕНИЕ**

- ПРИ РАННЕЙ КОРРЕКЦИИ ПОРАЖЕНИЯ ПАРЕНХИМЫ НЕ ПРОИСХОДИТ
- МОЖЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ ДО РЕНАЛЬНОЙ ОПН (ATN) ПРИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ИШЕМИИ
- РАЗРЕШАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 СУТОК НА ФОНЕ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ


- ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ
- СТАБИЛИЗАЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ:
 - АДср > 65 mmHg (У ПОЖИЛЫХ 70-75 mmHg)
 - СВ > 2,5 L/min/m²

РЕНАЛЬНЫЕ (ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ)

ПРИЧИНЫ ОПН

ОСТРЫЙ КАНАЛЬЦЕВЫЙ НЕКРОЗ (АТН)

- >50% ВСЕХ СЛУЧАЕВ ОПН
 - ПРЯМОЕ ПОРАЖЕНИЕ
 - ТОКСИНЫ
 - ЛС (АМИНОГЛИКОЗИДЫ, ТЕНОФОВИР, ЦИСПЛАТИН)
 - СЕПСИС
 - КОНТРАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА
 - МИОГЛОБИНУРИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК
 - МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА, ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЯ
 - НЕПРЯМОЕ ПОРАЖЕНИЕ
 - ИШЕМИЯ
 - ОБСТРУКЦИЯ



ОСТРЫЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ (АИН)

- АНТИБИОТИКИ (БЕТА-ЛАКТАМЫ, ВАНКОМИЦИН, БИСЕПТОЛ)
- НПВС
- ОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ (АГН)

- СТРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ (ПОСЛЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИНФЕКЦИИ)
- MRSA (ПРИ АКТИВНОМ ТЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИИ)
- IgA-НЕФРОПАТИЯ
- БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ГН
- С-М ГУДПАСЧЕРА
- СКВ

ОСТРЫЙ КОРТИКАЛЬНЫЙ НЕКРОЗ (АСН)

АРТЕРИАЛЬНЫЙ ВАЗОСПАЗМ

- ЛС
- НАРУШЕНИЕ МЦР
- ТРОМБОЗЫ

ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (GUS)

- БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭНДОТОКСИНЕМИЯ (E.COLI)

МЕХАНИЗМ	ПРЕПАРАТЫ	
ВНУТРИПОЧЕЧНАЯ ГЕМОДИНАМИКА	ЧАСТО	НПВС
	ДРУГИЕ	иАПФ, БРА, циклоспорин, такролимус
ГИПЕРОСМОЛЯРНОСТЬ	ЧАСТО	КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ (ГЭК)
	ДРУГИЕ	МАННИТОЛ, ВВИГ
ПОРАЖЕНИЕ КАНАЛЬЦЕВ	ЧАСТО	АМИНОГЛИКОЗИДЫ
	ДРУГИЕ	АМФО-В, АРВТ, ЦИСПЛАТИН
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ	ЧАСТО	АБ (ПЕНИЦИЛЛИНЫ, ЦЕФАЛОСПОРИНЫ, СУЛЬФАНИЛАМИДЫ, ВАНКОМИЦИН, МАКРОЛИДЫ, ТЕТРАЦИКЛИНЫ, РИФАМПИЦИН)
	ДРУГИЕ	АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ (ФЕНИТОИН, ВАЛЬПРОЕВАЯ К-ТА), H ₂ -БЛОКАТОРЫ, НПВС, ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ

РЕНАЛЬНЫЕ (СОСУДИСТЫЕ) ПРИЧИНЫ ОПН

- ТРОМБОЭМБОЛИИ
 - ФП
 - КМП
 - ИЭ
- ТРОМБОЗ ПОЧЕЧНЫХ ВЕН
 - РАК
- ОКОЛОПОЧЕЧНЫЕ АБСЦЕССЫ
- ТРАВМА
- КОМПРЕССИЯ

МИОГЛОБИНУРИЧЕСКАЯ ОПН

- 1/3 ПАЦИЕНТОВ С РАБДОМИОЛИЗОМ
- ТРАВМА, КОМПРЕССИЯ, ДТП
- ДЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ СМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА
- ОККЛЮЗИЯ СОСУДА
- ЧРЕЗМЕРНАЯ МЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
- DELIRIUM TREMENS
- СУДОРОГИ
- СЕПСИС
- КОКАИН, ГЕРОИН
- ЭТАНОЛ
- СТАТИНЫ, ФИБРАТЫ
- АНТИДЕПРЕССАНТЫ
- БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ
- ЯДЫ ЗМЕЙ, НАСЕКОМЫХ
- LEGIONELLA SPP.
- STREPTOCOCCUS SPP. (НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ФАСЦИИТ)
- ВИРУС ГРИППА А, В
- СТОБНЯК
- ЭЛЕКТРОТРАВМА, ЭЛЕКТРОКАРДИОВЕРСИЯ
- ГИПЕРТЕРМИЯ, СЕРОТОНИНОВЫЙ СИНДРОМ
- EBV, ВИЧ, CMV
- АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
- ГИПЕР-/ГИПОНАТРИЕМИЯ
- ГИПОКАЛЬЦИЕМИЯ
- ГИПЕРОСМОЛЯРНЫЕ СОСТОЯНИЯ

МИОГЛОБИНУРИЧЕСКАЯ ОПН

МЕХАНИЗМ ОПН:

- ГИПОВОЛЕМИЯ/ДЕГИДРАТАЦИЯ
- АЦИДУРИЯ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО – ВЫБРОС БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА КАЛИЯ, ФОСФАТОВ, МИОГЛОБИНА И УРАТОВ ИЗ ПОВРЕЖДЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

КЛИНИКА:

1. МИАЛГИЯ

- ЧАЩЕ ВСЕГО – ИКРОНОЖНЫЕ МЫШЦЫ И ПОЯСНИЦА

2. СЛАБОСТЬ

3. ПОТЕМНЕНИЕ МОЧИ

ДИАГНОСТИКА: МИОГЛОБИН В

МОЧЕ

ТОКСИЧНОСТЬ Hb:

- ПОЧЕЧНАЯ ВАЗОКОНСТРИКЦИЯ
- ОБРАЗОВАНИЕ ВНУТРИПРОСВЕТНЫХ СГУСТКОВ С ПИГМЕНТОМ
- ПРЯМОЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ИНТЕРСИМПАТ ТЕРАПИИ:

- АГРЕССИВНАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ (NaCl 0,9%)
 - +МАННИТОЛ, БИКАРБОНАТ
- ФОРСИРОВАНИЕ ДИУРЕЗА
- КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОЛИТОВ (КАЛИЙ, ФОСФАТЫ)
 - В 30% СЛУЧАЕВ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ

• ПОВЫШЕНИЕ Scr ≥44 МКМОЛЬ/Л ИЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25% ОТ ИСХОДНОГО УРОВНЯ В ТЕЧЕНИЕ 48 Ч ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТА ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ ИНОЙ ПРИЧИНЫ

• 3 МЕСТО СРЕДИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ОПН
• МИФ?

Mehran Score for Post-PCI Contrast Nephropathy ☆

Predicts risk of contrast-induced nephropathy (CIN) after percutaneous coronary intervention (PCI).

INSTRUCTIONS
Use variables at the time of PCI.

When to Use ▾ Pearls/Pitfalls ▾

Hypotension SBP <80 for ≥1 hr requiring inotrope or balloon pump within 24 hrs of cath	<input checked="" type="radio"/> No 0	<input type="radio"/> Yes +5
Intra-aortic balloon pump	<input checked="" type="radio"/> No 0	<input type="radio"/> Yes +5
Congestive heart failure CHF class III/IV by New York Heart Association Classification and/or history of pulmonary edema	<input type="radio"/> No 0	<input checked="" type="radio"/> Yes +5
Age >75 years	<input type="radio"/> No 0	<input checked="" type="radio"/> Yes +4
Anemia Baseline hematocrit value <39% for men and <36% for women	<input type="radio"/> No 0	<input checked="" type="radio"/> Yes +3
Diabetes	<input type="radio"/> No 0	<input checked="" type="radio"/> Yes +3
Contrast media volume	<input type="text" value="100"/>	mL
eGFR, mL/min/1.73 m ²	<input checked="" type="radio"/> >60	0
	<input type="radio"/> 40 to <60	+2
	<input type="radio"/> 20 to <40	+4
	<input type="radio"/> <20	+6

16 points
CIN Risk Score

57.3 %
Risk of any post-PCI CIN


12.6 %
Risk of post-PCI CIN requiring dialysis

Copy Results 📄 Next Steps »»

Prerenal

- ~ ↓ Intravascular volume
- ~ Hypotension
- ~ Diabetes
- ~ ↑ Uric acid
- ~ ↑ Ca²⁺
- ~ ↑ Cholesterol
- ~ Contrast agent
- ~ Nephrotoxic drugs
- ~ Hypertension
- ~ Sepsis

Renal



ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ КИН

- ХБП с СКФ < 60 mL/min/1.73m²
- ВОЗРАСТ > 75 ЛЕТ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
- НЕФРОТОКСИЧЕСКИЕ ЛС
 - АМИНОГЛИКОЗИДЫ
 - НПВС
 - АМФОТЕРИЦИН В
- ГИПОВОЛЕМИЯ
- СЕПСИС
- ОБЪЕМ И ОСМОЛЯРНОСТЬ ВВЕДЕННОГО КОНТРАСТА
- ИНТРААРТЕРИАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ

- ЧАЩЕ ВСЕГО – АСИМПТОМАТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ БЕЗ ОЛИГУРИИ
- **РОСТ scr ПОСЛЕ 24 Ч С МОМЕНТА ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТА С ПИКОМ НА 3-5 СУТКИ И СНИЖЕНИЕМ К ИСХОДНОМУ УРОВНЮ В ТЕЧЕНИЕ 10-14 ДНЕЙ**

ПРОФИЛАКТИКА КИН

ЭФФЕКТИВНО

- ГИДРАТАЦИЯ ИЗОТОНИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ КРИСТАЛЛОИДОВ ЗА 1 ЧАС ДО И 3-6 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
- ИЗБЕГАТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРАСТА
- ИССЛЕДОВАНИЕ С МИНИМАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ КОНТРАСТА
- НИЗКООСМОЛЯРНЫЕ КОНТРАСТНЫЕ


СПОРНО

- N-АЦЕТИЛЦИСТЕИН (ФЛУИМУЦИЛ) [2D]
- СТАТИНЫ
- БИКАРБОНАТ НАТРИЯ
- ТЕОФИЛЛИН
- АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА
- ПЕРОРАЛЬНАЯ ГИДРАТАЦИЯ
- ЗПТ

BAD MEDICINE

- ДИУРЕТИКИ
- МАННИТОЛ
- ДОПАМИН
- ФЕНОЛДОПАМ

ПОЧЕЧНЫЙ КРОВТОК И МЕТАБОЛИЗМ ПРИ СЕПСИСЕ



ПОСТРЕНАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ОПН

ЭТИОЛОГИЯ

- БЕРЕМЕННОСТЬ, КАРЦИНОМА МАТКИ
- НЕЙРОГЕННЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (СД, СПИНАЛЬНАЯ ТРАВМА)
- ДГПЖ/РАК ПРОСТАТЫ
- НЕЙРОГЕННЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (СД, СПИНАЛЬНАЯ ТРАВМА)

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ПРИЧИНЫ

- ЛС С АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ (АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
- ОПИАТЫ

- 10% ВСЕХ СЛУЧАЕВ ОПН
- ОБСТРУКЦИЯ НА РАЗНОМ УРОВНЕ:
 - ДИСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОБИРАТЕЛЬНЫХ КЛУБОЧКОВ (ПАПИЛЛЯРНЫЙ НЕКРОЗ)
 - МОЧЕТОЧНИКИ (ОБСТРУКЦИЯ ЗАБРЮШИННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ)
 - УРЕТРА (СТРИКТУРЫ)

ВЛИЯНИЕ ОПН НА ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ



ПОЧКИ И СЕРДЦЕ

Cardio-renal syndromes: report from the consensus conference of the Acute Dialysis Quality Initiative

Claudio Ronco^{1,2*}, Peter McCullough³, Stefan D. Anker^{4,5}, Inder Anand⁶, Nadia Aspromonte⁷, Sean M. Bagshaw⁸, Rinaldo Bellomo⁹, Tomas Berl¹⁰, Ilona Bobek¹, Dinna N. Cruz^{1,2}, Luciano Daliento¹¹, Andrew Davenport¹², Mikko Haapio¹³, Hans Hillege¹⁴, Andrew A. House¹⁵, Nevin Katz¹⁶, Alan Maisel¹⁷, Sunil Mankad¹⁸, Pierluigi Zanco¹⁹, Alexandre Mebazaa²⁰, Alberto Palazzuoli²¹, Federico Ronco¹¹, Andrew Shaw²², Geoff Sheinfeld²³, Sachin Soni^{1,24}, Giorgio Vescovo²⁵, Nereo Zamperetti²⁶, and Piotr Ponikowski²⁷ for the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) consensus group

КАРДИОРЕНАЛЬНЫЙ/РЕНОКАРДИАЛЬНЫЙ СИНДРОМЫ:

- ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ «ПЕРЕКРЕСТ» МЕЖДУ ПОЧКАМИ И СЕРДЦЕМ
- ОСТРОЕ/ХРОНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ДЕКОМПЕНСАЦИЯ ОДНОГО ОРГАНА ПРИВОДИТ/УСКОРЯЕТ РАЗВИТИЕ ОСТРОГО/ХРОНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ДРУГОГО ОРГАНА И НАОБОРОТ
- 5 ТИПОВ

• КЛЮЧЕВЫЕ ТИПЫ – I и III (+V)

ТИ ПЫ	I	II	III	IV	V
	ОСТРЫЙ КАРДИОРЕНАЛЬНЫ Й С-М	ХРОНИЧЕСКИЙ КАРДИОРЕНАЛЬНЫ Й С-М	ОСТРЫЙ РЕНОКАРДИАЛЬНЫ Й С-М	ХРОНИЧЕСКИЙ РЕНОКАРДИАЛЬНЫ Й С-М	ВТОРИЧНЫЙ КАРДИОРЕНАЛЬНЫ Й С-М
ПР ИЧ ИНЫ	<ul style="list-style-type: none"> ОДХСН ОКС кардиогенный шок 	<ul style="list-style-type: none"> ХСН КМП диастолическая дисфункция миокарда 	<ul style="list-style-type: none"> ОПН 	<ul style="list-style-type: none"> ХБП уремия 	<p><u>*зависит от заболевания</u></p> <ul style="list-style-type: none"> СД ГБ амилоидоз сепсис
КЛЮ ЧЕВ ЫЕ ФАК ТОР Ы ПАТ ОГЕ НЕЗ	<ul style="list-style-type: none"> острое снижение сократительной способности миокарда гипоперфузия 	<ul style="list-style-type: none"> хроническое снижение сократительной способности миокарда хроническая гипоперфузия 	<ul style="list-style-type: none"> острая гипернатриемия гиперволемия 	<ul style="list-style-type: none"> ГЛЖ фибротические процессы в миокарде и почках гиперволемия гипернатриемия 	любые системные факторы

ГИПЕРКАЛИЕМИЯ

НОРМА: 3,5 – 5,5 ммоль/л


- **ЛЕГКАЯ ГИПЕРКАЛИЕМИЯ: 5,5-5,9 ммоль/л**
- **УМЕРЕННАЯ ГИПЕРКАЛИЕМИЯ: 6,0-6,4 ммоль/л**
- **ТЯЖЕЛАЯ ГИПЕРКАЛИЕМИЯ: >6,5 ммоль/л**

ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИ ОПН:


- РАБДОМИОЛИЗ, TUMOR LYSIS SYNDROME
- КИН
- СЕПСИС
- ОЖОГИ, ГЕМОЛИЗ
- ОБСТРУКТИВНАЯ УРОПАТИЯ
- ПРИЕМ НЕФРОТОКСИЧЕСКИХ ЛС
- АЦИДОЗ?

ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЦЕ:

- **НАРУШЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ**
- **ПОДАВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО АВТОМАТИЗМА**



- **6 – нарушения реполяризации, постепенное подавление активности предсердий**
 - остроконечные T (>10 mm в V1-V6, > 6 mm в I-III, aVR, aVL, aVF), плоские P, расширение PR
- **7 – нарушения проведения, брадикардия**
 - расширение QRS
- **9 – глубокие S, слияние S и T, переход в идиовентрикулярный ритм**
- **>10 – арест через:**
 - асистолию
 - ФЖ
 - ЭМД с широкими комплексами



ПОДЪЕМ ST ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ

1 – ГЛЖ

2 – БЛНПГ

3- ОСТРЫЙ ПЕРИКАРДИТ

4 – ГИПЕРКАЛИЕМИЯ


5 – ОИМ

ПЕРЕДНЕПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ


6 – ОИМ

ПЕРЕДНЕПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ +
БЛНПГ


7 – С-М БРУГАДЫ



K⁺ 7,0



K⁺ 9,0,




II

aVL

V2

V5



III


aVF

V3

V6



RHYTHM STRIP: II
25 mm/sec; 1 cm/mV



K⁺ 9,9

Просмотр койки

Подключ./ Отсоед.


Настройки монитора

Данные пациента

Системные утилиты



BED12



K⁺ >10

ТЕРАПИЯ ГИПЕРКАЛИЕМИИ

ALS 2016

ABCDE → ЭКГ/ЭКМ → электролиты крови

ЛЕГКАЯ (5,5-5,9):

- подумать о причинах и необходимости лечения

СРЕДНЯЯ (6,0-6,4):

- ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ТЕЧЕНИЮ

ТЯЖЕЛАЯ (>6,5):

- НЕОТЛОЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ?

НЕ
Т

ДА

GLU 25 ГР + ИНСУЛИН 10
ЕД

САЛЬБУТАМОЛ
10-20 МГ
ИНГАЛЯЦИОННО

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 10% 30
МЛ
ИЛИ
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД 10% 10 МЛ

ГД?

МОНИТОРИНГ КАЛИЯ И ГЛЮКОЗЫ КРОВИ

ПОЧКИ И ЛЕГКИЕ

ГИПЕРВОЛЕМИЯ

ДИСРЕГУЛЯЦИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ (ENAC), АКВАПОРИНОВ, $Na^+-K^+-ATPase$

ОТЕК ЛЕГКИХ

(гидростатический + негидростатический)

УРЕМИЯ

УРЕМИЧЕСКИЙ ПНЕВМОНИТ

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА Ca^{2+} , P^{+} , МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

СЛАБОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ

ТРУДНОСТИ ПРИ ОТЛУЧЕНИИ ОТ ИВЛ

СВР

ПРЯМОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ

ЛЕГКИЕ И ПОЧКИ

- гиперкапния с гипоксемией
приводят к активации РААС
- проведение ИВЛ с повреждающими параметрами приводит к высвобождению провоспалительных медиаторов, вызывая СВР

Synergistic Effects of Acute Hypoxemia and Hypercapnic Acidosis in Conscious Dogs


Renal Dysfunction and Activation of the Renin-Angiotensin System

C. Edward Rose, Jr., David P. Kimmel, Richard L. Godine, Jr., Donald L. Kaiser, and Robert M. Carey

With the technical assistance of Nancy V. Ragsdale, Karren Y. Rose, Sharyn A. Sexton, Nancy A. Tisdale, and Elizabeth M. Yancy

From the Department of Internal Medicine, University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, Virginia


Figure 2. Representative Photomicrographs of the Lung and Kidney in Noninjurious and Injurious Groups



ПОЧКИ И ПЕЧЕНЬ


ГЕПАТОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

- 20% ВСЕХ СЛУЧАЕВ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ



- ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ЛОКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРОВ (NO)
- АРТЕРИАЛЬНАЯ ВАЗОДИЛАТАЦИЯ СПЛАНХНИЧЕСКОГО КРОВотоКА
- ↓ОПСС, ↓АД, ↑СВ, НЕСМОТРЯ НА АКТИВАЦИЮ РААС
 - ЭФФЕКТИВНАЯ

- КРОВОТЕЧЕНИЯ, ДИУРЕТИКИ, ЛАКТУЛОЗА-ИНДУЦИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ
- СЕПСИС



- ТРАНСЛОКАЦИЯ БАКТЕРИЙ
- ВЫБРОС ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ

ПОЧЕЧНАЯ ВАЗОКОНСТРИКЦИЯ, ВОСПАЛЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И

СНИЖЕНИЕ СКФ

ОПН

ПОЧКИ И ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

- ВБД ≥ 12 mm Hg \rightarrow ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
- СТОЙКОЕ ВБД ≥ 20 mm Hg \rightarrow АБДОМИНАЛЬНЫЙ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ

МЕХАНИЗМ

- почечное перфузионное давление = АД – ВБД \rightarrow **СНИЖЕНИЕ**

ПОЧЕЧНОГО КРОВотоКА


- острый канальцевый некроз
- передача давления на интерстициальное давление в почках и на давление в капсуле Боумена \rightarrow **СНИЖЕНИЕ ГРАДИЕНТА**

ФИЛЬТРАЦИИ

ПОЧКИ И ГОЛОВНОЙ МОЗГ

НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ГЭБ

- КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
- УРЕМИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
- АККУМУЛЯЦИЯ ЛС
- ОТЕК МОЗГА
- УГНЕТЕНИЕ СОЗНАНИЯ, СУДОРОГИ



ЭЭГ больного с уремической энцефалопатией. Отсутствие нормальной альфа-и бета-активности с преобладанием медленных тета- и дельта-волн

ПОЧКИ И ГЕМОСТАЗ

УРЕМИЧЕСКАЯ КОАГУЛОПАТИЯ

МЕХАНИЗМ:

- НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА (vWF)
- ПОДАВЛЕНИЕ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ ЧЕРЕЗ МНОЖЕСТВО МЕХАНИЗМОВ

КЛИНИКА:

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ДИАТЕЗ:

- КОНТАКТНАЯ КРОВОТОЧИВОСТЬ СЛИЗИСТЫХ РТА, НОСА
- ЭКХИМОЗЫ
- ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

ДИАГНОСТИКА:

- ↑ ВРЕМЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ (БОЛЬШЕ 7 МИН)
- N ЗНАЧЕНИЯ ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ
- N ПТВ И АЧТВ
- N / | ЧИСЛО ТРОМБОЦИТОВ

ТЕРАПИЯ:

- ДЕСМОПРЕССИН (ПЕРВАЯ ЛИНИЯ)
- ГЕМОДИАЛИЗ
- ТРАНСФУЗИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
- ИНГИБИТОРЫ ФИБРИНОЛИЗА (АКК, ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА)

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

УВЕЛИЧЕНИЕ КИСЛОТ КРОВИ СО СНИЖЕНИЕМ БИКАРБОНАТА ПЛАЗМЫ

ПРИЧИНЫ

РОСТ СИЛЬНЫХ КИСЛОТ

- ЭНДОГЕННЫЕ (НАПР. КЕТОНОВЫЕ КИСЛОТЫ)
- ЭКЗОГЕННЫЕ (НАПР. ИНФУЗИЯ NH₄CL)

ПОТЕРЯ ОСНОВАНИЙ

- КИШЕЧНИК (ДИАРЕЯ, ФИСТУЛЫ ТОНКОЙ КИШКИ)
- ПОЧКИ (ИНГИБИТОРЫ КАРБОАНГИДРАЗЫ, ПОЧЕЧНЫЙ КАНАЛЬЦЕВЫЙ АЦИДОЗ)


- НИЗКИЙ БИКАРБОНАТ
- ВЫСОКИЙ Cl⁻
- ВЫСОКИЙ ANION GAP
- ВЫСОКИЙ ЛАКТАТ
- СНИЖЕННЫЙ BE
- КЕТОНЫ
- МОЧЕВИНА+КРЕАТИНИН

КОМПЕНСАЦИЯ ДЛИТСЯ МАКСИМАЛЬНО
12-24 Ч

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

- КОМПЕНСАТОРНАЯ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЯ (ДЫХАНИЕ КУССМАУЛЯ)
- СДВИГ КРИВОЙ ОКСИГЕМОГЛОБИНА ВПРАВО



Kussmaul breathing

- Metabolic acidosis (Diabetes mellitus)
- Hyperpnoea
- K = Ketones (Diabetic ketoacidosis)
- U = Uremia
- S = Sepsis
- S = Salicylates
- M = Methanol
- A = Aldehydes
- (U)
- L = Lactic acid/Lactic acidosis

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

- АРИТМИИ
- СНИЖЕНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ МИОКАРДА
- ВАЗОДИЛАТАЦИЯ
- СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЦЕПТОРОВ К КАТЕХОЛАМИНАМ
- ВЕНОКОНСТРИКЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВЕН И ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ
- ГИПЕРКАЛИЕМИЯ

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ:

- НАТРИЯ БИКАРБОНАТ 8,4%
 - 0,3 X ВЕ X ВЕС
- УСТРАНИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ПРИЧИНУ

ДИАГНОСТИКА ОПН

АНАМНЕЗ

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ

- ПОКАЗАТЕЛИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА
- БИОМАРКЕРЫ
- ЭЛЕКТРОЛИТЫ МОЧИ

БИОПСИЯ ПОЧЕК

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

- УЗИ
 - ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, НИЗКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ
 - ОБСТРУКТИВНАЯ НЕФРОПАТИЯ
 - ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ОСТАТОЧНОЙ МОЧОЙ В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ
- УЗДГ
 - ПРЕРЕНАЛЬНАЯ vs РЕНАЛЬНАЯ ОПН
- РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
 - ВНУТРИВЕННАЯ УРОГРАФИЯ
 - АНТЕГРАДНАЯ/РЕТРОГРАДНАЯ ПИЕЛОГРАФИЯ
 - НАТИВНАЯ КТ
 - МРТ С КОНТРАСТОМ
 - ПОЧЕЧНАЯ АРТЕРИОГРАФИЯ

ЦВЕТ МОЧИ

<ul style="list-style-type: none">• ГИПОВОЛЕМИЯ (ПРЕРЕНАЛЬНАЯ ОПН)	ТЕМНО-ЖЕЛТАЯ	
<ul style="list-style-type: none">• ОСТРЫЙ КАНАЛЬЦЕВЫЙ НЕКРОЗ (ATN)	ТЕМНО-ЖЕЛТАЯ, ЯНТАРНАЯ	
<ul style="list-style-type: none">• ОСТРЫЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ (AIN)	ПО-РАЗНОМУ	
<ul style="list-style-type: none">• ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ	МУТНАЯ	
<ul style="list-style-type: none">• НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ	ПЕНИСТАЯ	
<ul style="list-style-type: none">• НЕФРИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ	КРАСНАЯ ИЛИ КОРИЧНЕВАЯ	

ДЕТАЛИ АНАМНЕЗА

АНАМНЕЗ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

→ **ГЕПАТОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ?**

КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3-Х ДНЕЙ

→ **КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ?**

НЕДАВНИЙ ПРИЕМ НЕФРОТОКСИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ

→ **ТОКСИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛС?**

СЫПЬ, ЛИХОРАДКА И/ИЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЭОЗИНОФИЛИЯ

→ **ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ОСТРЫЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ?**

ТРАВМА, РАБДОМИОЛИЗ

→ **МИОГЛОБИУРИЧЕСКОЕ ОПП?**

ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЯ

→ **ПРЯМОЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ?**

ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЯ + АНЕМИЯ

→ **МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА?**

ХИМИОТЕРАПИЯ

→ **ТОКСИЧНОСТЬ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И СИНДРОМ ЛИШКО**

Table 34.3 Urinary Measurements for the Evaluation of AKI

Measurement	Prerenal Disorder	Renal Disorder
Spot Urine Sodium	<20 mEq/L	>40 mEq/L
Fractional Excretion of Na	<1%	>2%
Fractional Excretion of Urea	<35%	>50%
Urine Osmolality	>500 mOsm/kg	300–400 mOsm/kg
U/P Osmolality	>1.5	1–1.3

$$FE_{Na} = \frac{\text{Urine Na}^+ \times \text{Serum Cr}}{\text{Serum Na}^+ \times \text{Urine Cr}}$$

ВОЗМОЖНА ЛОЖНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИ ПРИЕМЕ

ДИУРЕТИКОВ

$$FE_{Urea} = \frac{\text{Urine Urea} \times \text{Serum Cr}}{\text{Serum Urea} \times \text{Urine Cr}}$$

НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРИЕМА

ДИУРЕТИКОВ

АКТИВАЦИЯ РААС ВСЛЕДСТВИЕ ГИПОПЕРФУЗИИ → ↑ РЕАБСОРБЦИЯ Na⁺

• <20 mEq/l → ПРЕРЕНАЛЬНАЯ ОПН

ПРЕРЕНАЛЬНАЯ ОПН С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ Na⁺ В МОЧЕ:

- ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ДИУРЕТИКИ
- ПАЦИЕНТ С ХБП («ПОСТОЯННАЯ» ПОТЕРЯ НАТРИЯ С МОЧОЙ)




Fig. 9.1 Origin and function of novel AKI biomarkers (Modified from Ref. [3]). *Abbreviations:* AKI acute kidney injury, NGAL neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NAG N-acetyl- β -D-glucosaminidase, GST glutathione S-transferase, γ -GT γ -glutamyl transpeptidase, KIM-1 Kidney Injury Molecule-1, IL-18 interleukin 18, RBP retinol binding protein, L-FABP liver-type fatty acid-binding protein, IGFBP-7 insulin-like growth factor binding protein-7, TIMP-2 tissue metalloproteinase-3, HGF hepatocyte growth factor

МАРКЕРЫ СКОРОСТИ ПОЧЕЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

• мочеви́на (плазма)

- ↑ при повышенной белковой нагрузке, гиперкатаболизм (лихорадка, сепсис, прием ГКС)
- ↑ при снижении почечного кровотока (гиповолемия, СН)
- ненадежный маркер поражения почек

• креатинин (плазма)

- зависит от мышечной массы
- ↑ при рабдомиолизе, ↓ при сепсисе
- запаздывает за повреждением почки на 24-36 ч
- больше маркер дисфункции, чем повреждения

• цистатин С (плазма/моча)

- более чувствительный маркер СКФ
- более короткий период полувыведения

• NGAL (плазма/моча)

- рост в течение 1-3 ч после повреждения
- максимальный рост при поражении вследствие ишемии-реперфузии
- ренальная ОПН
- высокая чувствительность
- предиктор потребности в ЗПТ

• KIM-1

• ЦИТОКИНЫ МОЧИ (IL-6, IL-8, IL-18, TNF-α, PAF)

FUROSEMIDE STRESS TEST

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЛИГУРИЕЙ
- УСЛОВИЯ:
 - ДОСТИГНУТЫ АДЕКВАТНЫЕ АД И ВОЛЕМИЧЕСКИЙ СТАТУС
 - ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ ОЛИГУРИЯ

- 1,0 MG/KG БОЛЮС В/В (ЕСЛИ ФУРОСЕМИД РАНЕЕ НЕ ПРИМЕНЯЛСЯ)
- 1,5 MG/KG БОЛЮС В/В (ЕСЛИ ФУРОСЕМИД РАНЕЕ ПРИМЕНЯЛСЯ)

ДИУРЕЗ > 200 ML В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ



ПРЕРЕНАЛЬНАЯ ОЛИГУРИЯ



- ВОСПОЛНЕНИЕ ОЦК И СТАБИЛИЗАЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ МОГУТ ВОССТАНОВИТЬ ТЕМП ДИУРЕЗА
- ТЕМП ДИУРЕЗА МОЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОРГАННОЙ ПЕРФУЗИИ

ДИУРЕЗ < 200 ML В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ



РЕНАЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ



- НИЗКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИУРЕЗА НА ФОНЕ ИНОТРОПНОЙ, ВАЗОПРЕССОРНОЙ ИЛИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
- ТЕМП ДИУРЕЗА НЕИНФОРМАТИВЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРФУЗИИ

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ОПП

ПОВЫШЕНИЕ
РИСКА

1

2

3

Прекращение действия всех возможных нефротоксических агентов

Обеспечение нормоволемии и адекватного перфузионного давления

Обеспечение мониторинга гемодинамики

Контроль креатинина и диуреза

Избегать гипергликемии

Рассмотреть применение альтернативных (рентгенконтрастным) методов диагностики

Неинвазивные методы диагностики

Решение вопроса об инвазивных методах диагностики

Изменение дозы ЛС

Рассмотреть ЗПТ

Решение вопроса о переводе в ОРИТ

Избегать катетеризации подключичных вен



ПЕРВИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- **ИНФУЗИОННАЯ НАГРУЗКА**
 - КРИСТАЛЛОИДЫ – 500-1000 МЛ
 - КОЛЛОИДЫ – 300-500 МЛ (НЕЖЕЛАТЕЛЬНО) (2В)
- **ПРОДОЛЖАТЬ ПРИ ОТВЕТЕ НА ПРОБУ (↑ТЕМПА ДИУРЕЗА) ИЛИ ДО МОМЕНТА, КОГДА СОСТОЯНИЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ГИПЕРВОЛЕМИИ**
- **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИУРЕТИКИ ДО УСТРАНЕНИЯ ГИПОВОЛЕМИИ**
- **ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЕМА НЕФРОТОКСИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ**
- **ПОДДЕРЖАНИЕ НОРМОТЕНЗИИ (±ВАЗОПРЕССОРЫ, сАД 65-75 mmHg) [1С]**

СЕПСИС:

- **ИСПОЛЬЗОВАТЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ КРИСТАЛЛОИДЫ ВМЕСТО КОЛЛОИДОВ**
- **АЛЬБУМИН – МНОГО НЕОДНОЗНАЧНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ**
- **СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ПРИ РАННЕЙ ИНИЦИАЦИИ ЗПТ НЕ ДОКАЗАНО**

Honore et al. *Ann. Intensive Care* (2015) 5:51
DOI 10.1186/s13613-015-0095-3

 Annals of Intensive Care
a SpringerOpen Journal

REVIEW

Open Access



Prevention and treatment
of sepsis-induced acute kidney injury:
an update

Patrick M. Honore^{1*}, Rita Jacobs¹, Inne Hendrickx¹, Sean M. Bagshaw², Olivier Joannes-Boyau³, Willem Boer⁴,
Elisabeth De Waele¹, Viola Van Gorp¹ and Herbert D. Spapen¹

BAD MEDICINE

ФУРОСЕМИД

- НЕ УЛУЧШАЕТ ПОЧЕЧНУЮ ФУНКЦИЮ ПРИ ОПН
- НЕ ПЕРЕВОДИТ ОЛИГУРИЧЕСКУЮ ОПН В НЕОЛИГУРИЧЕСКУЮ
- ПОСТОЯННАЯ ИНФУЗИЯ – ВЫШЕ РИСК ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ НАРУШЕНИЙ
- ВЫШЕ СМЕРТНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ ГИПОВОЛЕМИИ
- ДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ГИПЕРВОЛЕМИИ (2С)

ПОЧЕЧНЫЕ ДОЗЫ ДОПАМИНА (5 µg/kg/min)


- НЕ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ЛЕТАЛЬНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ В ЗПТ

ФЕНОЛДОПАМ

- НЕ СНИЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ И 30-ДНЕВНУЮ ЛЕТАЛЬНОСТЬ.

The SPARK Study: a phase II randomized blinded controlled trial of the effect of furosemide in critically ill patients with early acute kidney injury

Sean M Bagshaw^{1*}, RT Noel Gibney¹, Finlay A McAlister², Rinaldo Bellomo³



critical care reviews

Bad Medicine*

Low-Dose Dopamine in the ICU

Cheryl L. Holmes, MD; and Keith R. Walley, MD

Original Investigation

Effect of Fenoldopam on Use of Renal Replacement Therapy Among Patients With Acute Kidney Injury After Cardiac Surgery: A Randomized Clinical Trial

Tiziana Bove, MD; Alberto Zangrillo, MD; Fabio Guarracino, MD; Gabriele Alvaro, MD; Bruno Persi, MD; Enivarco Maglioni, MD; Nicola Galdieri, MD; Marco Comis, MD; Fabio Caramelli, MD; Daniela C. Pasero, MD; Giovanni Pala, MD; Massimo Renzini, MD; Massimiliano Conte, MD; Gianluca Paternoster, MD; Blanca Martinez, MD; Fulvio Pinelli, MD; Mario Frontini, MD; Maria C. Zucchetti, MD; Federico Pappalardo, MD; Bruno Amantea, MD; Annamaria Camata, MD; Antonio Pisano, MD; Claudio Verdecchia, MD; Erika Dal Checco, MD; Claudia Cariello, MD; Luana Faia, MD; Rubia Baldassarri, MD; Anna M. Scandroglio, MD; Omar Saleh, MD; Rosalba Lembo, MSc; Maria G. Calabrò, MD; Rinaldo Bellomo, MD; Giovanni Landoni, MD

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ

МОМЕНТ ИНИЦИАЦИИ ЗПТ

РАННЕЕ НАЧАЛО:

- ЭКСТРЕННАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОГРЕССИИ КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
- БЫСТРАЯ КОРРЕКЦИЯ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЙ ГИПЕРВОЛЕМИИ И НАРУШЕНИЙ КОС
- ТЕМ НЕ МЕНШЕ НЕ УЛУЧШАЕТ ВЫЖ

<http://www.kidney-international.org>

© 2015 International Society of Nephrology

clinical trial

see commentary on page 670

Comparison of standard and accelerated initiation of renal replacement therapy in acute kidney injury

Ron Wald^{1,2}, Neill K.J. Adhikari³, Orla M. Smith^{2,4}, Matthew A. Weir⁵, Karen Pope⁶, Ashley Cohen⁶, Kevin Thorpe^{6,7}, Lauralyn McIntyre⁸, Francois Lamontagne⁹, Mark Soth¹⁰, Margaret Herridge¹¹, Stephen Lapinsky¹², Edward Clark¹³, Amit X. Garg⁵, Swapnil Hiremath¹³, David Klein^{2,6,14}, C. David Mazer^{2,15}, Robert M.A. Richardson¹⁶, M. Elizabeth Wilcox¹⁰, Jan O. Friedrich^{2,14}, Karen E.A. Burns^{2,14}, Sean M. Bagshaw¹⁷ on behalf of the Canadian Critical Care Trials Group

• ОТСРОЧЕННОЕ НАЧАЛО:

- МНОГИЕ ПАЦИЕНТЫ С ТЯЖЕЛОЙ ОПН УЛУЧШАЮТСЯ БЕЗ ЗПТ И ПОКАЗАНИЙ К НЕЙ (ПРЕ- И ПОСТРЕНАЛЬНАЯ)

• СТАРТ НА 2-3 СТ УХУДШАЕТ ВЫЖИВАЕМОСТЬ

• РАННЕЕ НАЧАЛО НЕ УЛУЧШАЕТ ВЫЖИВАЕМОСТЬ

• ???

• NO CONSENSUS

Table 5 | Clinical outcomes

	Accelerated RRT (n = 48)	Standard RRT (n = 52)	P-value
Death in ICU	13 (27)	16 (31)	0.69
Death in hospital	16 (33)	19 (37)	0.74
Death by day 90	18 (38)	19 (37)	0.92
Alive and dialysis dependent at day 90	0	2 (6)	0.16
Duration of ICU stay among survivors, days	11 (8–29.5)	13.5 (8–32)	0.93
Duration of hospitalization among survivors, days	29 (20–49)	31 (20–51)	0.93

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИНИЦИАЦИИ ЗПТ

ПОЧЕЧНЫЕ

- **ГИПЕРКАЛИЕМИЯ**

($K^+ > 6,0-6,5$ mmol/L) С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ЭКГ, РЕЗИСТЕНТНАЯ К КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ

- **МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ**

pH < 7,2, ЗАДЕРЖКА КИСЛОТ + ГИПЕРХЛОРЕМИЯ

- **ГИПЕРВОЛЕМИЯ**

С КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПЕРЕГРУЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ (ОТЕК ЛЕГКИХ, МОЗГА, ГИДРОПЕРИКАРД)

- **УРЕМИЯ**

МОЧЕВИНА > 36 ммоль/л - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ, ПЕРИКАРДИТ, КОАГУЛОПАТИЯ

НЕПОЧЕЧНЫЕ

- **ДЕТОКСИКАЦИЯ (ЯДЫ, ПЕРЕДОЗИРОВКА ЛС)**

- **ГИПЕРНАТРИЕМИЯ**

- **КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ**

- **СЕПСИС**


- **РАБДОМИОЛИЗ (ДО РАЗВИТИЯ ОПН)**

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ДИФФУЗИЯ

- ПРОЦЕСС ВЗАИМНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЕЩЕСТВ МЕЖДУ МОЛЕКУЛАМИ ДРУГ ДРУГА ЧЕРЕЗ ПОЛУПРОНИЦАЕМУЮ МЕМБРАНУ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ
- ДВИЖУЩАЯ СИЛА: ГРАДИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИЙ
- ВЕЩЕСТВА С МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ



ПРОЦЕДУРА: ДИАЛИЗ




КОНВЕКЦИЯ/УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ

- ПРОЦЕСС ДВИЖЕНИЯ ВЕЩЕСТВ/ВОДЫ ЧЕРЕЗ ПОЛУПРОНИЦАЕМУЮ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ ГРАДИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИЙ
- ДВИЖУЩАЯ СИЛА: ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ
- ВЕЩЕСТВА С ВЫСОКОЙ И СРЕДНЕЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ

ПРОЦЕДУРА: ФИЛЬТРАЦИЯ





• БОЛЬШИЕ
(5000-50000):
ФИЛЬТРАЦИЯ

• СРЕДНИЕ (500-5000)
ФИЛЬТРАЦИЯ


• МАЛЫЕ (<500):
ФИЛЬТРАЦИЯ ИЛИ
ДИАЛИЗ

МОДАЛЬНОСТЬ ЗПТ

	IHD ИНТЕРМИТТИРУЮЩИЙ ГЕМОДИАЛИЗ	CRRT ПРОДЛЕННАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, Ч	4-6 Ч 3 Р/НЕД	24
РЕЖИМЫ	HD	HD, HF, HDF
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<ul style="list-style-type: none">• АМБУЛАТОРНЫЕ БОЛЬНЫЕ С ХПН• ГИПЕРКАЛИЕМИЯ• БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ/ВЕЩЕСТВ• НЕ ТРЕБУЮТ АНТИКОАГУЛЯЦИИ	<ul style="list-style-type: none">• ПРИ НЕСТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКЕ• МЕМБРАНЫ ФИЛЬТРОВ ПОЗВОЛЯЮТ УДАЛЯТЬ СРЕДНИЕ МОЛЕКУЛЫ (ЦИТОКИНЫ, МЕДИАТОРЫ ВОСПАЛЕНИЯ)


CVVHF (ГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ)

- КОНВЕКЦИЯ
- ПОСТ-ДИЛЮЦИЯ (СТАНДАРТ)
- ЛУЧШИЙ КЛИРЕНС СРЕДНИХ МОЛЕКУЛ, ЦИТОКИНОВ И УРЕМИЧЕСКИХ ТОКСИНОВ
- ЛУЧШИЙ КЛИРЕНС МАЛЫХ МОЛЕКУЛ С ПОСТ-, НА 20% НИЖЕ – С ПРЕ
- СКОРОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ = СКОРОСТЬ УДАЛЕНИЯ



CVVHD (ГЕМОДИАЛИЗ)


- ДИФфуЗИЯ
- БЕЗ ДИЛЮЦИИ
- МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ МОЛЕКУЛЫ
- КРОВЬ И РАСТВОР ДВИЖУТСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРАДИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИЙ
- ЧЕМ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ГРАДИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИЙ



CVVHDF

(ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИЯ)


- КОНВЕКЦИЯ + ДИФфуЗИЯ
- ГЕМОДИАЛИЗ + ГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ (CVVHF+CVVHD)
- МАЛЫЕ, СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ МОЛЕКУЛЫ
- ПРЕ-, ПОСТ-, ПРЕ- + ПОСТ-



FRESENIUS
MULTIFILTRATE
CVVHDF
ПОСТ-ДИЛЮЦИЯ



СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП



МЕСТО КАТЕТЕРИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТ:

↓ ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЯРЁМНАЯ
ВЕНА


↓ БЕДРЕННАЯ ВЕНА (ЛЮБАЯ)

↓ ЛЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЯРЁМНАЯ
ВЕНА

↓ ПОДКЛЮЧИЧНАЯ ВЕНА С
ДОМИНАНТНОЙ СТОРОНЫ

РАСТВОРЫ

multiBic®	№ по каталогу	Na ⁺ ммоль/л	K ⁺ ммоль/л	Ca ⁺⁺ ммоль/л	Mg ⁺⁺ ммоль/л	Cl ⁻ ммоль/л	HCO ₃ ⁻ ммоль/л	Глюкозы моногидрат г/л	Теор. осмолярность	pH
2 ммоль/л K ⁺	F00007455	140	2,0	1,5	0,50	111	35	1,1	296	7,0–7,4
4 ммоль/л K ⁺	F00007457	140	4,0	1,5	0,50	113	35	1,1	300	7,0–7,4



- ГОТОВЫЕ МЕШКИ ОБЪЕМОМ 5 Л
- ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДЛЯ ДИАЛИЗАТА И СУБСТИТУАТА
- БУФЕР: ЛАКТАТ, БИКАРБОНАТ ИТД
 - ЛАКТАТ: ДЕШЕВЛЕ, АККУМУЛИРУЕТСЯ ПЕЧЕНЬЮ (ЛАКТАТ-АЦИДОЗ И НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО)


АНТИКОАГУЛЯЦИЯ

СИСТЕМНАЯ («АНТИКОАГУЛЯЦИЯ ПАЦИЕНТА»)

- НЕФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ГЕПАРИН
- НМГ

РЕГИОНАРНАЯ («АНТИКОАГУЛЯЦИЯ КОНТУРА»)

- ЦИТРАТ+КАЛЬЦИЙ
- ГЕПАРИН+ПРОТАМИН




Ci-Ca



- ПЕРЕД ФИЛЬТРОМ: ТРИНАТРИЯ ЦИТРАТ
- ПЕРЕД ПАЦИЕНТОМ: КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД

- СНИЖЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ
- СНИЖЕНИЕ РИСКА ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ТРАНСФУЗИЯМИ
- УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ФИЛЬТРА






Ci-Ca

Blood & Dialysate flow
➢ Selection of CVVHD-efficacy
➢ Adjustment of the acid-base status


Citrate dose
➢ Adjustment of the regional anticoagulation

Calcium dose
➢ Adjustment of the Ca balance




АНТИКОАГУЛЯЦИЯ

ГЕПАРИН
(НЕФРАКЦИОНИРОВАН
НЫЙ)




АДГЕЗИРОВАННЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ И НИТИ ФИБРИНА
НА ФОНЕ АНТИКОАГУЛЯЦИИ
ГЕПАРИНОМ

ГЕПАРИН
(НИЗКОМОЛЕКУЛЯР
НЫЙ)



ЦИТРА
Т



ПРАКТИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
КАПИЛЛЯРЫ
НА ФОНЕ АНТИКОАГУЛЯЦИИ
ЦИТРАТОМ

ЭЛЕКТРОННЫЕ МИКРОФОТОГРАФИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КАПИЛЛЯРОВ ФИЛЬТРА С
МЕМБРАНОЙ FRESenius POLYSULFONE®

ДОЗИРОВАНИЕ АМТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ CRRT

Table 1 Dose recommendations for some frequently used antimicrobials during CRRT, (CVVH mode; 25 ml/kg/h)

Antimicrobial	Loading dose	Maintenance dose
Amikacin	30–35 mg/kg	TDM
Meropenem	2 g	2 g over 3 h tid
Piperacillin-tazobactam	4 g/0.5 g	16 g/2 g (CI)
Vancomycin	35 mg/kg over 4 h	30 mg/kg (TDM = 25–30 mg/L)
Teicoplanin	15 mg/kg bid	600 mg od
Linezolid		600 mg tid
Ciprofloxacin	800 mg	400 mg tid
Tigecycline	150 mg	100 mg bid
Colistin	9 MIU	4,5 MIU tid
Voriconazole	8 mg/kg bid	6 mg/kg bid
Fluconazole		600 mg bid
Cefepime		2 g tid
Gentamycin		7 mg/kg od
Bactrim	1200 mg/240 mg (3amp)	800 mg/160 mg (2amp) tid
Clindamycin		900 mg qid

Adapted from references [105–113]

TDM therapeutic drug monitoring, *od* once daily, *bid* twice daily, *tid* three times daily, *qid* four times daily, *amp* ampules, *CI* continuous infusion, *MIU* million units

Honore et al. *Ann. Intensive Care* (2015) 5:51
DOI 10.1186/s13613-015-0095-3

 Annals of Intensive Care
a SpringerOpen Journal

REVIEW

Open Access




Prevention and treatment of sepsis-induced acute kidney injury: an update

Patrick M. Honore^{1*}, Rita Jacobs¹, Inne Hendrickx¹, Sean M. Bagshaw², Olivier Joannes-Boyau³, Willem Boer⁴, Elisabeth De Waele¹, Viola Van Gorp¹ and Herbert D. Spapen¹

АНТИМИКОТИКИ:

- АНИДУЛАФУНГИН (ЭРАКСИС) НЕ ДИАЛИЗИРУЕТСЯ, НЕ ТРЕБУЕТ КОРРЕКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗПТ



ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ

- ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ (МОДЕЛИРОВАНИЕ) ОРГАНОВ ДЕТОКСИКАЦИИ С ЦЕЛЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ РЯДЕ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

ПРИНЦИПЫ ЭЛИМИНАЦИИ ТОКСИНОВ

- КОНВЕКЦИЯ
- ДИФфуЗИЯ
- АДСОРБЦИЯ

Surviving Sepsis Campaign:
International Guidelines for Management
of Sepsis and Septic Shock: 2016





K. BLOOD PURIFICATION

1. We make no recommendation regarding the use of blood purification techniques.

ГИПОТЕЗА ПИКОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

Sepsis and CRRT: The Peak Concentration Hypothesis




CRRT: Continuous Renal Replacement Therapies


ЦИТОКИНОВЫЙ ГРАДИЕНТ

ДО
ПРОЦЕДУРЫ


Infected tissue (e.g., abdomen, lung)



ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУРЫ



Cytokine/chemokine
concentration gradient from
plasma to infected tissue




■ Bacteria + Cytokine ○ Leukocyte



- СYТOSORВ: ГРАНУЛЫ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА/ДИВИНИЛБЕНЗОЛА
- ЦИТОКИНЫ

- РМХ-В: ПОЛИМИКСИН, СВЯЗАННЫЙ КОВАЛЕНТНО С ВОЛОКНОМ
- ЭНДОТОКСИН

- ALTECO: СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД, СВЯЗАННЫЙ С ПОРИСТЫМИ ЛИСКАМИ



MULTIFILTRATE + ALTECO



AQUARIUS + CYTOSORB

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗПТ

- ЗПТ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАЩАТЬ, ЕСЛИ ОНА БОЛЕЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ИЛИ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ФУНКЦИЯ ПОЧЕК ВОССТАНОВИЛАСЬ ДО УРОВНЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОТРЕБНОСТЯМ ПАЦИЕНТА, ИЛИ, КОГДА ЗПТ БОЛЕЕ НЕ СОГЛАСУЕТСЯ С ЦЕЛЯМИ ТЕРАПИИ.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**