


ГАПОУ СО «БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Гнойничковые заболевания КОЖИ


Педикулез.■

Чесотка.■

Строение кожи



Поверхностая стрептодермия



Остиофолликулит (стафилококковое импетиго)



Фолликулит абсцедирующий



Фурункул



Карбункул



Эксфолиативный листовидный дерматит новорожденных



Эпидемическая пузырчатка новорожденных



Акне



Вульгарный сикоз



Гидроденит



Стрептококковое импетиго



Стрептококковый панариций



Стрептококковое импетиго(заеда)



Стрептококковая эктима



Стрептококковое импетиго



Стрептостафилококковое импетиго




Рожа




ПЕДИКУЛЕЗ



Лобковая вошь



Ресничная вошь



Лечение педикулеза



Укусы бельевых и головных вшей



Чесоточный клещ



Самка чесоточного клеща формирует в коже чесоточный ход, в котором откладывает по 2-4 яйца за ночь.


Личинки вылупляются через 2-4 дня и сразу начинают формировать ходы в самом верхнем слое кожи, вызывая зуд.



Перемещение клеща



Чесоточный ход



Лечение чесотки



**Спасибо за
внимание**