

Воспалительные заболевания

Классификация.

Воспалительные заболевания малого таза.

По уровню поражения

- Нижнего отдела полового аппарата
 - Бартолинит
 - Остроконечные кондиломы
 - Вульвовагинит
 - Псевдоэрозия шейки матки
- Верхнего отдела полового тракта
 - Эндометрид
 - Сальпингоофорит
 - Тубоовариальное образование
 - Параметрид
 - Пельвиоперитонит



По течению

- Острые до 2 недель
- Подострые от 2 недель до 2 месяцев
- Хронические более 2 месяцев

По характеру возбудителя

- Специфической этиологии (гонорея, туберкулез и т.д)
- Неспецифической этиологии

Хронические воспалительные болезни матки

По течению

- Острое
- Подострое
- Хроническое

Сальпингит и оофорит

По клиническому течению

- Острый
- Подострый
- Хронический

По этиологии

- Специфический
- Неспецифический

Другие невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки

Функциональные кисты

- Фолликулярные
- Кисты желтого тела

Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы

Вульвовагиниты

По клинической стадии

- Острые не больше 1 месяца
- Подострые до 3 месяцев
- Хронические больше 3 месяцев

По этиологии

- Специфические
- Неспецифические
- Первичные неспецифические вызваны непосредственным воздействием на гениталии физических, термических, химическим, инфекционных факторов
- Вторичные неспецифические являются следствием общего или местного заболевания.



Лечение

Правильное ведение больных с ВЗОМТ
требует обследования и лечения всех
половых партнеров.

Лечение

□ Антибактериальная терапия

1. При амбулаторном лечении назначают

Доксициклин по 150 мг 1 раз в сутки или по 100 мг 2 раз в течение 10 дней

Азитромицин 500 мг в сутки

Клиндомицин 600 мг каждые 8 часов

2. После исключения хламидийной и гонорейной инфекции лечение в комбинации

Цефалексина по 500 мг и

Метронидазола по 400 мг 3 раз в сутки

3. При подозрении на гонорейную инфекцию

Норфлоксацин 800 мг или

Ципрофлоксацин 500 мг однократно

Затем продолжить лечение доксициклином по 150 мг 1 раз в сутки 10 дней

4. Профилактика и лечение кандидоза

Интраконазол 200 мг в сутки 14 дней или

Флуконазол 100 мг в неделю 6 месяцев