




Строение атмосферы Солнца

План урока

- ◆ Фотосфера
- ◆ Активные образования в фотосфере
- ◆ Хромосфера
- ◆ Активные образования в хромосфере
- ◆ Солнечная корона
- ◆ Солнечная активность



Строение атмосферы Солнца





Атмосфера Солнца

- Фотосфера
- Хромосфера
- Солнечная корона

Фотосфера –

нижний слой атмосферы толщиной **300-400 км**. Плотность фотосферы **10^{-4} кг/м³**. Температура растёт с глубиной, в среднем она близка к **6000 К**.



- ❖ Имеет гранулированное строение. Размер гранул в среднем **несколько сотен километров**. Время жизни – около **8 мин**.
- ❖ Гранулы – вершины конвективных потоков, идущих из недр Солнца.



Активные образования фотосферы

ПЯТНА

- состоят из **ядра** и **полутени**. Средний диаметр – десятки тысяч километров. Время существования – от нескольких дней до нескольких месяцев. Температура ядра пятна **4000 К**. Причина возникновения – действие **сильных магнитных полей** в области пятен.




Активные образования фотосферы

ФОТОСФЕРНЫЕ ФАКЕЛЫ




- Детали более светлые, а значит более горячие, чем фотосфера. Факелы возникают незадолго до появления солнечных пятен и существуют в среднем втрое дольше.




Хромосфера –

- Простирается до высоты **10-14 тыс.км.** В её нижних слоях температура около **5000 К**, в верхних слоях – **$2 \cdot 10^4$ – $5 \cdot 10^4$ К.** Имеет ячеистое строение, образуя сетку, размеры ячеек которой достигают **30-50 тыс.км.**



Активные образования хромосферы

ХРОМОСФЕРНЫЕ ФАКЕЛЫ



- Наиболее яркие участки хромосферы, которые расположены над фотосферными факелами и пятнами.

Активные образования хромосферы

ХРОМОСФЕРНЫЕ ВСПЫШКИ



- Самые мощные и быстроразвивающиеся процессы. В ходе развития вспышки сначала увеличивается яркость небольшого участка хромосферы, а затем становится яркой область, охватывающая десятки миллиардов квадратных километров.

ХРОМОСФЕРНЫЕ ВСПЫШКИ

- Слабые вспышки исчезают через **5-10 мин**, а самые мощные продолжаются несколько часов. Небольшие вспышки происходят по несколько раз в сутки, мощные наблюдаются значительно реже.





Активные образования хромосферы


ПРОТУБЕРАНЦЫ

- – гигантские яркие выступы или арки, как бы опирающиеся на хромосферу и врывающиеся в солнечную корону, видны на краю солнечного диска. Спокойные протуберанцы существуют несколько недель и даже месяцев.



Солнечная корона

- Корона простирается на расстоянии нескольких солнечных радиусов. Температура короны 10^6 К. Состояние вещества – высокотемпературная плазма.



Солнечная активность



- Комплекс нестационарных образований в атмосфере Солнца (пятна, факелы, протуберанцы, вспышки...) называется **солнечной активностью**.

- Имеет **11-летний цикл**. В годы максимума на Солнце много центров активности (возмущённое Солнце)



Об авторе

- **Тарапата Ирина Гурьевна**
- **Учитель физики**
- **Заклинской средней школы**
- **Лужского района**
- **Ленинградской области**

