


Здравствуйте!

Лекция №5

§ 17. Вычисление площадей и объемов

17.1. Площадь криволинейной трапеции



Рассмотрим фигуру, называемую **криволинейной трапецией**. Ее границами являются: ось Ox (внизу), прямые $x=a$ (слева) и $x=b$ (справа) и кривая $y=f(x)$ (сверху) (см. рис.).

Разобьем отрезок $[a, b]$ на части $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ и пусть $m_i = \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$ и $M_i = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$. Составим величины

$P_* = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i$ и $P^* = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i$, в которых узнаем верхние и нижние


суммы Дарбу. Величины $I_* = \lim_{\lambda \rightarrow 0} P_*$ и $I^* = \lim_{\lambda \rightarrow 0} P^*$ называются

внутренней и внешней площадями криволинейной трапеции. Если выполняется равенство $I_* = I^* = P$, то их общее значение и называется площадью криволинейной трапеции.


Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$, то, вспоминая теорию определенного интеграла, можно записать

$$P = \int_a^b f(x) dx,$$


что и определяет площадь криволинейной трапеции.



Так как площадь не может быть отрицательной, то в этом случае




В этом случае очевидно, что



Наконец, в этом случае .


Учебный пример:

$$\begin{aligned} ax &= y^2; & ay &= x^2; \\ y &= \pm\sqrt{ax}; & y &= \frac{x^2}{a}; \\ \sqrt{ax} &= \frac{x^2}{a}; & x &= 0; \quad x = a; \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} S &= \int_0^a \left| \sqrt{ax} - \frac{x^2}{a} \right| dx = \int_0^a \left(\sqrt{ax} - \frac{x^2}{a} \right) dx = \sqrt{a} \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^a - \frac{x^3}{3a} \Big|_0^a = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{a} \cdot a^{3/2} - \frac{a^2}{3} = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) a^2 = \frac{a^2}{3} \end{aligned}$$

17.2. Площадь криволинейного сектора



Рассмотрим кривую $r = r(\theta)$, заданную в полярных координатах. Соединим концы кривой прямыми линиями с полюсом системы координат. Получившаяся фигура называется криволинейным сектором.


Разобьем отрезок $[\alpha, \beta]$ на части $\alpha = \theta_0 < \theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_{n-1} < \theta_n = \beta$ и пусть $\lambda = \max_i \Delta\theta_i$. Пусть далее $r_i = \inf_{\theta \in [\theta_i, \theta_{i+1}]} r(\theta)$ и $R_i = \sup_{\theta \in [\theta_i, \theta_{i+1}]} r(\theta)$.

Построим величины $P_* = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} r_i^2 \Delta\theta_i$ и $P^* = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} R_i^2 \Delta\theta_i$, имеющие смысл внутренней и внешней площадей криволинейного сектора. Если $\lim_{\lambda \rightarrow 0} P_* = \lim_{\lambda \rightarrow 0} P^* = P$, то величина P называется площадью криволинейного сектора. Если функция $r(\theta)$ интегрируема на $[\alpha, \beta]$, то

$$P = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$

Пример. Вычислить площадь круга, полукруга, четверти круга.

17.3. Объем тела вращения



Представим себе, что имеется кривая $y = f(x)$, заданная на отрезке $[a, b]$. Пусть эта кривая **вращается** около оси Ox . Получающееся тело называется **телом вращения**

Разобьем отрезок $[a, b]$ на части $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ и определим $m_i = \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$ и $M_i = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$. На каждом отрезке

построим **цилиндр** с радиусом основания m_i и высотой Δx_i . Все эти цилиндры будут **вписаны** в наше тело вращения и их общий объем

будет равен $V_* = \sum_{i=0}^{n-1} \pi m_i^2 \Delta x_i$.


Далее, на каждом отрезке построим **цилиндр** с радиусом основания M_i и высотой Δx_i . Все эти цилиндры будут **описаны** около нашего тела вращения и их общий объем будет равен

$V^* = \sum_{i=0}^{n-1} \pi M_i^2 \Delta x_i$.

Если $\lim_{\lambda \rightarrow 0} V_* = \lim_{\lambda \rightarrow 0} V^* = V$, то величина V называется объемом тела вращения. Если функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$, то очевидно, что

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Пример. Объём шара



Очевидно, что шар получается вращением полуокружности около оси Ox . Поэтому объём шара

§.18. Несобственные интегралы первого рода

Пусть

1. функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, +\infty)$;

2. $\forall A > a$ существует $\int_a^A f(x)dx$.

Произведем теперь предельный переход $A \rightarrow +\infty$. Тогда

$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx$ называется **несобственным интегралом первого рода**

и обозначается символом $\int_a^{\infty} f(x)dx$:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx = \int_a^{\infty} f(x)dx.$$

Если этот предел **существует и конечен**, то говорят, что несобственный интеграл **сходится** (или: **существует**). Если этот предел равен **бесконечности** или вообще **не существует**, то говорят, что несобственный интеграл **расходится** (или: **не существует**).

Совершенно аналогично определяются и следующие несобственные интегралы первого рода:

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^a f(x)dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^a f(x)dx + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx \quad (a - \text{любое}).$$

Простейшие свойства несобственных интегралов первого рода

1. Если сходится $\int_a^{\infty} f(x)dx$, то $\forall b > a$ сходится и $\int_b^{\infty} f(x)dx$.

Наоборот, если $\int_b^{\infty} f(x)dx$ сходится и существует $\int_a^b f(x)dx$, то сходится

и $\int_a^{\infty} f(x)dx$. При этом верно соотношение

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{\infty} f(x)dx.$$

Доказательство. Пусть $A > b > a$. Тогда имеем

$$\int_a^A f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^A f(x)dx.$$

Сделаем предельный переход $A \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_b^A f(x)dx.$$

Так как предел слева существует, то существует и предел справа и $\int_b^{\infty} f(x)dx$ сходится и соотношение принимает вид

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{\infty} f(x)dx.$$

Подумайте сами, что надо изменить в предыдущей фразе, чтобы доказать обратное утверждение.

2. Если $\int_a^{\infty} f(x)dx$ сходится, то $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^{\infty} f(x)dx = 0$

Доказательство.

Согласно предыдущему пункту

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \int_a^A f(x)dx + \int_A^{\infty} f(x)dx$$

Отсюда

$$\int_A^{\infty} f(x)dx = \int_a^{\infty} f(x)dx - \int_a^A f(x)dx.$$

Делая предельный переход $A \rightarrow +\infty$, получаем

$$\begin{aligned} \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^{\infty} f(x)dx &= \int_a^{\infty} f(x)dx - \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx = \\ &= \int_a^{\infty} f(x)dx - \int_a^{\infty} f(x)dx = 0. \end{aligned}$$

3. Если сходятся $\int_a^{\infty} f(x)dx$ и $\int_a^{\infty} g(x)dx$, то сходится также и

$\int_a^{\infty} (f(x) \pm g(x))dx$ и верно соотношение

$$\int_a^{\infty} (f(x) \pm g(x))dx = \int_a^{\infty} f(x)dx \pm \int_a^{\infty} g(x)dx.$$

Доказательство. Имеем

$$\int_a^A (f(x) \pm g(x))dx = \int_a^A f(x)dx \pm \int_a^A g(x)dx.$$

Делая предельный переход $A \rightarrow +\infty$, получаем

$$\begin{aligned} \int_a^{\infty} (f(x) \pm g(x))dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A (f(x) \pm g(x))dx = \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx \pm \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A g(x)dx = \int_a^{\infty} f(x)dx \pm \int_a^{\infty} g(x)dx. \end{aligned}$$

4. Если сходится $\int_a^{\infty} f(x)dx$ и c – константа, то сходится и $\int_a^{\infty} cf(x)dx$ и

верна формула

$$\int_a^{\infty} cf(x)dx = c \int_a^{\infty} f(x)dx.$$

Доказательство. Имеем

$$\int_a^A cf(x)dx = c \int_a^A f(x)dx.$$

Делая предельный переход $A \rightarrow +\infty$, получаем

$$\int_a^{\infty} cf(x)dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A cf(x)dx = c \cdot \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx = c \int_a^{\infty} f(x)dx.$$