


Редкие вымирающие рыбы

Занесенные в красную книгу

Белуга азовская

- Бассейн [Азовского моря](#), откуда для размножения поднимается в реки. Основной нерестовой рекой был [Дон](#), по которому, судя по археологическим материалам, доходила почти до верховьев. В Кубань ее шло значительно меньше. Зарегулирование стока Дона Цимлянской плотиной и Кубани Федоровским гидроузлом отрезало практически все нерестилища азовской белуги.



Берш, волжский судак

- В России вид обитает в басс. рр. [Волга](#), Урал, Дон, Терек, Сулак и Самур, иногда встречается в опресненных предустьевых зонах [Каспийского моря](#). В р. Урал, которая является вост. границей ареала вида, встречается в среднем течении, а также в притоках Сакмара и Илек. В 1957-1959 гг. в результате случайной интродукции попал из р. Урал в оз. Балхаш, где к началу 70-х гг. натурализовался.



Быстрянка русская



- Описана из р. [Кама](#). Обитает в басс. Днестра, Южного Буга, [Днепра](#), Дона и Волги. В России встречается в басс. Днепра на территориях Смоленской (р. Днепр), Брянской (р. Снов) и Курской (р. Сейм) обл.; в басс. Дона отмечена на территории Воронежской обл. в р. [Хопер](#); в басс. Волги в рр. Москва, Кама, [Вятка](#), Протва, некоторых притоках Камы, ниже Камы неизвестна (за исключением р. Самары). Возможно, к этому же подвиду относится быстрянка басс. Кубани (рр. Кубань, [Белая](#), Пшеха, Лаба), таксономический статус которой остается дискуссионным.

Валек карликовый



- Основная часть ареала вида находится в Сев. Америке и имеет мозаичный характер (р-н п-ова Аляска, Британская Колумбия, оз. Верхнее из системы Великих озер). В России, где впервые обнаружен в 1989 г., обитает на Чукотском п-ове в басс. р. [Амгуэмы](#), в частности в оз. Экитыки, Безымянное, [Гольцовое](#), Равкэргыгытгын. Все озера крупные и глубокие (до 40 м), тектонического или ледникового происхождения.