


Разложение вектора по двум  
неколлинеарным векторам.  
Координаты вектора.  
9 класс





Разложение  
вектора по  
двум  
неколлинеарны  
м векторам

Если векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  коллинеарны и  $\vec{a} \neq \vec{0}$ , то существует такое число  $k$ ,  
что  $\vec{b} = k\vec{a}$



Любой вектор можно представить как  
результат сложения двух  
неколлинеарных векторов (сумма по  
правилу параллелограмма), т. е.  
разложить по двум неколлинеарным








Чтобы разложить вектор по двум векторам надо:

- 1) отложить все три вектора от одной точки;
- 2) достроить до параллелограмма;
- 3) вычислить значения  $k$  для каждого вектора

Задание: разложите векторы  $\vec{x}$  и  $\vec{y}$  по векторам  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$






3)  $\vec{b}$  остался без изменений  
 $\vec{a}$  умножили на (-2)

$$\vec{x} = \vec{b} - 2 \vec{a}$$








3)  $\vec{b}$  умножили на 1,5  
 $\vec{a}$  умножили на 2       $\vec{y} = 2\vec{a} + 1,5\vec{b}$

# Координаты вектора



Координатные векторы  $i$  и  $j$  – единичные векторы (длина равна 1);  $i$  – по оси  $Ox$ ,  $j$  – по оси  $Oy$



# Любой вектор можно разложить по координатным векторам




# Коэффициенты разложения называются координатами вектора




1. Каждая координата суммы  
векторов равна сумме  
соответствующих координат

$$\vec{a} \{2;3\} + \vec{b} \{1;4\} = \vec{c} \{3;7\}$$



2. Каждая координата разности векторов равна разности соответствующих координат  $\vec{a} \{2;3\} - \vec{b} \{1;4\} = \vec{c} \{1;-1\}$

$$\begin{array}{r} \{2;3\} \\ - \{1;4\} \\ \hline \{1;-1\} \end{array}$$



3. Каждая координата произведения вектора на число равна произведению соответствующей координаты на это число  
если  $\vec{a} \{2;5\}$ , то  $-4\vec{a} \{-8;-20\}$



Задание: найти координаты

вектора  $\vec{p} = 2\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b} + \vec{c}$ ,

если  $\vec{a} \{1; -2\}$ ,  $\vec{b} \{0; 3\}$ ,  $\vec{c} \{-2; 3\}$

1)  $2\vec{a} \{1*2; -2*2\}$ ,  $2\vec{a} \{2; -4\}$

2)  $-\frac{1}{3}\vec{b} \{0*(-1/3); 3*(-1/3)\}$ ,

$-\frac{1}{3}\vec{b} \{0; -1\}$

3)  $\vec{c} \{-2; 3\}$

4)  $\vec{p} \{2+0-2; -4-1+3\}$ ,  $\vec{p} \{0; -2\}$