

Роль *Bacillus cereus*
В ЭТИОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ
отравлений

Представители рода *Bacillus*:

- *Bacillus anthracis* – сибирская язва
- *Bacillus cereus*
- *Bacillus mycoides*,
- *Bacillus pseudomycoides*,
- *Bacillus thuringiensis*
- *Bacillus sphaericus*

Заболевания связанные с *Bacillus cereus*

- локальные инфекции, особенно в области ожогов, травматических и послеоперационных ран и инфекции глаза;
- бактериемия и септицемия
- инфекции ЦНС, включая менингиты, абсцессы и инфекции, связанные с шунтированием
- респираторные инфекции
- эндокардиты и перикардиты
- пищевые токсико-инфекции, характеризующиеся токсин-индуцированной рвотой и диареей.

Источники заражения

- Диапазон продуктов, из которых могут быть выделены *Bacillus cereus*, довольно велик: рис, молочные продукты, специи, сушеные продукты и овощи.
- Перекрестное загрязнение может привести к распространению спор или вегетативных форм в другие продукты, например мясо.
- В период сбора урожая, в областях производства продуктов питания, споры *B. cereus* могут контаминировать растительное сырье и оборудование, применяемое в пищевой промышленности.
- К примеру, во время выпаса крупного рогатого скота споры *B. Cereus* из окружающей среды попадают на вымя коров, вследствие чего клетки *B. Cereus* – часто выделяют из молока, которое приобретает специфический дефект известный как сладкое коагулирование.


Морфологические свойства

Гр(+) крупные палочки

1,0-1,2 x 3,0-5,0 мкм

Эндоспоры

Перитрихиальные жгутики



Бактерии морфологически сходны с *Bacillus anthracis*, но **обладают подвижностью**

Культуральные свойства



Рост *Bacillus cereus* на МПА через 48 часов



Рост *B. cereus* на кровяном агаре, видна зона гемолиза



Рост *B. cereus* на среде с полимиксином В и ТТХ



Рост *B. cereus* на желточном агаре




Рост *B. cereus* на среде Донована



Рост *B. cereus* на полимиксиновой среде



Рост *B. cereus* на среде
Мосселя



Рост *B. cereus*
на солевом
полимиксиновом
агаре с ТТХ



Факторы патогенности

- Фосфолипаза
- Гемолизин (*HBL*)
- Негемолитический энтеротоксин (*NHE*)
- Цитотоксин К (*CytK*)
- Рвотный токсин (*Cereulide*)

Cereulide, рВОТНЫЙ ТОКСИН

- циклический пептид
- [D-O -Leu- D-Ala- D-O- Val- D-Val]₃
- молекулярной масса 1,2 кДа
- Синтез *Cereulide* связан с действием нерибосомальной синтетазы, кодируемой 24-кБ кластером генов *cereulide*-синтетазы (*CES*).
- Кластер расположен на мегаплазмиде, связанной с *pXO1*
- Синтез не связан со споруляцией

Методы обнаружения

Классический метод

Метод основан на выделении *Bacillus cereus* из колоний, полученных при поверхностном посеве продукта или его разведения на селективные среды. Принадлежность выделенных колоний к *Bacillus cereus* определяют по морфологическим и биохимическим свойствам [ГОСТ 10444.8-88].

(Агар Мосселя желточный с маннитом, полимиксином и феноловым красным)

Альтернативные (ускоренные) методы

Один из основных энтеротоксинов *B. Cereus* – *HBL* состоит из 3-х пептидов (связывающего и двух литических). Детекцию *HBL*-токсина методом ИФА используют в качестве критерия токсигенности исследуемого штамма. Установлено, что от 41 до 49% изолятов *Bacillus cereus* синтезируют *HBL*.

Иммунохроматографический экспресс-тест

обнаружение энтеротоксинов

HBL (гемолизин BL) и *NHE* (негемолитический энтеротоксин) *Bacillus cereus* в пищевых продуктах



Выделение *Bacillus cereus*





Рис. 48 Выделение бактерий вида *Bacillus cereus* традиционной схемой бактериологического исследования


Чувствительность к АМП




Процент промежуточной и полной устойчивости р. Bacillus к антимикробным препаратам [20]. (AMX, amoxicillin; AMP, ampicillin; CRO, ceftriaxone; CHL, chloramphenicol; CIP, ciprofloxacin; CLI, clindamycin; CLR, clarithromycin; DAP, daptomycin; ERY, erythromycin; GAT, gatifloxacin; GEN, gentamicin; LVX, levofloxacin; LZD, linezolid; MEM, meropenem; MXF, moxifloxacin; OXA, oxacillin; PEN, penicillin; Q/D, quinupristin/dalfopristin; RIF, rifampicin; STR, streptomycin; TET, tetracycline; TGC, tigecycline; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole; VAN, vancomycin. n; OXA, oxacillin; PEN, penicillin; Q/D, quinupristin/dalfopristin; RIF, rifampicin; STR, streptomycin; TET, tetracycline; TGC, tigecycline; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole; VAN, vancomycin.

Заключение:

1. *Bacillus cereus* входит в список 10 основных инфекционных агентов, вызывающих кишечные заболевания людей, наряду с *E. coli*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.*, *Campilobacter sp.*, *Enterococcus sp.*, *S. aureus* и т.д.. По мнению W. Sperber (1991) *B. cereus* входят в группу из 4-х наиболее опасных микроорганизмов – источников пищевого отравления людей.
2. *B. cereus* — спорообразующий аэробный микроорганизм, является постоянным обитателем почвы, в связи с чем он широко распространен в объектах внешней среды.
3. Установлено, что в развитии *B. cereus* отсутствует избирательность к отдельным пищевым продуктам. Он в равной мере может размножаться в пищевых продуктах растительного и животного происхождения, не вызывая при этом органолептических изменений.
4. Основные факторы патогенности *Bacillus cereus* связаны с выделением разрушающих ткани экзоферментов: гемолизинов, фосфолипаз, токсина вызывающего рвоту (*Cereulide*) и порообразующих энтеротоксинов (hBl, nhe, и цитотоксина К).
5. Сложные и трудоемкие методы лабораторной идентификации *B. cereus* затрудняют получение исчерпывающей информации об истинной роли вышеуказанного вида в возникновении пищевых отравлений.



Спорообразующая культура, выделенная с разделочной доски



Спасибо за внимание!