# Линейная алгебра

## Матрицы. Основные определения

**Определение:**

Прямоугольная таблица чисел, заключенная в круглые скобки и содержащая $m$ горизонтальных строк и $n$ вертикальных столбцов, т.е.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad A = (a_{ij})_{m \times n}$$

называется *матрицей* $A$, где $a_{ij}$ — *элемент матрицы* ($i$ — номер строки; $j$ — номер столбца), произведение $m \times n$ числа строк на число столбцов называют *размером матрицы* $A$

**Замечание:**

Матрицы обозначают заглавными буквами латинского алфавита $A$, $B$, $C$, …, элементы матрицы соответственно строчными буквами с двойной индексацией $a_{ij}$, где $i$ — номер строки; $j$ — номер столбца.

**Пример:**

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ элемент $a_{12} = 2$ , элемент $a_{23} = 6$

**Определение:**

Две матрицы $A$ и $B$ одинаковой размерности называются *равными между собой* $A = B$ , если все соответствующие их элементы равны, т.е. $a_{ij} = b_{ij}$

**Замечание:**

Матрицы разных размерностей не сравниваются между собой.

# Виды матриц

**1.** Матрица, у которой одна строка называется *матрицей-строкой*.

**Пример:** $D = (5 \quad 6 \quad 3 \quad -7)$.

**2.** Матрица, у которой один столбец называется *матрицей-столбцом*.

**Пример:** $K = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix}$.

**3.** Матрица, у которой количество строк равно количеству столбцов $(m = n)$ называется *квадратной матрицей n-го порядка*.

**Пример:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 5 & -6 \end{pmatrix}$ — квадратная матрица второго порядка,

$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ — квадратная матрица третьего порядка.

**Определение:**

Элементы $a_{11}$, $a_{22}$, $a_{33}$, …, $a_{nn}$ квадратной матрицы образуют ее *главную диагональ*, а элементы $a_{1n}$, $a_{2(n-1)}$, …, $a_{n1}$ — *побочную диагональ*.

**Пример:** $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ элементы 1; 5; 9 образуют главную диагональ, элементы 7; 5; 3 — побочную диагональ.

**Определение:**

Матрица $A^T$ называется *транспонированной матрицей* к матрице $A$, если в исходной матрице поменять местами строки и столбцы.

**Пример:** $D = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 & 6 \\ 3 & 7 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, $D^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \\ -2 & 4 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$

**4.** *Нулевой* называется матрица произвольного размера, все элементы которой равны нулю:

**Пример:** $O=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $O=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ — нулевые матрицы второго и третьего порядка.

**5.** *Диагональной матрицей* называется квадратная матрица, у которой все элементы, не лежащие на главной диагонали, равны нулю

**Пример:** $D=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$.

**6.** *Единичной матрицей* называется диагональная матрица, у которой элементы, лежащие на главной диагонали равны единице

**Пример:** $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ соответственно второго и третьего порядка.

**7.** *Симметричной матрицей* называется квадратная матрица, у которой элементы, расположенные симметрично относительно главной диагонали, равны:

**Пример:** $C=\begin{pmatrix}1 & -5 & -7\\ -5 & 2 & -9\\ -7 & -9 & 3\end{pmatrix}$ — симметричная матрица.

**8.** *Кососимметричной матрицей* называется квадратная матрица, у которой элементы, расположенные симметрично относительно главной диагонали, противоположны:

**Пример:** $K = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 5 & 2 & -9 \\ -7 & 9 & 3 \end{pmatrix}$ — кососимметричная матрица.

**Замечание:**

| |
|---|
| Для симметричной матрицы $A^T = A$. |
| Для кососимметричной матрицы $A^T = -A$. |

**9.** *Треугольной матрицей* называется квадратная матрица, у которой все элементы, расположенные «под (или над) главной диагональю» равны нулю

**Пример:** $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 8 & 3 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ — верхняя треугольная матрица;

$B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & -2 & 0 & 0 \\ -7 & 6 & 4 & 0 \\ 8 & -5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ — нижняя треугольная матрица.

**10.** *Ступенчатой* называется *матрица*, удовлетворяющая следующим условиям:

1. если эта матрица содержит нулевую строку (т.е. строку, все элементы которой равны нулю), то все строки, расположенные под нею, также нулевые;
2. если первый ненулевой элемент некоторой строки расположен в столбце с номером $i$, то первый ненулевой элемент следующей строки должен находиться в столбце с номером большим, чем $i$.

**Пример:**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & -9 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad N=\begin{pmatrix} -5 & 3 & 6 & 7 & -1 \\ 0 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 13 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

# Арифметические операции над матрицами

*Линейные операции над матрицами*

## *1. Сумма (разность) матриц*

**Замечание:**

*Сложение* (*вычитание*) *матриц* определяется только для матриц *одинаковой размерности.*

**Определение:**

*Суммой* (*разностью*) двух матриц $A=(a_{ij})$ и $B=(b_{ij})$ одинакового размера называется матрица $C$ того же размера, каждый элемент которой равен сумме (*разности*) соответствующих элементов матриц $A$ и $B$, т.е. $C=(c_{ij})$, где $c_{ij}=a_{ij}\pm b_{ij}$

**Пример:** Найти сумму матриц $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}$ и $B=\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 0 & 5 & -1\end{pmatrix}$.

$$A+B=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 0 & 5 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2+3 & 1+2 & -1+1\\ 3+0 & 1+5 & 2-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 3 & 0\\ 3 & 6 & 1\end{pmatrix}.$$

## *2. Умножение матрицы на число*

**Определение:**

*Произведением матрицы* $A=(a_{ij})$ на число $\lambda \neq 0$ называется матрица, полученная из матрицы $A$ путём умножения *всех её* элементов на число $\lambda$.

**Пример:** Найти произведение матрицы $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 5 & 6\end{pmatrix}$ на число $\lambda=2$.

$$2\cdot A=2\cdot\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 5 & 6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\cdot 1 & 2\cdot 2\\ 2\cdot 3 & 2\cdot 4\\ 2\cdot 5 & 2\cdot 6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 4\\ 6 & 8\\ 10 & 12\end{pmatrix}.$$

**Пример:** Выполнить действия: $2\cdot\begin{pmatrix}3 & -1 & 4\\ 2 & 5 & 0\end{pmatrix}-3\cdot\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 4\end{pmatrix}$

$$2\cdot\begin{pmatrix}3 & -1 & 4\\ 2 & 5 & 0\end{pmatrix}-3\cdot\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -2 & 8\\ 4 & 10 & 0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}3 & 6 & 9\\ 6 & 3 & 12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6-3 & -2-6 & 8-9\\ 4-6 & 10-3 & 0-12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -8 & -1\\ -2 & 7 & -12\end{pmatrix}$$

**Замечание 1:**

$$\left|\begin{array}{l}-1\cdot A=-A;\\ \hline A-B=A+(-B);\\ \hline A+(-A)=O.\end{array}\right.$$

**Замечание 2:** Общий множитель всех элементов матрицы можно выносить за знак матрицы.

*Нелинейные операции над матрицами*

## *1. Произведение матриц*

**Замечание:**

*Произведение матриц* $A$ и $B$ возможно только в том случае, *если число столбцов первой матрицы* $A$ *равно числу строк второй матрицы* $B$

**Определение:**

Чтобы получить элемент, стоящий в $i$-й строке и $j$-м столбце произведения двух матриц, нужно элементы $i$-й строки первой матрицы умножить на *соответствующие* элементы $j$-го столбца второй матрицы и полученные произведения сложить.

**Замечание:**

$A \cdot B \neq B \cdot A$

$E \cdot A = A \cdot E = A$.

Произведение двух ненулевых матриц может дать нулевую матрицу $O$, например:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O.$$

## *2. Возведение матрицы в степень*

**Определение:**

*Целой положительной степенью* $A^k$ $(k>1)$ квадратной матрицы $A$ называется произведение $k$ матриц, равных $A$, т.е. $A^k = \underbrace{A \cdot A \ldots \cdot A}_{k}$.

**Замечание:**

| |
|---|
| В общем случае $A^0 = E$; $A^1 = A$. |
| Операция возведения в степень определяется только для квадратных матриц. |
| Из равенства $A^k = O$ не следует, что $A = O$, где $O$ — нулевая матрица. |

**Определение:**

*Многочленом степени* $k$ ($k$ — целое неотрицательное число) от квадратной матрицы $A$ (*матричным многочленом*) называется выражение вида $P_k(A) = a_k A^k + a_{k-1}A^{k-1} + \ldots + a_2 A^2 + a_1 A^1 + a_0 A^0$, где $a_i$ — любые числа, причем $a_k \neq 0$, $A^0 = E$.

**Замечание:**

Для матриц *не определены* операции:

- деления;
- возведение в дробную или отрицательную степень.

**Пример:**

Вычислить произведение матриц: $A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & -5 \\ 1 & 2 & -3 & 4 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ и $B=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Определим размерность произведения: $A_{3\times4}\cdot B_{4\times3}=C_{3\times3}$

$$C=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & -5 \\ 1 & 2 & -3 & 4 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}=$$

$$=\begin{pmatrix} 2\cdot3+3\cdot4+4\cdot1+(-5)\cdot2 & 2\cdot2+3\cdot1+4\cdot3+(-5)\cdot0 & 2\cdot1+3\cdot(-1)+4\cdot2+(-5)\cdot1 \\ 1\cdot3+2\cdot4+(-3)\cdot1+4\cdot2 & 1\cdot2+2\cdot1+(-3)\cdot3+4\cdot0 & 1\cdot1+2\cdot(-1)+(-3)\cdot2+4\cdot1 \\ (-1)\cdot3+(-2)\cdot4+3\cdot1+1\cdot2 & (-1)\cdot2+(-2)\cdot1+3\cdot3+1\cdot0 & (-1)\cdot1+(-2)\cdot(-1)+3\cdot2+1\cdot1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 12 & 19 & 2 \\ 16 & -5 & -3 \\ -6 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

**Пример:**

Найти значение матричного многочлена $f(A)$, если $f(x)=-2x^2+5x+9$, $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

$f(A)=-2A^2+5A+9E$.

Вычислим $A^2=A\cdot A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1\cdot1+2\cdot3 & 1\cdot2+2\cdot0 \\ 3\cdot1+0\cdot3 & 3\cdot2+0\cdot0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, тогда

$$f(A)=-2A^2+5A+9E=-2\cdot\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}+5\cdot\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}+9\cdot\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -14 & -4 \\ -6 & -12 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}$$

## *Свойства*

| | |
|---|---|
| Сложение матриц | $A+B=B+A$ |
| | $(A+B)+C=A+(B+C)$ |
| | $A+O=O+A=A$ |
| Умножение матрицы на число | $\lambda_1\cdot(\lambda_2\cdot A)=(\lambda_1\cdot\lambda_2)\cdot A$ |
| | $\lambda(A+B)=\lambda\cdot A+\lambda\cdot B$ |
| | $(\lambda_1+\lambda_2)\cdot A=\lambda_1\cdot A+\lambda_2\cdot A$ |
| | $1\cdot A=A$ |
| Умножение матриц | $(A\cdot B)\cdot C=A\cdot(B\cdot C)$ |
| | $(A+B)\cdot C=A\cdot C+B\cdot C$ |
| | $C\cdot(A+B)=C\cdot A+C\cdot B$ |
| | $\lambda(AB)=(\lambda A)B=A(\lambda B)$ |
| Транспонирование матрицы | $(A+B)^T=A^T+B^T$ |
| | $(\lambda A)^T=\lambda A^T$ |
| | $(A\cdot B)^T=B^T\cdot A^T$ |
| | $(A^T)^T=A$ |
| Возведение в степень | $A^m\cdot A^k=A^{m+k}$ |
| | $(A^m)^k=A^{mk}$ |