

Потребности органов тела в кровоснабжении (в состоянии покоя)

Органы или системы	Примерный % кровоснабжения
Пищеварительный тракт	21%
Печень	6%
Почки	20%
Скелетные мышцы	15%
Головной мозг	13%
Кожа	9%
Кости	5%
Сердце	5%
Все остальные части тела вместе взятые	6%

**Движение
крови по
сосудам.**

Причины движения крови по сосудам.

- Кровяное давление – давление крови на стенки кровеносных сосудов.
- Разность давления в артериях и венах, является основной причиной непрерывного движения крови по сосудам.
- Кровь перемещается к месту наименьшего давления.
- Наиболее высокое давление в аорте, меньше в крупных артериях, еще меньше в капиллярах и самое низкое в венах.



Кровяное давление у человека измеряют с помощью ртутного или пружинного тонометра в плечевой артерии (артериальное давление).

- **Максимальное (систолическое) давление** – давление во время систолы желудочков (110-120мм.рт.ст.)
- **Минимальное (диастолическое) давление** – давление во время диастолы желудочков (60-80 мм.рт.ст.)
- **Пульсовое давление** – разность между систолическим и диастолическим давлением.



Давление мало зависит от пола, но зато изменяется с возрастом. Ученые опытным путем установили формулу, по которой каждый человек до 20 лет может рассчитать свое нормальное давление в состоянии покоя. (Людям старше этого возраста эта формула не подходит).

- *АД верхнее = 1,7 x возраст + 83*
- *АД нижнее = 1,6 x возраст + 42*
- *(АД – артериальное давление, возраст берется в целых годах)*

Движение крови по сосудам возможно благодаря разности давлений в начале и в конце круга кровообращения.

- Кровяное давление в аорте и крупных артериях составляет 110-120 мм.рт.ст. (т.е. на 110-120- мм.рт.ст. выше атмосферного).**
- В артериях 60-70**
- В артериальном и венозном концах капилляра – 30-15 соответственно.**
- В венах конечностей 5-8**

Скорость крови:

- в аорте (наибольшая)- 0,5 м/с;**
- в полых венах – 0,2 м/с;**
- в капиллярах (наименьшая) – 0,5-1,2 мм/с.**

Колебания давления должны изменяться в определенных границах. Если колебания превышают норму, сосуды могут не выдержать, разорваться, что нередко приводит к гибели больного.

- **Инсульт** – поражение сосудов мозга.
- **Инфаркт** – поражение определенного участка сердечной мышцы.
- После инфаркта, пораженный участок не функционирует, т.к. мышечная ткань замещена рубцовой соединительной тканью, которая не способна сокращаться.

Гипертония – повышение кровяного давления

*Повышение
артериального
давления происходит
при тяжелой
физической нагрузке
С возрастом
эластичность стенок
артерий уменьшается,
поэтому давление в них
становится выше.*




Гипотония – понижение кровяного давления.

Гипотония симптомы:

- слабость и усталость;
- раздражительность;
- повышенная чувствительность к жаре (в частности — плохое самочувствие в бане);
- при физической деятельности самочувствие лучше;
- сердцебиение при физических нагрузках;

***Понижение наблюдается при
больших кровопотерях,
сильных травмах,
отравлениях и др.***



После физических нагрузок!

- ***У тренированного и здорового человека верхнее давление поднимается высоко, а нижнее – нет!***
- ***Если нижнее тоже поднимается, то это указывает о низкой динамической активности.***


Артериальный пульс – ритмичные колебания стенок артерий в результате поступления крови в аорту при систоле левого желудочка.

Пульс можно обнаружить на ощупь там, где артерии лежат ближе к поверхности тела: в области лучевой артерии нижней трети предплечья, в поверхностно-височной артерии и тыльной артерии стопы.



Измерение пульса на лучевой артерии

- Пережмите артерию в точке В, так чтобы движение крови прекратилось.
- Убедимся, что в точке А пульс не пропадает, хотя кровь остановлена.
- Зажмем артерию в точке А.
- Сомкнем ее стенки и остановим пульсовую волну.
- **Вывод – Чтобы узнать, остановлена ли кровь, надо прощупывать пульс ниже перетяжки.**



Частота пульса (сердечных сокращений) позволяет судить о здоровье человека, о работе его сердца.

- **Если число сердечных сокращений после нагрузки увеличилось в 1,3 раза и меньше, то хорошие показания;**
- **Если более, чем в 1,3 раза – относительно посредственные показания (недостаточность движений, гиподинамия).**
- **В норме сердечная деятельность после нагрузки должна вернуться к исходному уровню за 2 минуты! Если раньше – очень хорошо, позже – посредственно, а если более, чем за 3 минуты, то это указывает на плохое физическое состояние.**

Основные понятия темы:

- Артериальное кровяное давление
- Верхнее (систолическое)
- Нижнее (диастолическое)
- Гипертония
- Гипотония
- Инсульт
- Инфаркт
- Частота пульса (сердечных сокращений)