



ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

В.В. Подольский, Вл.В. Подольский

ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН
Украины», г. Киев




АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Среди нарушений репродуктивного здоровья женщины фертильного возраста одной из наиболее серьезных проблем являются воспалительные заболевания половых органов.

Одной из наиболее распространенных причин обращения к гинекологу в последние годы являются симптомы вульвовагинального кандидоза (ВВК)

РАЗВИТИЕ КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ





Хинофуцин


- Ефективність проникнення діючого речовини
- Антифунгальна активність в отношении аскомицетів, дрожжевих і дрожжеподібних грибів
- Антибактеріальна активність

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ


Нами было обследовано 40 женщин фертильного возраста (19-42 года). У все 100% имелся острый ВКК

Хинофуцин назначали всем женщинам в амбулаторных условиях. назначался по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 10 дней. **Пациенткам с микст-инфекцией дополнительно назначалась этиотропная терапия, но при этом местно использовался только препарат Хинофуцин**

Основные жалобы у пациентов




У ЖЕНЩИН БЫЛО ВЫЯВЛЕНО ТАКЖЕ



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА У ОБСЛЕДОВАННЫХ ЖЕНЩИН (N=40)

Симптом	Количество пациенток с клиническими признаками (интенсивность, баллы)			
	1	2	3	4
Выделения	0	0	15	25
Зуд	0	0	26	14
Жжение	1	2	7	3
Диспареуния	2	0	4	1
Болезненность внизу живота	1	3	8	4
Инфильтрация	0	0	28	12
Гиперемия	0	0	27	13

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ НАБЛЮДАЛСЯ ДОСТАТОЧНО БЫСТРЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

К моменту окончания терапии лишь у 1 пациентки отмечался незначительный зуд и гиперемия влагалища. По окончании терапии грибы рода *Candida* при микробиологическом исследовании выявлены у 2 пациенток, а через 1 мес после окончания лечения – у 1 пациентки.

ВЫВОДЫ

1. Проблема распространенности и лечения воспалительных заболеваний половых органов нижнего этажа грибковой и бактериальной этиологии остается актуальной.
2. При лечении кандидоза необходимо применять препараты с широким спектром антимикробной активности, поскольку кандидозная инфекция в абсолютном большинстве случаев ассоциируется с бактериальной условно-патогенной микрофлорой (микстинфекция).
3. Одним из методов успешного лечения этих заболеваний у женщин фертильного возраста в амбулаторных условиях может являться использование препарата Хинофуцин в виде вагинальных суппозиториев, который обладает как антифунгальным, так и антибактериальным действием.
4. Хинофуцин обладает выраженным клиническим эффектом, который проявляется быстрым устранением клинических проявлений и санацией влагалища. Эффективность лечения ВВК Хинофуцином составляет 97,5% (по 1 суппозиторию в сутки в течение 10 дней).

