



ГБПОУ «ТМЕДК»  
**«КРАСНАЯ КНИГА САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ»**

ПОДГОТОВИЛ  
СТУДЕНТ ГРУППЫ С  
101:

ФАДЕЕВА АРИНА

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ЗАГУМЕННОВА Е. М.

# СЛИЗЕНЬ СИЗО-ЧЁРНЫЙ — *LIMAX CINEREONIGER*

Длина тела черного слизня достигает 150-200 мм, это один из самых (если не самый) крупных представителей своего семейства. У слизней стройное, сужающееся к концу, подвижное тело с грубой и прочной морщинистой кожей, которая чем-то напоминает чешуйчатый покров змеи.

Несмотря на название, у представителей вида может быть самая разнообразная окраска — среди них встречаются даже особи белого цвета



# АИСТ ЧЁРНЫЙ

Обитает в лесной зоне Евразии, стараясь избегать людей. Наибольшее количество птиц в России гнездится в Приморье. Зимует в Южной Азии. В Южной Африке живет оседлая популяция А. ч. Предпочитает селиться в глухих, старых лесах, на равнинах и предгорьях возле лесных озёр, рек, болот. Подает голос крайне неохотно и редко. В полете Аист часто парит, распластав крылья. Летит, вытянув вперед шею и откинув назад длинные тонкие ноги. Гнёзда строит на деревьях, используя их по нескольку лет. В кладке от 4 до 7 яиц



## ЖУК-ОЛЕНЬ (ЛАТ. LUCANUS CERVUS)

крупный жук из рода *Lucanus* в составе семейства рогачей. Является самым крупным жуком, обитающим на территории Европы: отдельные особи самцов номинативного подвида могут достигать длины до 86–91 мм при средней длине самцов 70–74 мм.

В основном, жук-олень питается соком растений. Он может надкусывать молодые побеги в надежде на вкусную трапезу. Также с удовольствием жук-олень ест нектар и росу. В домашних условиях жуков помещают в коробку с травой и землей и кормят сахарным сиропом с добавлением меда или сока.



# БЕЛОГЛАЗЫЙ НЫРОК

некрупная утка массой от 0,4 до 0,65 кг. Окрас взрослых птиц равномерно коричневый. В брачном наряде у самца белые брюхо и подбородок, бока коричнево-рыжие, верхняя сторона тела, а также ошейник в основании шеи бурые. На крыле белое зеркальце.



# БЫСТРЯНКА

Небольшая рыба длиной до 13 см, обычно 8–8,5 см, масса 9,2 г . Тело высокое, голова маленькая, рот ко-нечный, рыло несколько выдается над нижней челюстью. Анальный плавник достаточно длинный (14–17 ветвистых лучей). В боковой линии 44–54 чешуи.



# ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ

- многолетнее травянистое растение.

Растение имеет короткое корневище, усаженное тонкими нитевидными корнями.

Листья собраны в прикорневую розетку, черешковые, широкоовальной формы.

Черешки равны по длине пластинке листа, длиннее её или редко короче.



# СФАГНУМ МАГЕЛЛАНСКИЙ

Растение высотой 5—30 см. Стебель густооблиственный. Стеблевые листья сидячие, языковидные. Спорогон состоит из тёмно-бурой коробочки.

Встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. В России распространён повсеместно.

Обладает бактерицидным действием. Применяется в лечении гнойных ран.





# ЯЩЕРИЦА ЖИВОРОДЯЩАЯ

- имеет размер 15–18 см, из которых 10–11 см приходится на хвост. Самец отличается от самки более стройным телосложением; более яркой окраской; наличием выпуклости у основания хвоста; более тёмным брюхом. Эти ящерицы питаются мелкими насекомыми, улитками, дождевыми червями.



# ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ

- Болотные черепахи обитают в Европе, Передней Азии, Африке (северо-запад). Встречаются на Кавказе, в Казахстане и Туркменистане. Живут в лесах и лесостепях, при наличии водоема. Это могут быть болота, озера и пруды, реки и каналы. В горах черепахи обитают на высоте 1000 – 1700м над уровнем моря.
- Активность болотная черепаха проявляет днем. Спит ночью на дне водоема. Это полуводный вид, она превосходно себя чувствует как в воде, так и на суше. Плавает быстро и проворно, бойко передвигается по земле. В виду того, что черепахи хладнокровные животные, они зависят от температурного режима, поэтому она часто выбирается днем на сушу получить тепло солнечных лучей.
- На зимовку черепахи уходят в начале ноября, выходят из неё в конце апреля. Температура воды должна быть +5+10 градусов, а воздуха +10 градусов.



# ЧЁРНЫЙ КОРШУН

- Чёрный коршун – птица чрезвычайно выразительная. Чего стоит один только его хищный взгляд, которым она пристально смотрит на свою жертву.
- Как и у других хищных птиц, глаза чёрного коршуна направлены вперёд, а не в стороны, а треугольный лоб напоминает выражение нахмурившегося человеческого лица. Это поистине хищный взгляд, который усиливается коричневатым, почти красным цветом глаз.
- Активный образ жизни ведет ранним утром и вечером. Днем коршун отдыхает. Птицы, обитающие в Европе считаются перелетными. На зиму они улетают в Африку и Южную Азию в конце августа, начале сентября. Возвращаются в места гнездований в апреле.
- У черного коршуна отличное зрение, как и подобает хищнику. Большую часть своей жизни он проводит в небе
- Чёрные коршуны – абсолютные хищники, притом практически всеядные. Кроме живых животных – пресмыкающихся, грызунов, более мелких птиц, лягушек, червей, ракообразных, насекомых – они не брезгают



The background is a blue gradient with decorative white circuit-like lines in the corners. The text is centered in a bold, italicized font.

***СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ***