

# Решение уравнения

# Евтушенко Ирина Ивановна

Доклад на РМО математиков

2009 год

Г. Дальнегорск

Приморский край

*Равенство вида  $f(x)=g(x)$ ,  
уравнение с одним  
неизвестным.*

Число  $a$  называется  
корнем уравнения если  
обе части уравнения  
определены при  $x=a$   
равенство  $f(a)=g(a)$   
является верным.

*Решить уравнение –  
значит найти все его  
корни или доказать, что  
корней нет.*

В процессе решения часто приходится преобразовывать уравнение, заменяя его более простым. *Нельзя выполнять преобразования, которые приводят к потере корня.*

**Определение.**

**Уравнения  $f(x) = g(x)$  и  $p(x) = h(x)$  называются равносильными, если совпадают множества их корней.**

## Теоремы о равносильности уравнений

**Теорема 1.** Если какой-нибудь член уравнения перенести из одной части уравнения в другую со знаком минус, то получится уравнение, равносильное данному.

**Теорема 2.** Если обе части уравнения возвести в одну нечетную степень, то получится уравнение, равносильное данному.

**Теорема 3.** Уравнение  $af(x) = ag(x)$  ( $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ) равносильно уравнению  $f(x) = g(x)$ .



**Теорема 4. Если обе части уравнения  $f(x) = g(x)$  умножить на выражение  $h(x)$ , которое имеет смысл всюду в ОДЗ уравнения  $f(x) = g(x)$  и нигде в этой области не обращается в 0, то получится уравнение, равносильное данному.**

**Теорема 5. Если обе части уравнения неотрицательны в области определения уравнения, то при возведении обеих частей уравнения в четную степень получится уравнение, равносильное данному.**

**Теорема 6. Если  $f(x) > 0$  и  $g(x) > 0$ , то уравнение  $\log_a f(x) = \log_a g(x)$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) равносильно уравнению  $f(x) = g(x)$ .**

*Общие приемы  
решения уравнений*

## Метод разложения на множители

Этот метод заключается в том, что уравнение  $f(x)g(x)h(x) = 0$  можно заменить совокупностью уравнений  $f(x) = 0$ ;  $g(x) = 0$ ;  $h(x) = 0$ .

Решив уравнения совокупности нужно взять только те решения, которые принадлежат области определения исходного уравнения, а остальные корни отбросить.

# Метод замены переменной

Этот метод заключается в том, что если уравнение  $f(x) = 0$  сводится к уравнению  $h(g(x)) = 0$ , то нужно ввести новую переменную  $u = g(x)$ , затем решить уравнение  $h(u) = 0$ , а в конце решить совокупность уравнений  $g(x) = u_1$ ;  $g(x) = u_2$ ; ...;  $g(x) = u_n$ , где  $u_1, \dots, u_n$  — корни уравнения  $h(u) = 0$ .

## Использование свойств функций

Пусть у нас имеется уравнение  $f(x) = g(x)$ .

Если одна из функций возрастает, а другая убывает, то исходное уравнение либо не имеет корней, либо имеет единственный корень, который иногда легко угадывается

## Использование графиков

Суть метода использования графиков для решения уравнения  $f(x) = g(x)$  проста: нужно построить графики функций  $y = f(x)$  и  $y = g(x)$  и найти все точки их пересечения, абсциссы которых и будут являться корнями нашего исходного уравнения.

## Показательные уравнение

Основным методом решения показательных уравнений является сведение уравнения с помощью различных преобразований правой и левой частей к простейшему показательному уравнению — к уравнению вида  $ax = b$ .

Это уравнение решается по стандартной схеме в зависимости от знака правой части, а именно:

- 1) Если  $b < 0$ , то уравнение не имеет решений в силу того, что показательная функция  $y = ax$  принимает только неотрицательные значения.
- 2) Если  $b > 0$ , то уравнение имеет единственное решение —  $x = \log_a b$ .

# Уравнение с иррациональностью

Основным методом решения уравнения с иррациональностью является приведение уравнения с помощью различных преобразований правой и левой частей уравнения к простейшему иррациональному уравнению, то есть к уравнению вида

$$f(x)=g(x).$$

Это уравнение эквивалентно системе вида

$$\begin{aligned}g(x) &\geq 0, \\ f(x) &\geq g(x)^2\end{aligned}$$

По результатам ЕГЭ 2008 года  
выявились недочеты при выполнении  
работы.



Оказалось что выпускники, получившие оценку «3»:

не научились решать иррациональные и тригонометрические уравнения

$$\sin \frac{x}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sqrt{7x^2 - 24} = -x$$

Проиллюстрируем конкретными примерами, какие недочеты выявились у «хорошистов» при выполнении заданий повышенного уровня сложности. Они успешно справляются с решением уравнений (показательных, логарифмических и иррациональных) методом замены (см. примеры 1-2).

Пример 1. (Если уравнение имеет более одного корня, то в бланке ответов запишите их произведение.) 41%

Пример 2. (Если уравнение имеет более одного корня, то в бланке ответов запишите произведение всех его корней.) 31%

$$2^x - 4 \cdot (\sqrt{2})^x - 32 = 0$$

$$\log_3 x + 8 \cdot \sqrt{\log_3 x} - 20 = 0.$$

Более низкие результаты показаны этими учащимися при выполнении «похожего» уравнения (см. пример 3).

Пример 3. (Если уравнение имеет более одного корня, то в бланке ответов запишите их сумму.) 19%

$$\sqrt[3]{17x + 13} + (17x + 13)^{\frac{1}{6}} - 6 = 0$$

Это наблюдение подтверждается и при анализе результатов выполнения заданий повышенного уровня с развернутым ответом (С1-С2).

Как и в 2007 году, выпускники 2008 года, показавшие отличный уровень подготовки, справляются со всеми заданиями базового уровня сложности, а также со всеми заданиями повышенного уровня сложности. Из них от 80% до 97% выполняют верно задания повышенного уровня сложности с кратким ответом и от 78% до 92% – правильно решают задания повышенного уровня сложности с развернутым ответом. Выборочная перепроверка работ выявила ошибки и недочеты, которые допускают выпускники, приступающие к выполнению этих заданий. В 2008 г. были включены задания, где нужно было найти наибольшее (наименьшее) значение функции и текстовая задача, для решения которой нужно было составить модель-уравнение

Предлагаем вам решение тех  
уравнений в которых были  
допущены ошибки.