

Противопоказания для вакцинации против COVID

Перед введением I компонента вакцины:

- возраст меньше 18 и старше 60 лет
- участник клинического исследования вакцины
- вакцинация в течении последних 30 дней
- беременность (период грудного вскармливания)
- тяжелые аллергические реакции, в том числе на вакцинацию (анафилактический шок, отек Квинке)
- прием иммуносупрессивных препаратов (глюкокортикостероиды, цитостатики, иммуносупрессоры, моноклональные антитела)
- острое инфекционное заболевание
- любое хроническое заболевание в стадии обострения
- наличие хронического заболевания, степень тяжести которого может являться противопоказанием:
 - заболевания печени и почек;
 - выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет);
 - тяжёлые заболевания системы кроветворения;
 - эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы;
 - заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца);
 - первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания;
 - заболевания легких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой.

Перед введением II компонента вакцины:

- тяжелые аллергические реакции, в том числе тяжелое осложнение на введение I компонента вакцины (анафилактический шок, судорожный синдром, температура выше 40С)
- иная вакцинация после введения I компонента вакцины
- беременность
- прием иммуносупрессивных препаратов (глюкокортикостероиды, цитостатики, иммуносупрессоры, моноклональные антитела)
- признаки острого инфекционного заболевания
- признаки обострения любого хронического заболевания.