

Практический семинар по Математической экономике (17.М18-э + 17.М19-э)


Занятие 3

ОБРАБОТКА ДАННЫХ.

Задача о наилучшем среднеквадратическом
приближении (задача о тренде)

2018/2019 уч. год

Задача о тренде. Метод наименьших квадратов



Критерий:
$$\sum_{i=1}^n (f(x_i) - g(x_i))^2 \rightarrow \min$$

Формальная постановка задачи. Условие минимума среднеквадратического отклонения

Пусть дана таблица значений функции

$$\begin{array}{c|c} x & x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \\ \hline y & y_1, y_2, y_3, \dots, y_n \end{array}, x_i \neq x_j, i, j = 1, 2, \dots, n$$


Найти полином заданной степени m ,

$$P_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m,$$

удовлетворяющий условию:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - P_m(x_i))^2 \rightarrow \min$$

Метод наименьших квадратов (МНК) для построения линейного тренда



$$P_1(x) = ax + b, \quad S(a, b) = \sum_{j=1}^n (y_j - (ax_j + b))^2$$

Нахождение коэффициентов

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \sum_{j=1}^n (y_j - (ax_j + b)) x_j = 0 \\ -2 \sum_{j=1}^n (y_j - (ax_j + b)) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \sum_{j=1}^n x_j^2 + b \sum_{j=1}^n x_j = \sum_{j=1}^n x_j y_j \\ a \sum_{j=1}^n x_j + \sum_{j=1}^n b = \sum_{j=1}^n y_j \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \sum_{j=1}^n x_j^2 + b \sum_{j=1}^n x_j = \sum_{j=1}^n x_j y_j \\ a \sum_{j=1}^n x_j + nb = \sum_{j=1}^n y_j \end{cases}$$

Нахождение параметров линейной модели

$$na_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_1 = \sum_{i=1}^n y_i$$
$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\delta_1 = \sum_{i=1}^n (y_i - (a_0 + a_1 x_i))^2$$

$$y = ax + b$$

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 0 \end{cases} \begin{cases} a \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i + b n = \sum y_i \end{cases}$$

Пример 1 (линейный тренд)

Дана таблица значений функции $y=f(x)$:


x	0	1	2	4	5
y	2.1	2.4	2.6	2.8	3

Используя МНК, аппроксимировать эти данные линейной зависимостью $g(x) = ax + b$

x	y	xy	x ²	g
0	2.1	0	0	2.18
1	2.4	2.4	1	2.35
2	2.6	5.2	4	2.51
4	2.8	11.2	16	2.84
5	3.0	15.0	25	3.01
12	12.9	33.8	46	12.9

$$\begin{cases} 46a + 12b = 33.8 \\ 12a + 5b = 12.9 \end{cases} \quad \begin{cases} a \approx 0.165 \\ b \approx 2.184 \end{cases}$$

$$y = 0.165x + 2.184$$
$$\delta = 0.0618$$



Пример 2

Дана таблица значений функции $y=f(x)$:

x	1	2	3	4	5
y	1	2	2	1	1

Используя МНК, аппроксимировать эти данные линейной зависимостью $g(x) = a_0 + a_1x$

Нахождение параметров квадратичной модели

$$na_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_1 = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^3 \right) a_2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\delta_2 = \sum_{i=1}^n \left(y_i - (a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2) \right)^2$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial c} = 0 \end{cases} \begin{cases} a \sum x_i^4 + b \sum x_i^3 + c \sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \\ a \sum x_i^3 + b \sum x_i^2 + c \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i^2 + b \sum x_i + cn = \sum y_i \end{cases}$$


Пример 2 (квадратичный тренд)

X	Y	X ²	Y ²	XY	X ³	X ⁴	X ² Y
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	4	4	4	8	16	8
3	2	9	4	6	27	81	18
4	1	16	1	4	64	256	16
5	1	25	1	5	125	625	25
15	7	55	11	20	225	979	68

$$\begin{cases} 979a + 225b + 55c = 68 \\ 225a + 55b + 15c = 20 \\ 55a + 15b + 5c = 7 \end{cases}$$

$$a = -0.2143 \quad b = 1.1857 \quad c = 0.2$$

$$\delta_2 \approx 0.3024$$



Нелинейный тренд. Пример 1

$$y = \frac{a}{x} + b$$

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (a/x_i + b))^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 0 \end{cases} \begin{cases} a \sum 1/x_i^2 + b \sum 1/x_i = \sum y_i/x_i \\ a \sum 1/x_i + bn = \sum y_i \end{cases}$$

Нелинейный тренд. Пример 2

$$y = a \ln x + b$$

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (a \ln x_i + b))^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 0 \end{cases} \begin{cases} a \sum (\ln^2 x_i + b \sum \ln x_i = \sum y_i \ln x_i \\ a \sum \ln x_i + b n = \sum y_i \end{cases}$$



Решение задачи средствами EXCEL



	А	В
1	Год	Количество автомобилей в АТП
2	2000	125
3	2001	150
4	2002	190
5	2003	215
6	2004	225
7	2005	235
8	2006	275
9	2007	280
10	2008	325
11	2009	350
12	2010	370

Линия тренда [?] [X]

Тип | Параметры

Построение линии тренда (аппроксимация)

 **Линейная**  **Логарифмическая**

 **Степенная**  **Экспоненциальная**

Построен на ряде:

Ряд1

Линия тренда [?] [X]

Тип | Параметры

Название аппроксимации

автоматически

другое:

Прогноз


вперед на: 0

назад на: 0

пересечение кривых


показывать уравнение

поместить на диаграмму



Решение задачи средствами MATLAB

```
Editor - H:\Transcend H\Toshiba_D\УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС\ЛЕКЦИИ\Спецфак\z1_3.m
forecasting.m x ddd_1.m x test_1.m x phs1.m x forecast_test.m x z1_3.m x
1 % Решение задачи наилучшего среднеквадратического приближения
2 % средствами системы MATLAB
3 - X=1:5;
4 - Y=[1 2 2 1 1];
5 - coef1=polyfit(X,Y,1) % коэффициенты
6 - coef2=polyfit(X,Y,2) % коэффициенты
7 - xi=linspace(min(X,max(X),50);
8 - g1=polyval(coef1,xi);
9 - g2=polyval(coef2,xi);
10 - plot(X,Y,'*k',xi,g1,xi,g2);grid
11
12 - TABL=[X;Y;X.^2;Y.^2;X.*Y;X.^3;X.^4;X.^2.*Y];
13 - sum(TABL')
14 - G1=polyval(coef1,X);
15 - G2=polyval(coef2,X);
16 - deltt1=sqrt(mean((Y-G1).^2))
17 - deltt2=sqrt(mean((Y-G2).^2))
18
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
fx >>
```



e_k – «ошибка», P_k – процентная «ошибка»

Mean Absolute Percentage Error (*MAPE*)

Root Mean Square Error (*RMSE*)

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |P_k| ,$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e_k^2} .$$