


Понятие логарифма,
свойства логарифмов.

$$2^x = 4 \quad x = 2$$

$$2^x = 0,5 \quad x = -1$$

$$2^x = 3$$
$$x = \log_2 3$$



Определение.

Логарифмом числа b ($b > 0$) по основанию a ($a > 0, a \neq 1$) называется показатель степени, в которую надо возвести a , чтобы получить число b .

Обозначение : $\log_a b$

$$\log_a b = t \Leftrightarrow a^t = b$$

Основное логарифмическое тождество

$$a^{\log_a b} = b$$


Логарифм с основанием 10 называется десятичным и обозначается $\lg b$

Логарифм с основанием e называется натуральным и обозначается $\ln b$

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$$

$$e = 2,71828\dots\dots$$

Функция $y = e^x$



- 1) $D(f) = \mathbb{R}$
- 2) Не является ни четной, ни нечетной (общего вида)
- 3) Возрастает на \mathbb{R}
- 4) Не ограничена сверху, ограничена снизу: $f(x) > 0$
- 5) Наибольшего значения не имеет, наименьшего значения не имеет
- 6) Непрерывна
- 7) $E(f) = (0; +\infty)$
- 8) Выпукла вниз на \mathbb{R}
- 9) Дифференцируема в любой точке
- 10) Горизонтальная асимптота $y = 0$

Угол между касательной к графику в точке $x = 0$ и осью абсцисс равен 45°

$$(e^x)' \Big|_{x=0} = \operatorname{tg} 45^\circ = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\log_a a = 1 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a \frac{1}{a} = -1$$

$$\lg 10 = 1$$

$$\ln e = 1$$

$$\lg 1 = 0$$

$$\ln 1 = 0$$

Свойства логарифмов

1. Логарифм произведения двух положительных чисел равен сумме логарифмов этих чисел

$$\log_a bc = \log_a b + \log_a c \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0)$$

2. Логарифм частного двух положительных чисел равен разности логарифмов делимого и делителя

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0)$$

3. Логарифм степени равен произведению показателя степени на логарифм основания степени (показатель степени можно вынести за знак логарифма)

$$\log_a b^k = k \log_a b \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, k \in R)$$

4. Если основанием логарифма является степень с показателем k , то его можно вынести за знак логарифма как $1/k$

$$\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_a b \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, k \neq 0)$$

5. Значение логарифма не изменится, если основание логарифма и логарифмируемое число возвести в одну и ту же степень

$$\log_{a^k} b^k = \log_a b \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, k \neq 0)$$

Формулы перехода к новому

ОСНОВАНИЮ

1. Если $a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1$
то имеет место равенство

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

2. Если $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$
то имеет место равенство

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

Обобщение свойств логарифмов

$$1. \log_a bc = \log_a |b| + \log_a |c| \quad (a > 0, a \neq 1, bc > 0)$$

$$2. \log_a \frac{b}{c} = \log_a |b| - \log_a |c| \quad (a > 0, a \neq 1, \frac{b}{c} > 0)$$

$$3. \log_a b^{2k} = 2k \log_a |b| \quad (a > 0, a \neq 1, b \neq 0, k \in \mathbb{Z})$$

$$4. \log_{a^{2k}} b = \frac{1}{2k} \log_{|a|} b \quad (a \neq 0, a \neq 1, b > 0, k \in \mathbb{Z})$$

Производные показательной и логарифмической функций

$$1. (e^x)' = e^x$$

$$2. (a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0)$$

$$3. (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

$$4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0)$$

Дополнительные замечания о десятичных логарифмах

$$a = a_0 \cdot 10^n \quad 1 \leq a_0 < 10, n \in Z \quad (\text{стандартный вид числа } a)$$

$$\lg a = \lg a_0 \cdot 10^n = \lg a_0 + \lg 10^n = \lg a_0 + n \lg 10 = n + \lg a_0$$

$$n - \text{целое число, } 0 \leq \lg a_0 < 1$$

n – целая часть числа $\lg a$,

$\lg a_0$ – дробная часть числа $\lg a$

Целую часть числа $\lg a$ называют **характеристикой** десятичного логарифма, а **дробную часть** числа $\lg a$ называют **мантиссой** десятичного логарифма

Дополнительные свойства логарифмов

$$1. a^{\log_b c} = c^{\log_b a} \quad (a > 0, b > 0, b \neq 1, c > 0)$$

$$2. a^{\sqrt{\log_a b}} = b^{\sqrt{\log_b a}} \quad (a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1, \log_a b > 0)$$