

# Противоэпидемические мероприятия при дифтерии

- При выявлении случая дифтерии в течение **12 часов** посылают **экстренное извещение** по установленной форме в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
- Каждый случай заболевания дифтерией, а также носительства токсигенных коринебактерий дифтерии подлежит **регистрации и учету в журнале инфекционных заболеваний** по месту выявления.

- Больные дифтерией и носители токсигенных коринебактерий дифтерии **госпитализируются** в инфекционный стационар.
- В *направлениях* на госпитализацию указывают первоначальные симптомы заболевания, получаемое **лечение**, сведения о **профилактических прививках и контактах** с больным дифтерией или носителями токсигенных коринебактерий дифтерии.
- После выписки из стационара **реконвалесценты** дифтерии и носители токсигенных коринебактерии дифтерии при освобождении от возбудителя **сразу** допускаются в организацию

- Если выделение токсигенных коринебактерий продолжается даже после 2х курсов АБТ, лицо допускают в коллектив при условии **отсутствия** в коллективе **непривитых против дифтерии лиц**. В коллектив вновь принимаются только лица, привитые против дифтерии.
- **Носители** нетоксигенных коринебактерий дифтерии **не подлежат госпитализации** и лечению антибиотиками и допускаются во все коллективы.

- Лицам, **контактным** с больным дифтерией устанавливается ежедневное **медицинское наблюдение** с осмотром ротоглотки, носа, кожи и термометрией в течение **7 дней** с регистрацией данных наблюдения в медицинской документации.
- В течение **48 часов** с момента установления диагноза дифтерии проводится бактериологическое обследование лиц, бывших с ними в контакте.
- В течение первых 3 дней с момента изоляции больного организуется осмотр контактных лиц врачом-отоларингологом.

## **В очаге:**

- Необходимо произвести **вакцинацию** против дифтерии:
  - не привитым против дифтерии лицам;
  - детям и подросткам, у которых наступил срок очередной вакцинации или ревакцинации;
  - взрослым лицам, у которых согласно медицинской документации с момента последней прививки прошло 10 и более лет;
  - лица, у которых при серологическом обследовании не обнаружены защитные титры дифтерийных антител (1:20 и более).

- В очаге проводят текущую и заключительную дезинфекцию.