



# Иррациональные уравнения



**Иррациональным уравнением называется уравнение, в которых переменная «х» содержится под знаком корня.**

Например,

$$\sqrt{2x-3} = x+1$$

$$\sqrt[3]{x+5} - 12\sqrt{x-4} = 5$$

$$3x^{\frac{4}{7}} - \sqrt{x+8} = 15$$

Какие из уравнений не являются  
иррациональными?

$$a) 5 + \sqrt{x-3} = x$$

$$б) \sqrt{2x+7} = 2x$$

$$в) \sqrt{x-1} + \sqrt{x+2} = 4$$

$$г) \sqrt{5x^2 + x} - \sqrt{2} = 0$$

$$д) \sqrt{x-7} + \sqrt{8} = 0$$

$$е) \sqrt[3]{3x+6} = -6$$

# Идея решения

Основная идея решения иррационального уравнения состоит в сведении его к рациональному алгебраическому уравнению, которое либо равносильно исходному иррациональному уравнению, либо является его следствием.

Главный способ избавиться от корня и получить рациональное уравнение – возведение обеих частей уравнения в одну и ту же степень, которую имеет корень, содержащий неизвестное.

# *Основные методы решения иррациональных уравнений:*

- **возведение в степень обеих частей уравнения;**
- **введение новой переменной;**
- **разложение на множители.**

## *Метод возведения в степень обеих частей уравнения:*

- 1) Если иррациональное уравнение содержит только один радикал, то нужно записать так, чтобы в одной части знака равенства оказался только этот радикал. Затем обе части уравнения возводят в одну и ту же степень, чтобы получилась рациональное уравнение.

## ***Метод возведения в степень обеих частей уравнения:***

- 2) Если в иррациональном уравнении содержится два или более радикала, то сначала изолируется один из радикалов, затем обе части уравнения возводят в одну и ту же степень, и повторяют операцию возведения в степень до тех пор, пока не получится рациональное уравнение.**

Пример №1  $\sqrt{3x - 2} = x$

$$(\sqrt{3x - 2})^2 = x^2$$

$$3x - 2 = x^2$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$D = 9 - 4 \cdot 2 = 1$$

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 1$$

Проверка:  $x = 1: \sqrt{3 * 1 - 2} = 1$

$$1=1$$

$x = 2: \sqrt{3 * 2 - 2} = 2$

$$2=2$$

Ответ:  $x_1=1, x_2=2$



# Запомни!

## При возведении обеих частей уравнения

- в **четную** степень (показатель корня – **четное** число) – возможно появление постороннего корня (проверка необходима)
- в **нечетную** степень (показатель корня – **нечетное** число) – получается уравнение, равносильное исходному (проверка не нужна)

Пример №2  $\sqrt{x^2 + 5x + 1} = 2x - 1$

$$\left(\sqrt{x^2 + 5x + 1}\right)^2 = (2x - 1)^2$$

$$x^2 + 5x + 1 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$x^2 + 5x + 1 - 4x^2 + 4x - 1 = 0$$

$$-3x^2 + 9x = 0$$

$$-3x(x - 3) = 0$$

$$-3x = 0$$

$$x - 3 = 0$$

$$x = 0$$

$$x = 3$$

Проверка: 1)  $x = 0$ :  $\sqrt{0 + 5 * 0 + 1} = 2 * 0 - 1$

$$1 \neq -1$$

2)  $x = 3$ :  $\sqrt{9 + 15 + 1} = 6 - 1$

$$5 = 5$$

Ответ:  $x = 3$ .

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g^2(x) \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$$

Пример №3 Решите уравнение  $\sqrt{2x - 3} = 4 - x$

$$\begin{cases} 2x - 3 = (4 - x)^2 \\ 4 - x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 10x + 19 = 0 \\ x \leq 4 \end{cases}$$

$$\underline{x = 5 - \sqrt{6}}$$

$$x = 5 + \sqrt{6} > 4 - \text{посторонний корень}$$

Ответ:  $x = 5 - \sqrt{6}$ .

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$$

## Пример №4

$$\sqrt{x+3} = \sqrt{5-x}$$

### 1 способ

$$\sqrt{x+3} = \sqrt{5-x}$$

$$x+3 = 5-x$$

$$2x = 2$$

$$x = 1$$

### проверка

$$\text{при } x = 1 \quad \sqrt{1+3} = \sqrt{5-1}$$

ответ : 1

### 2 способ

$$\sqrt{x+3} = \sqrt{5-x} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \\ x+3 = 5-x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -3 \\ x \leq 5 \\ x = 1 \end{cases} \text{ ответ : } 1.$$

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) \geq 0 (g(x) \geq 0) \end{cases}$$

## Пример №5

$$2\sqrt{x+1} - \frac{4}{\sqrt{x+1}} + 7 = 0$$

$$\sqrt{x+1} = t \quad t > 0$$

$$2t - \frac{4}{t} + 7 = 0$$

$$2t^2 - 4 + 7t = 0$$

$$2t^2 + 7t - 4 = 0$$

$$D = 49 - 4 \cdot 2 \cdot (-4) = 49 + 32 = 81$$

$$t_{1,2} = \frac{-7 \pm 9}{4} \quad t_1 = \frac{-16}{4} = -4 < 0$$

$$t_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{x+1} = \frac{1}{2}$$

$$x+1 = \frac{1}{4}$$

$$x = \frac{1}{4} - 1$$

$$x = -\frac{3}{4}$$

## Пример №6

$$(x^2 - 5x - 6) \sqrt{\frac{x+2}{x-5}} = 0$$



Пример №6 Решить уравнение

$$x - 1 = \sqrt[3]{x^2 - x - 1}$$

$$(x - 1)^3 = x^2 - x - 1$$

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = x^2 - x - 1$$

$$x^3 - 4x^2 + 4x = 0$$

$$x(x^2 - 4x + 4) = 0$$

$$x = 0 \text{ или } x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$(x - 2)^2 = 0$$

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

Ответ:  $x = 0; 2$ .

Пример №5 Решите уравнение

$$\sqrt{3x-1} - \sqrt{x-2} = 3$$

$$\text{ОДЗ: } \begin{cases} 3x-1 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow x \geq 2$$

$$\sqrt{3x-1} = 3 + \sqrt{x-2}$$

$$3x-1 = 9 + 6\sqrt{x-2} + x-2$$

$$3x-1 = 7 + x + 6\sqrt{x-2}$$

$$2x-8 = 6\sqrt{x-2}$$

$$x-4 = 3\sqrt{x-2}$$

$$x^2 - 8x + 16 = 9(x-2)$$

$$x^2 - 17x + 34 = 0$$

$$D = 17^2 - 4 * 1 * 34 = 289 - 136 = 153$$

$$\sqrt{D} = \sqrt{153} = \sqrt{9 * 17} = 3\sqrt{17}$$

$$x = \frac{17 + 3\sqrt{17}}{2} \in \text{ОДЗ}$$

$$x = \frac{17 - 3\sqrt{17}}{2} < 4 \notin \text{ОДЗ} - \text{посторонний корень}$$

$$\text{Ответ: } \frac{17+3\sqrt{17}}{2}$$

Пример №6 Решить уравнение

$$x - 1 = \sqrt[3]{x^2 - x - 1}$$

# *Метод введения новой переменной*

**Данный метод применяется в том случае, когда в уравнении неоднократно встречается некоторое выражение, зависящее от неизвестной величины. Тогда имеет смысл принять это выражение за новую переменную и решить уравнение сначала относительно введенной неизвестной, а потом найти исходную величину.**

Пример №9 Решите уравнение

$$\sqrt[4]{x} + \sqrt[8]{x} - 2 = 0 \quad x \geq 0$$

$$\sqrt[8]{x} = y, \quad y \geq 0$$

$$y^2 + y - 2 = 0$$

$$\underline{y = 1}$$

$y = -2 < 0$  – посторонний корень

$$y = 1, \quad \sqrt[8]{x} = 1, \quad \Rightarrow x = 1$$

Ответ:  $x = 1$ .

Пример №10 Найдите сумму корней уравнения:

$$(x + 4)(x + 1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$$

$$x^2 + 5x + 4 - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$$

Обозначим  $y = \sqrt{x^2 + 5x + 2}$ ,  $y \geq 0$  и

перейдем к уравнению

$$y^2 + 2 - 3y = 6$$

$$y^2 - 3y - 4 = 0$$

$y = -1 < 0$  – посторонний корень

$$\underline{y = 4}$$

$$\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 4$$

$$x^2 + 5x + 2 = 16$$

$$x^2 + 5x - 14 = 0$$

$$x = -7$$

$$x = 2$$

Проверка: 1)  $x = -7$ , тогда  $\sqrt{(-7)^2 + 5(-7) + 2} = 4$

$$\sqrt{16} = 4; \quad 4 = 4 \quad \text{верно}$$

2)  $x = 2$ , тогда  $\sqrt{2^2 + 5 * 2 + 2} = 4$

$$\sqrt{16} = 4; \quad 4 = 4 \quad \text{верно}$$

Ответ:  $-5$ .

Пример №11 Решите уравнение

$$\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} - 2\sqrt{\frac{x-1}{2x+1}} = 1$$

$$\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} = a, \quad a > 0$$

$$a - 2 * \frac{1}{a} = 1$$

$$a^2 - a - 2 = 0$$

$a = -1 < 0$  – посторонний корень

$$\underline{a = 2}$$

$$\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} = 2$$

$$2x + 1 = 4(x - 1)$$

$$2x = 5 \Rightarrow x = 2,5$$

Ответ:  $x = 2,5$ .



# Метод разложения на множители

Для решения иррациональных уравнений данным методом следует пользоваться правилом:

*Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей, входящих в произведение; равен нулю; а остальные при этом имеют смысл.*

Уравнение  $\sqrt{f(x)} \cdot q(x) = 0$  равносильно совокупности

$$1) \begin{cases} f(x) = 0 \\ q(x) - \text{определена} \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} q(x) = 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases}$$

## Пример №12

Решите уравнение:  $(x^2 - 5x - 6) \sqrt{\frac{x+2}{x-5}} = 0$

Решение:

$$1) \frac{x+2}{x-5} = 0$$

$$x = -2$$

$$2) \begin{cases} x^2 - 5x - 6 = 0 \\ \frac{x+2}{x-5} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 6, x = -1 \\ x \in (-\infty; -2] \cup (5; \infty) \end{cases}$$

Ответ:  $\{-2; 6\}$

### Пример №13

Решите уравнение:  $\sqrt{x-3} * x^2 = 4\sqrt{x-3}$

Решение:

$$\sqrt{x-3} * (x^2 - 4) = 0$$

$$1) x - 3 = 0$$

$$x = 3$$

$$2) \begin{cases} x^2 - 4 = 0 \\ x - 3 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2, & x = -2 \\ x \geq 3 \end{cases}$$

Система решений не имеет.

Ответ: {3}

Пример №14 Решите уравнение:

$$\sqrt{x^2 - 5x + 6} - 3\sqrt{x - 3} - 5\sqrt{x - 2} + 15 = 0$$

Решение:

ОДЗ:  $x \geq 3$

$$\sqrt{(x - 3)(x - 2)} - 3\sqrt{x - 3} - 5\sqrt{x - 2} + 15 = 0$$

$$\sqrt{x - 3}(\sqrt{x - 2} - 3) - 5(\sqrt{x - 2} - 3) = 0$$

$$(\sqrt{x - 3} - 5)(\sqrt{x - 2} - 3) = 0$$

1)  $\sqrt{x - 3} = 5$

$$x = 28$$

2)  $\sqrt{x - 2} = 3$

$$x = 11$$

Ответ: {11;28}

## *Дополнительные методы решения иррациональных уравнений:*

- **метод «пристального взгляда»  
(метод анализа уравнения);**
- **использование монотонности функции;**
- **переход к уравнению с модулем.**

# Метод анализа уравнения

Свойства корней, которые используют при решении уравнений данным способом:

1. Все корни четной степени являются арифметическими, то есть если подкоренное выражение отрицательно, то корень лишен смысла; если подкоренное выражение равно нулю, то корень так же равен нулю; если подкоренное выражение положительно, то значение корня положительно.

2. Все корни нечетной степени определены при любом значении подкоренного выражения.

3. Функции  $y = \sqrt[2n]{x}$  и  $y = \sqrt[2n+1]{x}$

являются возрастающими в своей области определения.

Пример №15  $\sqrt{x+1} + \sqrt{20} = \sqrt{5}$

$$\sqrt{x+1} = -\sqrt{5}$$

Арифметический корень не может быть отрицательным числом, поэтому уравнение решений не имеет.

Пример №16  $\sqrt{x^2+4} + \sqrt{x^2+9} = 4$

$$\sqrt{x^2+4} \geq 2$$

$$\sqrt{x^2+9} \geq 3$$

Уравнение не имеет решений.

Пример №17  $\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2x^2 + 5} = 1$

$$x^2 + 1 < 2x^2 + 5$$

Уравнение не имеет решений.

Пример №18  $\sqrt{4 - x} - \sqrt{x - 6} = 2$

$$\begin{cases} 4 - x \geq 0 \\ x - 6 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq 6 \end{cases}$$

Уравнение не имеет решений.



# ***Метод использования монотонности функции***

**Использование монотонности функций, входящих в уравнение, нередко значительно упрощают техническую часть решения.**

***Сформулируем два свойства монотонных функций:***

- 1. Сумма возрастающих (убывающих) функций – функция возрастающая (соответственно, убывающая) на их общей области определения.**
- 2. Разность возрастающей и убывающей (соответственно, убывающей и возрастающей) функций – функция возрастающая (убывающая) на их общей области определения.**

# *Метод использования монотонности функций*

## *Теорема о корне*

Пусть  $y=f(x)$  – монотонная на некотором промежутке функция. Тогда при любом значении  $a$  уравнение  $f(x)=a$  имеет на этом промежутке не более одного корня.

Пример №19 Решите уравнение:  $\sqrt{37x + 12} - \sqrt{31 - 6x} = 2$ .

Ответ: {1}

Пример №20

Решите уравнение:  $\sqrt{2x + 5} + \sqrt{x - 1} = 8$ .

Ответ: {10}

Пример №21

Решите уравнение:

$$\sqrt[3]{4x - 1} + \sqrt[3]{x + 1} + \sqrt[9]{x - 6} = 6.$$

Ответ: {7}

# Метод перехода к уравнению с модулем

Пример №22 Найти наибольший корень уравнения

$$\sqrt{x^2 + 12x + 36} = x^2 - 36$$

$$\sqrt{(x + 6)^2} = x^2 - 36$$

$$|x + 6| = x^2 - 36$$

$$1) \begin{cases} x + 6 < 0 \\ -x - 6 = x^2 - 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -6 \\ x^2 + x - 30 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -6 \\ x = 7 \\ x = -6 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x + 6 \geq 0 \\ x + 6 = x^2 - 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -6 \\ x^2 - x - 42 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -6 \\ x = -6 \\ x = 5 \end{cases}$$

Ответ: наибольший корень уравнения  $x = 7$ .

Пример №23

$$\sqrt{x+2+2\sqrt{x+1}} + \sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}} = 2$$

$$\sqrt{(\sqrt{x+1}+1)^2} + \sqrt{(\sqrt{x+1}-1)^2} = 2$$

$$|\sqrt{x+1}+1| + |\sqrt{x+1}-1| = 2$$

$$\sqrt{x+1}+1 + |\sqrt{x+1}-1| = 2$$

$$1) \begin{cases} \sqrt{x+1}-1 \geq 0 \\ x+1 \geq 0 \\ 2\sqrt{x+1} = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{x+1} \geq 1 \\ x \geq -1 \\ x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x \geq -1 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0$$

$$2) \begin{cases} \sqrt{x+1}-1 < 0 \\ x+1 \geq 0 \\ 2 = 2 \text{ (верно)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{x+1} < 1 \\ x \geq -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x+1 < 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x < 0 \end{cases} \Rightarrow x \in [-1; 0)$$

Ответ:  $x \in [-1; 0]$

### Пример №24


При каких значениях  $k$  уравнение имеет два корня?

$$|x + 1| + \sqrt{x^2 - 4x + 4} = k$$

$$|x + 1| + |x - 2| = k$$

$$x = -1$$

$$x = 2$$



$$\begin{cases} x < -1 \\ -x - 1 - x + 2 = k \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq x \leq 2 \\ x + 1 - x + 2 = k \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 2 \\ x + 1 + x - 2 = k \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -1 \\ x = \frac{1-k}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq x \leq 2 \\ k = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 2 \\ x = \frac{k+1}{2} \end{cases}$$

Условия существования двух корней:

$$\begin{cases} k \neq 3 \\ \frac{1-k}{2} < -1 \\ \frac{k+1}{2} \geq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \neq 3 \\ k > 3 \\ k \geq 3 \end{cases} \Rightarrow k > 3$$

Ответ: при  $k > 3$  уравнение имеет два корня.