
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова


«Особенности костнопластических операций при дефектах нижней челюсти»

Первая операция костной пластики нижней челюсти, проведенная В.М. Зыковым в 1900 году была успешной без ортопедических методов фиксации фрагментов челюстей.


В то время неудачи наблюдались у 50% пациентов, что было связано с недостаточной, несовершенной фиксацией фрагментов. Лишь с появлением смелой идеи С.С. Тигерштедта (1915г.), фиксировать фрагменты перелома в центральной оклюзии при полном закрытии рта в течении месяца, результаты стали стабильно положительными.



С. С. Тигерштедт




Трансплантат подвздошной кости установлен в заранее сформированное ложе по типу «русского замка» и фиксирован титановой реконструктивной пластиной



Фиксация аутотрансплантата подвздошной кости проволочными петлями

Вопрос о сроках снятия реконструктивных пластин, на наш взгляд, окончательно не решен.

Обычно мы предлагаем снять такую титановую пластину через 6-8 месяцев.




Резорбция костной ткани вокруг титановой пластины в области сформированного угла нижней челюсти через 3 года после операции

В связи с этим допустимым сроком откладывания операции по удалению реконструктивной титановой пластины следует считать 10-12 месяцев.


Клинические примеры операций



Пациентка А., 46 лет. Диагноз: «Рецидив остеобластокластомы нижней челюсти слева»




Пластика ауторебром дефекта нижней челюсти слева




Контрольная рентгенограмма через 2 месяца после операции





Пациент Ч., 31 г., диагноз «Адамантинома нижней челюсти справа»




Тот же пациент. Этапы операции










Пациент В., 34 г. Диагноз: «Адамантинома нижней челюсти слева»



Контрольная рентгенограмма через 6 месяцев после операции



Тот же пациент. Частичный съёмный протез изготовлен через 6 месяцев после операции





Пациентка К., 27 лет. Диагноз: «Рецидив адамантиномы нижней челюсти справа»





1

Этапы операции: «Резекция нижней челюсти справа». В ходе операции был сохранен подбородочный отдел нижней челюсти

