

Множества и основные операции над ними



Запись $x \in A$ означает, что элемент x *принадлежит* множеству A . Если x не является элементом множеств A , то пишут $x \notin A$ или $\overline{x \in A}$. Два множества A и B считаются *равными*, если они состоят из одних и тех же элементов. Будем писать $A = B$, если A и B равны и $A \neq B$ в противном случае.

Множество называется *пустым* и обозначается \emptyset , если оно не содержит элементов.

Будем говорить, множество A *включено* в множество B , и писать $A \subseteq B$, если каждый элемент множества A является элементом множества B . В этом случае A называется *подмножеством* множества B . Считается, что для любого A справедливо включение $\emptyset \subseteq A$.

Если $A \subseteq B$ и $A \neq B$, то будем писать $A \subset B$ и говорить, что множество A *строго включено* во множество B .

Семейство всех подмножеств данного множества A обозначается $P(A)$.

Мощностью конечного множества A будем называть число его элементов. Мощность конечного множества A обозначается $|A|$.

Объединением множеств A и B называется множество

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}.$$

Пересечением множеств A и B называется множество

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Разностью множеств A и B называется множество

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}.$$

Если все рассматриваемые множества являются подмножествами некоторого *универсального* множества U , то разность $U \setminus A$ называется *дополнением* A и обозначается \bar{A} .

Симметрической разностью множеств A и B называется множество $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Будем говорить, что множества A и B находятся в *общем положении*, и писать $A \oslash B$, если существуют такие элементы a, b, c , что $a \in A$ и $a \notin B$, $b \in B$ и $b \notin A$, $c \in A$ и $c \in B$.

Пример 1.

а) Справедливо ли в общем случае утверждение :
если $A \subset B$, $B \subseteq C$ и $C \subset D$, то $A \subseteq D$?

Пусть $x \in A$. Так как $A \subset B$, из определения включения следует, что $x \in B$. Так как $x \in B$ и $B \subseteq C$, то $x \in C$. Так как $x \in C$ и $C \subset D$, то $x \in D$. Итак, из того, что произвольный элемент $x \in A$ следует, что $x \in D$. На основании определения заключаем, что $A \subseteq D$, то есть данное утверждение верно.

б) Может при некоторых A, B, C и D выполняться набор условий: $A \subset B$, $B \subseteq C$ и $C \subset D$, и $A \subseteq D$?

Да, может. Это следует из справедливости утверждения в пункте а).

Примером могут служить множества $A = \{x\}$, $B = C = \{x, y\}$, $D = \{x, y, z\}$. Тогда $\{x\} \subset \{x, y\}$, $\{x, y\} \subseteq \{x, y\}$, $\{x, y\} \subset \{x, y, z\}$ и $\{x\} \subseteq \{x, y, z\}$.

Пример 2.

а) Справедливо ли в общем случае утверждение:

если $A \subset B$, $B \in C$ и $C \in D$, то $A \subseteq D$?

Пусть $A = \{x\}$, $B = \{x, y\}$, $C = \{\{x, y\}, z\}$, $D = \{\{\{x, y\}, z\}, w\}$.

Тогда $\{x\} \subset \{x, y\}$ и $\{x, y\} \in \{\{x, y\}, z\} \in \{\{\{x, y\}, z\}, w\}$.

Но в то же время неверно, что $\{x\} \subset \{\{\{x, y\}, z\}, w\}$, так как единственный элемент x множества A не является элементом множества D , состоящего из элементов $\{\{x, y\}, z\}$ и w . Итак, утверждение из нашего примера 2а) в общем случае неверно.

б) Может ли при некоторых A, B, C и D выполняться набор условий: $A \subset B$, $B \in C$, $C \in D$ и $A \subseteq D$?

Да, может. Например, $A = \emptyset$, $B = \{x\}$, $C = \{\{x\}, y\}$, $D = \{\{\{x\}, y\}, z\}$.

Тогда $\emptyset \subset \{x\}$, $\{x\} \in \{\{x\}, y\}$, $\{\{x\}, y\} \in \{\{\{x\}, y\}, z\}$ и в то же время $\emptyset \subseteq \{\{\{x\}, y\}, z\}$.

Задание 1.1.2

Для универсального множества $U = \{-5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5\}$, множества A , заданного списком, и для B , являющегося множеством корней уравнения $x^4 + \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta = 0$.

1. Найти множества: $A \cup B$, $B \cap A$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \Delta B$, \overline{B} , $C = (A \Delta B) \Delta A$.

2. Выяснить, какая из пяти возможностей выполнена для множеств A и C : $A \subset C$, или $C \subset A$, или $A = C$, или $A \cap C = \emptyset$, или $A \oslash B$.

3. Найти $P(B)$ и $|P(B)|$.

Пример решения задания 1.1.2

Решим задание 1.1.2 для $A = \{1, -2, 3, -4\}$ и уравнения

$$x^4 - 7x^3 + 6x^2 + 32x - 32 = 0.$$

Сначала найдём множество B корней данного уравнения. Подбором устанавливаем, что корнем исходного многочлена $x^4 - 7x^3 + 6x^2 + 32x - 32$ является 1; поделив этот многочлен на $x - 1$, получим многочлен $x^3 - 6x^2 + 32$.

Также подбором устанавливаем, что -2 является корнем многочлена $x^3 - 6x^2 + 32$ и делим этот многочлен на $x + 2$. Получим многочлен $x^2 - 8x + 16$. Его корни совпадают и равны 4.

Итак, множество B найдено, $B = \{-2, 1, 4\}$. Теперь решаем пункты 1—3 данного задания.

$$1. A \cup B = \{-4, -2, 1, 3, 4\}, B \cap A = \{-2, 1\},$$

$$A \setminus B = \{-4, 3\}, B \setminus A = \{4\},$$

$$A \Delta B = \{-4, 3, 4\}, \overline{B} = \{-5, -4, -3, -1, 2, 3, 5\},$$

$$C = (A \Delta B) \Delta A = \{-4, 3, 4\} \Delta \{1, -2, 3, -4\} = \{4\} \cup \{1, -2\} = \{-2, 1, 4\}.$$

2. Так как $-4 \in A$ и $-4 \notin C$, $4 \in C$ и $4 \notin A$, $1 \in A \cap C$, значит, $A \not\subseteq B$.

$$3. P(B) = \{\emptyset, \{-2\}, \{1\}, \{4\}, \{-2, 1\}, \{-2, 4\}, \{1, 4\}, \{-2, 1, 4\}\}.$$

Как видим, $P(B)$ содержит 8 элементов, т. е. $|P(B)| = 8$.

Задание 1.1.3

Пусть A , B и C — множества точек плоскости, координаты которых удовлетворяют условиям α , β и γ соответственно. Изобразите в системе координат xOy множество D , полученное из множеств A , B и C по формуле δ .

Пример решения задания 1.1.3

Пусть A , B и C — множества точек плоскости, координаты которых удовлетворяют условиям $x+2 > y$, $x^2 + y^2 \leq 4$ и $|x| \leq 2$; $|y| \leq 2$ соответственно. Изобразите в системе координат xOy множество D , полученное из множеств A , B и C по формуле $A \setminus (B \Delta C)$.

Множество B представляет из себя множество точек круга радиуса 2 с центром в начале координат, включающего границу, A — множество точек плоскости, расположенных выше и на прямой $y = x + 2$, и C — множество точек, лежащих внутри и на границе квадрата $|x| \leq 2$; $|y| \leq 2$.

Отметим горизонтальной штриховкой множество $B \Delta C$, а вертикальной — множество A (рис. 1.1.3, а).

Удалив из области, помеченной вертикальной штриховкой, точки области, помеченной горизонтальной штриховкой, мы получим множество точек, образующих D . Изобразим результат, отметив точки множества D вертикальной штриховкой (рис. 1.1.3, б).




Рис. 1.1.3

Задание 1.1.4

1. Существуют ли множества A, B, X такие, что выполняется набор условий α ?
2. Существуют ли множества N, E, P такие, что выполняется набор условий β ?

Пример решения задания 1.1.4

1. Существуют ли множества A, B, X такие, что выполняется набор условий: $\overline{A \cup B} = \emptyset$, $X \Delta A = \emptyset$, $B \setminus A \neq \emptyset$?

Изобразим множества A, B, X в виде прямоугольников, расположенных на плоскости в общем положении, и поставим в каждой области, на которые плоскость разбита прямоугольниками, по одному символу: символ 4, например, обозначает список всех элементов, попавших во множества A и B , но не попавших в X , и т. д. Теперь составим множества A, B, X и универсальное множество U (рис. 1.1.4):

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \quad A = \{1, 2, 4, 5\}, \quad B = \{4, 5, 6, 7\}, \quad X = \{2, 3, 5, 7\}.$$

Изменим множества A, B, X так, чтобы выполнились условия нашего задания.




Рис. 1.1.4

Из того, что $\overline{A \cup B} = \emptyset$, следует, что множество $U \setminus (A \cup B)$ не должно содержать элементов, т. е. из U удаляем 8 и 3.

Чтобы выполнилось условие $X \Delta A = \emptyset$, нужно удалить элементы списков 1, 4, 7. Тогда получится, что множества A , B , X и U имеют следующий вид: $A = \{2,5\} = X$, $B = \{5,6\}$, $U = \{2,5,6\}$. Заметим, что для этих множеств $B \setminus A = \{6\} \neq \emptyset$.

Если под символами 2, 5 и 6 будем понимать соответствующие числа, то мы получим конкретный пример множеств A , B , X , для которых выполнены все условия заданного набора требований.

2. Существуют ли множества N , E , P такие, что выполняется набор условий: $E \setminus N = P \setminus E = \emptyset$, $P \setminus N \neq \emptyset$?

Попробуем построить множества N , E , P так же, как мы это делали в п. 1. Пусть $N = \{1, 2, 4, 5\}$, $E = \{4, 5, 6, 7\}$, $P = \{2, 3, 5, 7\}$. Чтобы выполнилось условие $E \setminus N = \emptyset$, удаляем элементы списков 6, 7. Для выполнения условия $P \setminus E = \emptyset$ удаляем элементы из списков 2, 3. Но тогда множество $P \setminus N$ не будет содержать элементов. Итак, мы показали, что этот набор условий противоречив, т. е. не существует множеств N , E , P таких, что выполнены условия упражнения.

