Квадратичная функция, ее график и свойства

Наш девиз: «Трудное сделать легким, легкое привычным, привычное приятным!»

График функции $y = a x^2$,



при a=1

Х	-3	-2	-1	0	1	2	3
у	9	4	1	0	1	4	9

при a= -1

Х	-3	-2	-1	0	1	2	
у 3	-9	-4	-1	0	-1	-4	

-9

- Преобразование графика
- квадратичной функции

Построение графиков функций

$y=x^2$ *и* $y=x^2+m$.

$y=x^2+m,\ m>0$



$y=x^2+m,\ m<0$



Постройте в одной координатной плоскости графики функций:

$$y_1 = x^2$$

$$y_2 = x^2 + 5$$

$$y_3 = x^2 - 2$$



Построение графиков функций $y=x^2$ и $y=(x+l)^2$.

$$y=(x+l)^2,\ l>0$$



$y=(x+l)^2,\ l<0$



Постройте в одной координатной плоскости графики функций:

$$y_1 = x^2$$

$$y_2 = (x+1)^2$$

$$y_3 = (x-2)^2$$



Найти координаты вершины параболы:

- $У=2(x-4)^2 +5$ (4;5)
- $У=-6(x-1)^2$ (1;0)
- $У = -x^2+12$ (0;12)
- $У= x^2+4$ (0;4)
- $У= (x+7)^2 - 9$ (-7;-9)
- $У=6 x^2$ (0;0)

- График квадратичной
- функции, его свойства

Квадратичной функцией называется функция, которую можно задать формулой вида $y=ax^2+bx+c$, где
x - независимая переменная, a, b и c -некоторые числа (причём $a \neq 0$).

- Например: $y = 5x^2+6x+3$,
- $y = -7x^2+8x-2$,
- $y = 0{,}8x^2+5$,
- $y = \frac{3}{4}x^2-8x$,
- $y = -12x^2$

квадратичные функции

Графиком квадратичной функции является парабола, ветви которой направлены вверх(если a>0) или вниз (если a<0).





- $y=2x^2+4x-1$ – графиком является парабола, ветви которой направлены вверх (т.к. $a=2$, $a>0$).

- $y=-7x^2-x+3$ – графиком является парабола, ветви которой направлены вниз (т.к. $a=-7$, $a<0$).

Алгоритм решения

1. Определить координату вершины параболы по формула

$$x_0 = -\frac{b}{2a};\ y_0 = y(x_0)$$

2. Отметить эту точку на координатной плоскости.
3. Через вершину пар $x = x_0$ начертить ось симметрии параболы
4. Найти нули функции и 0тметить их на числовой прямой
5. Найти координаты двух дополнительных точек и симметричных им
6. Провести кривую параболы.

Постройте график функции
$y=2x^2+4x-6$,
опишите его свойства

Проверь себя:

1. D(y)= R

2. y=0, если x=1; -3

3. y>0, если x $\in(-\infty;-3)\cup(1;+\infty)$

y<0, если x $\in(-3;1)$

4. y↓, если x $\in(-\infty;-1]$

y↑, если x $\in[-1;+\infty)$

5. $y_{наим}$ *= -8, если x= -1*

$y_{наиб}$ *– не существует.*

6. E(y): $[-8;+\infty)$



Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции



Определение: Неравенство, левая часть которого есть многочлен второй степени, а правая- нуль, называется **неравенством второй степени.**

- *Все квадратные неравенства могут быть приведены к одному из следующих видов:*
- **1) $ax^2+bx+c>0$;**
  2) $ax^2+bx+c<0$;
- **3) $ax^2+bx+c\geq 0$;**
  4) $ax^2+bx+c\leq 0$.

Какие из неравенств вы бы назвали неравенствами второй степени:

- 1) $6x^2-13x>0$; 2) $x^2-3x-14>0$;
- 3) $(5+x)(x-4)>7$; 4) $\frac{2x-3}{5}>0$;

5) $\frac{x^3-5}{x+5}>0$

- 6) $8x^2>0$; 7) $(x-5)^2-25>0$;

Какие из чисел являются решениями неравенства?

$$2x^2 + x - 4 < 0$$

?	?	?	?	?	?	?	?
1	-3	0	-1	5	-4	-2	0,5

Назовите число корней уравнения $ax^2+bx+c=0$ и знак коэффициента a, если график соответствующей квадратичной функции расположен следующим образом:



а



б



в



г



д



е

Назовите промежутки знакопостоянства функции, если её график расположен указанным образом:

I вариант.



а



б



в

II вариант.



а



б



в

Назовите промежутки знакопостоянства функции, если её график расположен указанным образом:

I вариант



а

f(x)>0 при xЄR

f(x)<0 ———

II вариант



а

f(x)>0 при xЄ(-∞;1)U(2,5;+∞);

f(x)<0 при xЄ(1;2,5)

Назовите промежутки знакопостоянства функции, если её график расположен указанным образом:

I вариант



б

f(x)>0 при xЄ(-∞;-3)U(-3;+∞)

f(x)<0————

II вариант



б

f(x)>0 при xЄ(-∞;0,5)U(0,5;+∞)

f(x)<0 ————

Назовите промежутки знакопостоянства функции, если её график расположен указанным образом

I вариант



в

f(x)>0 при xЄ(-∞;-4)U(3;+∞);

f(x)<0 при xЄ(-4;3)

f(x)>0 ————————;

f(x)<0 при xЄR

II вариант



в

Алгоритм решения неравенств второй степени с одной переменной

Пример решения неравенства

1. Приведите неравенство к виду
   $ax^2+bx+c>0$ $(ax^2+bx+c<0)$
2. Рассмотрите функцию
   $y=ax^2+bx+c$
3. Определите направление ветвей
4. Найдите точки пересечения параболы с осью абсцисс (для них $y=0$; x_1 и x_2 найдите, решая уравнение $ax^2+bx+c=0$)
5. Схематически постройте график функции $y=ax^2+bx+c$
6. Выделите часть параболы, для которой $y>0$ ($y<0$)

$5x^2+9x-2<0$

2. Рассмотрим функцию

$y=5x^2+9x-2$

3. Графиком функции является парабола, ветви которой направлены вверх.

4. $5x^2+9x-2=0$

$x_1=-2$; $x_2=\frac{1}{5}$

5.



Алгоритм решения неравенств второй степени с одной переменной

1. Приведите неравенство к виду $ax^2+bx+c>0$ $(ax^2+bx+c<0)$
2. Рассмотрите функцию $y=ax^2+bx+c$
3. Определите направление ветвей
4. Найдите точки пересечения параболы с осью абсцисс (для них y=0; x_1 и x_2 найдите, решая уравнение $ax^2+bx+c=0$)
5. Схематически постройте график функции $y=ax^2+bx+c$
6. Выделите часть параболы, для которой y>0 (y<0)
7. На оси абсцисс выделите те значения x, для которых y>0 (y<0)

Пример решения неравенства

$5x^2+9x-2<0$

2.Рассмотрим функцию

$y=5x^2+9x-2$

3. Графиком функции является парабола, ветви которой направлены вверх.

4. $5x^2+9x-2=0$

$x_1=-2$; $x_2=\frac{1}{5}$

5.



Алгоритм решения неравенств второй степени с одной переменной

1. Приведите неравенство к виду
$ax^2+bx+c>0$ ($ax^2+bx+c<0$)
2. Рассмотрите функцию
$y=ax^2+bx+c$
3. Определите направление ветвей
4. Найдите точки пересечения параболы с осью абсцисс (для них $y=0$; x_1 и x_2 найдите, решая уравнение $ax^2+bx+c=0$)
5. Схематически постройте график функции $y=ax^2+bx+c$
6. Выделите часть параболы, для которой $y>0$ ($y<0$)
7. На оси абсцисс выделите те значения x, для которых $y>0$ ($y<0$)
8. Запишите ответ в виде промежутков

Пример решения неравенства

$5x^2+9x-2<0$

2.Рассмотрим функцию

$y=5x^2+9x-2$

3. Графиком функции является парабола, ветви которой направлены вверх.

4. $5x^2+9x-2=0$

$x_1=-2$; $x_2=\frac{1}{5}$

5.



8. $x \in (-2; \frac{1}{5})$

В таблице 1 найдите верное решение неравенства 1, в таблице 2 - решение неравенства 2:

1. $x^2 - 3x - 4 \geq 0$

2. $x^2 - 3x - 10 < 0.$

Таблица 1

a	в
$x \in (-1;4)$	$x \in (-\infty;-1] \cup [4;+\infty)$
c	d
$x \in [-1;4]$	$x \in (-\infty;-1) \cup (4;+\infty)$

Таблица 2

a	в
$x \in (-2;5)$	$x \in (-\infty;-2) \cup (5;+\infty)$
c	d
$x \in [-2;5]$	$x \in (-\infty;-2] \cup [5;+\infty)$

В таблице 1 найдите верное решение неравенства 1, в таблице 2- решение неравенства 2:

1. $x^2 - 3x - 4 \geq 0$

2. $x^2 - 3x - 10 < 0.$

Таблица 1

a	в
$x \in (-1;4)$	$x \in (-\infty;-1] \cup [4;+\infty)$
c	**d**
$x \in [-1;4]$	$x \in (-\infty;-1) \cup (4;+\infty)$

Таблица 2

a	в
$x \in (-2;5)$	$x \in (-\infty;-2) \cup (5;+\infty)$
c	**d**
$x \in [-2;5]$	$x \in (-\infty;-2] \cup [5;+\infty)$

В таблице 1 найдите верное решение неравенства 1, в таблице 2- решение неравенства 2:

1. $x^2 - 3x - 4 \geq 0$

2. $x^2 - 3x - 10 < 0.$

Таблица 1

a	в
$x \in (-1;4)$	$x \in (-\infty;-1] \cup [4;+\infty)$
c	d
$x \in [-1;4]$	$x \in (-\infty;-1) \cup (4;+\infty)$

Таблица 2

a	в
$x \in (-2;5)$	$x \in (-\infty;-2) \cup (5;+\infty)$
c	d
$x \in [-2;5]$	$x \in (-\infty;-2] \cup [5;+\infty)$

В таблице 1 найдите верное решение неравенства 1, в таблице 2- решение неравенства 2:

1. $x^2 - 3x - 4 \geq 0$

2. $x^2 - 3x - 10 < 0.$

Таблица 1

a	в
$x \in (-1;4)$	$x \in (-\infty;-1] \cup [4;+\infty)$
c	d
$x \in [-1;4]$	$x \in (-\infty;-1) \cup (4;+\infty)$

Таблица 2

a	в
$x \in (-2;5)$	$x \in (-\infty;-2) \cup (5;+\infty)$
c	d
$x \in [-2;5]$	$x \in (-\infty;-2] \cup [5;+\infty)$

Итог урока

При решении данных заданий нам удалось систематизировать знания о применении квадратичной функции. Математика- это содержательное, увлекательное и доступное поле деятельности, дающее ученику богатую пищу для ума. Свойства квадратичной функции лежат в основе ***решения квадратных неравенств***. Многие ***физические зависимости*** выражаются квадратичной функцией; например, камень, брошенный вверх со скоростьюv0, находится в момент времени t на расстоянии

s(t)=-q\2t2+v0t

от земной поверхности (здесь q- ускорение силы тяжести);
количество тепла Q, выделяемое при прохождении тока в проводнике с сопротивлением R, выражается через силу тока I формулой

Q=RI2.

Знания свойств квадратичной функции позволяют рассчитать дальность полета тела, брошенного вертикально вверх или под некоторым углом. Этим пользуются ***в оборонной промышленности.***

спасибо за урок