



НОКЗ, 10 класс, Цитология

Биосинтез белка. Трансляция.




Транскрипция



- РНК-полимераза



Немембранные органоиды





Жгутики про и эукариот




Задание по рисунку

- Ядро
- Бактериальная клетка







Последовательность

- Фотосинтез
- Дыхание
- Синтез белка

Неправильные суждения

- **Обмен веществ**
- **Биосинтез**

НОКЗ, 11 класс, Беспозвоночные



Клещ

- Глаза
- У большинства иксоид только одна пара глаз, расположенных на боковых краях спинного [щитка](#). Исключение – роды *Ixodes* и *Haemaphysalis*, у которых глаза отсутствуют Тарасов В.В. Медицинская энтомология. М.: Изд-во МГУ, 1996 – 353 с.
- У видов *Haemaphysalis* и *Ixodes* глаза отсутствуют, однако в поведенческих опытах с *I. persulcatus* отмечена реакция на свет, исчезающая при закрашивании переднего дорсального отдела идиосомы (Панфилова, 1976). У безглазых видов *Ixodes*, *Haemaphysalis* и *Aronomma* под кутикулой были обнаружены скопления светочувствительных клеток в тех местах, где приблизительно размещаются глаза у видов, ими обладающих (Binnington, 1972).

Коралловые полипы



Последовательность развития комара



Цикл развития аскариды

