Распространение горихвостки-чернушки в Крыму

Работу выполнила **Лисюра Татьяна Николаевна,**
педагог дополнительного образова
ния ЦДЮТ Симферополь
ский р-н Республика Крым

Чей напев, с концовкой разной.
То синицей прозвенит.
То весничку передразнит.
То зарянку повторит?
Чёрно-ржавая манишка.
Подвижной с рыжинкой хвост...
На селе любой парнишка
Сразу скажет: —
Горихвост! —
Чуть зари зажглись полоски.
Ветром тронут лёгкий лист.
Дрогнул голос горихвостки —
Переливы полились.

Описание

Горихвостка – чернушка небольшая птица семейства мухоловковых , отряда воробьиных . Эта птичка размером 10-15 см. окрас хвоста и брюшка-насыщенно рыжий (отсюда название) , спинка черная . Самки обычно более бурого цвета птичка характерно

ВИДЫ

Всего на территории Росси насчитывается 6 видов

Горихвосток :

Горихвостка - обыкновенная

Горихвостка-чернушка

Горихвостка - белошапочная

Горихвостка – сибирская

Горихвостка – рыжеспинная

Горихвостка -

Распространение птицы В Крыму

Горихвостка –чернушка встречается на лесных полянах, пустырях , в степи , в садах , полях и виноградниках .
А также в населённых пунктах , на скалистых участках морских берегов и горных склонов , в редколесьях .
Расселение горихвостки – чернушки в Крыму непоследовательное и неравномерное . В последние годы , кроме населённых пунктов птицы стали встречаться в горной части полу острова ,на скальных обрывах .

В зимний период встречается очень редко . В морозные дни птицы часто отмечались вблизи тёплых укрытий . При температуре 21 – 23 на Керченском полуострове - у входа в штольни, где температура была около 0 градуса . При температуре -2 градуса среди строений в Балаклавской бухте , при температуре -8 среди палубных надстроек на судне , в бухтах Севастополя

Но учитывая , что с 1990г. Зимующих горихвосток – чернушек стали регистрировать в этих местах ежегодно , то следует признать , что зимовки этого вида стали



Рис.1 Пункты регистрации горихвостки чернушки в Крыму в гнездовой и зимний периоды.



Рис.2. *Сезонная динамика встречаемости горихвостки-чернушки в юго-восточном Крыму (1981-2006 гг.)*

Fig. 2. *Seasonal dynamics of occurence of the Black Redstart in the south-eastern Crimea (1981-2006).*

Весенний прилёт птиц начинается в марте и оканчивается в апреле.
Осенний пролёт – в октябре – ноябре . В феврале горихвостка- чернушка встречается редко , из за ухудшения погоды и гибели птиц

Из тёплых краёв самцы горихвосток прилетают первыми и сразу начинают искать подходящее место : дупло , лощинку обшивку стены дома или сами

Некоторые самцы могут сами залезть в дупло , а хвост – выставить наружу , показывая тем самым , что оно занято .
Гнездо строит только самочка , а самец охраняет . Сидит и поёт с утра до ночи .

А когда появляются птенцы обоим родителям не до пения . За день они должны принести добычи не менее 500 раз.

Через пару недель самка опять откладывает яйца. И для родителей всё начинается вновь

Польза от горихвосток для наших парков и садов неоценима . За лето они уничтожают огромное количество комаров , жуков , гусениц и прочих насекомых

Так давайте беречь

и

Охранять

Нашу горихвостку

Как сделать скворечник своими руками

Проблема вытеснения птиц из городов стоит остро. Интенсивное строительство сокращает площади, занятые парками и просто деревьями. В городе изготовление и установка правильного скворечника это общественно полезное мероприятие, способствующее озеленению и поддержанию экологичности района.

Зачем:

1. Сделать доброе дело.
2. Поспособствовать ограждению растений от вредных насекомых.
3. Пообщаться с папой/старшим братом.
4. Получить "5" по экологии.

Виды скворечников

Домишки-ромбики

Для горихвосток.

Сарайчики

Для трясогузок.

Дуплянка-лежак

Для сычей и галок.

Полудуплянка

Для зарянок.

Что нужно:

1. Папа/старший брат



2. Молоток

3. Гвозди

4. Доски

Как сделать:

1. Делаем 1 стенку.



2. ... 2 стенку.



3. ...2 боковые стенки.



4. ... дно.



5. ...крышку.



6. Скворечник готов!

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!