

Метод рекуррентных соотношений

Метод рекуррентных соотношений состоит в том, что решение комбинаторной задачи с n предметами выражается через решение аналогичной задачи с меньшим числом предметов с помощью некоторого соотношения, называемого рекуррентным.

Рекуррентное соотношение порядка k имеет вид:

$$x_{n+k} = F(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1})$$

Примеры:

$$x_{i+1} = x_i + 5$$

$$x_{i+3} = x_i * 5x_{i+1} - x_{i+2}$$

$$x_i = x_{i-1} * 5x_{i-2}$$

- ✓ Т.к. первые k членов последовательности можно задавать произвольно, то множество решений рекуррентного соотношения бесконечно.
- ✓ Каждое решение однозначно определяется заданием первых k членов последовательности (начальными условиями) и называется **k -го порядка**.
- ✓ **Решение** рекуррентного соотношения k - го порядка называется **общим**, если оно содержит k произвольных постоянных и путем их подбора можно получить любое решение этого соотношения.
- ✓ **Решение**, получающееся из общего путем подбора произвольных постоянных, называется **частным**.

- Линейное рекуррентное соотношение имеет вид :

$$x_{n+k} = a_1 x_{n+k-1} + a_2 x_{n+k-2} + \dots + a_k x_n + B$$

- Если B равно нулю оно называется однородным, при B , не равном нулю, оно называется неоднородным.

- Линейное однородное рекуррентное соотношения (ЛОРС) :

$$x_{n+k} = a_1 x_{n+k-1} + a_2 x_{n+k-2} + \dots + a_k x_n$$

Решение ЛОРС

- Общим решением является

$$x_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n + \dots + C_k \lambda_k^n$$

где λ - корни характеристического уравнения

$$\lambda^k - a_1 \lambda^{k-1} - a_2 \lambda^{k-2} - \dots - a_{k-1} \lambda^1 - a_k = 0$$

- и если λ имеет кратность t , то соответствующее этому корню слагаемое в общем решении можно заменить на:

$$(C_1 + C_2 n + \dots + C_t n^{t-1}) \lambda_1^n$$

- Для нахождения частного решения необходимо найти постоянные C_i , исходя из начальных условий.

Решение ЛОУРС «Числа

Фиббоначи»

$$X_{n+2} = X_{n+1} + X_n$$

ЛОУРС второго порядка

• Числа, являющиеся его решениями при $n \geq 0$. $X_0 = 0$, $X_1 = 1$, называются числами Фиббоначи.

• К числам Фиббоначи приводит следующая задача теории информации. Найти количество способов передачи сообщений (последовательность нулей и единиц), чтобы рядом не оказалось два нуля.

✓ Обозначим U_n - количество сообщений которое можно передать с помощью n сигналов (0 или 1) так, чтобы при этом не оказались рядом два сигнала 0. Очевидно, что $U_0 = 1$ (отсутствие сигнала считаем как сообщение), $U_1 = 2$.

✓ Все U_{n+2} сообщений "длины" $n+2$ можно разбить на 2 класса:

1) те у которых первый сигнал 1 (их число равно U_{n+1} , т.к. второй сигнал может быть любым 0 или 1); 1^{**}

2) те у которых первый сигнал 0 (и следовательно, обязательно второй сигнал 1) их число равно U_n . 01^*

✓ Следовательно, $U_{n+2} = U_{n+1} + U_n$ оказывается числами Фиббоначи со сдвинутыми номерами.

- Общее решение рекуррентного соотношения Фиббоначи.

□ Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

□ Корни уравнения: $\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ $\lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

□ общее решение: $f_n = C_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$

- Частное решение чисел Фиббоначи

- Используем начальные условия: $f_0 = 0$, $f_1 = 1$

- Подставляя их в общее решение, получим:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 \frac{1+\sqrt{5}}{2} + C_2 \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 \end{cases}$$

- Находим C_1 и C_2 :

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} ; C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

- Частное решение

соотношения :

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right]^n + \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right]^n$$

Решить рекуррентное соотношение: $10a_{n-1} = -25a_n - a_{n-2}$

При начальных условиях $a_0 = -1$ $a_1 = 2$.

Член последовательности, наиболее близкий к ее началу -

a_{n-2}

Обозначим его через λ^0 . Тогда характеристическое уравнение:

$$10\lambda = -25\lambda^2 - 1 \text{ или } 25\lambda^2 + 10\lambda + 1 = 0.$$

Корни характеристического уравнения: $\lambda_{1,2} = -1/5$.

Тогда общее решение рекуррентного соотношения имеет

вид

(с учетом, что у нас кратные корни)

$$a_n = (C_1 + nC_2)\lambda^n = (C_1 + nC_2)(-1/5)^n$$

Найдем частное решение:

Из первого начального условия (при $n=0$ $a=-1$): $C_1 = -1$;

Из второго начального условия (при $n=1$ $a=2$): $2 = (C_1 +$

$C_2)(-1/5)$.

Подставим в это уравнение $C_1 = -1$, тогда $C_2 = -9$.

Окончательный ответ (частное решение):

$$a_n = (C_1 + nC_2)\lambda^n = (-1 - 9n)(-1/5)^n$$