


**АНАТОМИЯ И
ФИЗИОЛОГИЯ
СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ**

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

совокупность полых органов и сосудов, обеспечивающих процесс кровообращения, постоянную, ритмическую транспортировку кислорода и питательных веществ, находящихся в крови и выведение продуктов обмена


СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ

- Сердце
- Артериальные сосуды
- Венозные сосуды




Отделы кровообращения

- ❑ **Центральный** - сердце и крупные сосуды
- ❑ **Периферический** – сосудистое русло на уровне органов и тканей
- ❑ **Микроциркуляторный** – микроциркуляторное русло (артериолы, капилляры, венулы)



Центральным органом сердечно-сосудистой системы является сердце, которое своими ритмичными сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ



Андреас Везалий
(1514-1564),
итальянский врач и
анатом,
основоположник
научной анатомии в
своем труде «О
строении
человеческого тела»
дал правильное
описание строения
сердца.

Исторические факты



Уильям Гарвей (1578-1657г), английский врач, основоположник экспериментальной физиологии. В 1628 году он опубликовал известный труд *Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных, где привел доказательства о движении крови по сосудам БКК*

СЕРДЦЕ

Полый фиброзно-
мышечный орган

Имеет форму конуса

Масса - 250-350 г


Поперечный размер
- 9-11 см

Длина - 10-15 см

Переднезадний размер
6-8 см

Толщина стенки правого
желудочка – 4-6 мм

Толщина стенки левого
желудочка – 9-11 мм



(b)

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.

ТОПОГРАФИЯ

Расположено сердце в грудной полости, в нижнем среднем средостении.

Спереди оно прилежит к груди́не и рёберным хрящам

С боков соприкасается с плевральными мешками лёгких


Сзади - с пищеводом и грудной аортой

Снизу - с диафрагмой.



ПОВЕРХНОСТИ


- Грудинно-реберная.
- Диафрагмальная.
- Легочная.



ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

Верхушка -
обращена влево и
вперед.


Основание - сверху
и сзади.



ГРАНИЦЫ СЕРДЦА


- Верхняя граница - на уровне верхних краев III правого и левого реберных хрящей
- Правая - от III ребра на 1-2 см от края грудины до V реберного хряща.
- Левая - от III ребра до верхушки сердца
- Нижняя - от V ребра до верхушки сердца
- Верхушка сердца - V межреберье слева на 1-2 см внутрь от среднеключичной линии.

ТОПОГРАФИЯ СЕРДЦА



УШКИ


- Передняя стенка правого и левого предсердия имеет обращенное кпереди конусообразное расширение – *правое и левое ушко*.
- Оба ушка охватывают спереди начало аорты и легочного ствола
- Являются дополнительными резервными полостями.



СТРОЕНИЕ СЕРДЦА


Сердце состоит из двух половин:

- Правая половина - венозная
- Левая половина - артериальная



ПЕРЕГОРОДКИ


- Межпредсердная
- Межжелудочковая



ПЕРЕГОРОДКИ


● Межпредсердная

Межжелудочковая



КАМЕРЫ СЕРДЦА

- Правое предсердие
- Левое предсердие
- Правый желудочек
- Левый желудочек






ПРЕДСЕРДИЯ

- ◉ Емкость около 100-180 мл
- ◉ В правое предсердие входят **верхняя и нижняя полые вены**
- ◉ В левое предсердие входят **легочные вены**
- ◉ Соединяются с желудочками при помощи предсердно-желудочковых отверстий

ЖЕЛУДОЧКИ


- ◉ Форма пирамиды верхушкой вниз
- ◉ На внутренней поверхности находятся мясистые трабекулы и конусовидные сосочковые мышцы
- ◉ Мышцы посредством сухожильных хорд прикрепляются к створкам
- ◉ Из правого желудочка - выходит **легочной ствол**
- ◉ Из левого желудочка - **выходит аорта**





СТРОЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ СТЕНКИ

- ◉ Внутренний слой - эпителиальная ткань (эндокард)
- ◉ Средний слой - поперечнополосатая мышечная ткань (миокард)
- ◉ Наружный слой - эпикард




Строение стенок сердца.

ЭНДОКАРД

- ◉ Выстилает полости изнутри
- ◉ Состоит из соединительной ткани с эластическими волокнами и гладкомышечными клетками+эндотелий
- ◉ Образует предсердно-желудочковые клапаны, клапаны аорты, легочного ствола, заслонки нижней полой вены и венечного синуса
- ◉ Опорой для клапанного аппарата служат фиброзные кольца

Клапаны сердца




КЛАПАНЫ СЕРДЦА

митральный и трикуспидальный
(створчатые) открываются в сторону
желудочков и пропускают кровь только в
этом направлении;
аортальный и легочной (полулунные),
состоят из трех полулунных заслонок и
открываются по направлению тока крови в
этих сосудах


Клапаны сердца

образованы складками эндокарда (внутренняя оболочка сердца).



**полулунные
клапана** –
между
желудочками
и артериями




**трехстворчатый
клапан** –
между ПП и ПЖ




**двухстворчатый
клапан
(митральный)** –
между ЛП и ЛЖ








Полулунные клапаны аорты



E.Faccio P.Saccheri
S.R. 2007




Трехстворчатый клапан



МИОКАРД

- ◉ Образован сердечной поперечно-полосатой мышечной тканью
- ◉ Сердечные кардиомиоциты, соединенных посредством вставочных дисков
- ◉ Наружный слой - косоое расположение волокон
- ◉ Средний слой - круговыми пучками мышечных волокон
- ◉ Внутренний слой - продольное расположение (дает начало сосочковым мышцам и мясистым трабекулам)
- ◉ Мышечные волокна предсердий не переходят в мышечные волокна желудочков


МИОКАРД




ПЕРИКАРД

- Околосердечная сумка
- Состоит из двух листков:
 - наружный листок - париетальный (изолирует сердце, защищает от чрезмерного растяжения), выстилает перикард и переходит в эпикард у места отхождения крупных сосудов
 - внутренний - висцеральный (эпикард)
- Перикардальная полость - содержит серозную жидкость, уменьшает трение при сердечных сокращениях

ПЕРИКАРД




здоровое сердце



перикард

тампонада



жидкость (выпот, кровь и т.п.)
в полости перикарда



БОРОЗДЫ


- Передняя межжелудочковая
- Задняя межжелудочковая
- Поперечная (венечная)

- Вдоль борозд проходят собственные артерии и вены сердца
- Бороздам соответствуют перегородки
- Венечная разделяет предсердия от желудочков
- Межжелудочковые разделяют желудочки

КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ


- ◉ Левая венечная артерия - кровоснабжает стенку левого желудочка, сосочковые мышцы левого желудочка, передние отделы межжелудочковой перегородки, переднюю стенку правого желудочка и стенку левого предсердия
 - Передняя межжелудочковая ветвь
 - Огибающая ветвь
- ◉ Правая венечная артерия - стенку правого желудочка и предсердия, заднюю часть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка, узлы проводящей системы
 - отдает заднюю межжелудочковую ветвь

КОРОНАРНЫЕ АРТЕРИИ



ВЕНЫ

- Более многочисленны, чем артерии
- Большинство вен впадает в венозный синус
- Венозный синус впадает в правое предсердие



ФУНКЦИИ СЕРДЦА

- ◉ Автоматизм - зарождение электрического импульса
- ◉ Возбудимость - способность сердечной мышцы приходить в деятельное состояние - возбуждение
- ◉ Проводимость - способность распространять возбуждение от одного участка мышечной ткани к другому
- ◉ Сократимость - способность сердечной мышцы развивать при возбуждении напряжение и укорачиваться
- ◉ Тоничность - фаза отдыха

ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЦА

Автоматизм - способность сердечной мышцы приходить в состояние возбуждения и ритмического сокращения без внешних воздействий. Обеспечивается *проводящей системой сердца.*

ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА

- Осуществляется атипичными сердечными клетками, богато иннервированных, с небольшим количеством миофибрилл - миоцитами
- Центры проводящей системы:
 - Синусно-предсердный узел
 - Предсердно-желудочковый узел
 - Предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса)
 - Правая и левая ножки
 - Волокна Пуркинье

ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА СЕРДЦА


- ◎ синусно-предсердный узел (*синусный, узел А.Киса - М.Флека- англ. ученые*) находится в стенке правого предсердия между отверстиями верхней полый вены и правым ушком. Состоит из клеток - пейсмекерных, способных к самопроизвольным сокращениям и отдающим ветви к миокарду предсердий;
- ◎ -предсердно-желудочковый узел (*узел Л.Ашоффа нем. уч.– С.Тавары яп. уч.*) лежит в толще нижнего отдела межпредсердной перегородки вблизи места впадения нижней полый вены. Клетки узла передают возбуждение на предсердно-желудочковый пучок и к рабочему миокарду

ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА СЕРДЦА

предсердно-желудочковый пучок

(пучок Гиса нем. уч.) связывает миокард предсердий с миокардом желудочков, в межжелудочковой перегородке этот пучок делится на правую и левую ножки, отдающие веточки к миокарду каждого желудочка – волокна Я.Пуркинье

Патологические изменения в проводящей системе приводят к нарушениям ритма сердечной деятельности.



Миокард функцией автоматизма не обладает. Главный водитель сердечного ритма- синусно-предсердный узел, вырабатывает электрические импульсы с частотой 60-80 в мин. – синусный ритм. Это центр автоматизма первого (I) порядка.

Центром автоматизма II порядка является зона перехода предсердно-желудочкового узла в пучок В.Гиса, продуцирует импульсы с частотой 40-60 в мин.

Центр автоматизма III порядка – нижняя часть пучка В.Гиса, его ветви и волокна Я.Пуркинье (25-45 импульсов в мин.)

Причины автоматизма-

продукты обмена веществ:

- углекислый газ,**
- молочная кислота**

СЕРДЕЧНЫЙ ЦИКЛ


- 1 фаза - сокращение предсердий (систола предсердий) - длится 0,1 сек
- 2 фаза - сокращение желудочков (систола желудочков) длится 0,3 сек
- Диастола или пауза длится 0,4 сек

- Нормальная частота сердечных сокращений – 60-90 в мин
- Частота менее 60 в мин – брадикардия
- Частота более 90 в мин - тахикардия

Сердечный цикл


1. Сокращение (систола) предсердий

Длится около 0.1 с.
Желудочки расслаблены, створчатые клапаны открыты, полулунные – закрыты. Кровь из предсердий поступает в желудочки.




2. Сокращение (систола) желудочков

Длится около 0.3 с.
Предсердия расслаблены, створчатые клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты. Кровь из желудочков поступает в легочную артерию и аорту.



3. Пауза. Расслабление предсердий и желудочков (диастола)


Длится около 0.4 с.
Створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты. Кровь из вен попадает в предсердие и частично стекает в желудочки.



Оптимальный режим работы сердца:

предсердия работают 0.1 с и отдыхают 0.7 с, а желудочки работают 0.3 с и отдыхают 0.5 с.

Фазы сердечного цикла



наполнение кровью предсердий

сокращение предсердий (желудочки расслаблены)

сокращение желудочков (предсердия расслаблены)

общее расслабление предсердий и желудочков

Рис. 86. Сердечный цикл

Ударный объем сердца (систолический) – количество крови, которое выбрасывают желудочки в покое в аорту и легочный ствол.(70-80 мл.).

Резервный объем – остающаяся кровь в желудочках, после систолы желудочков

Остаточный объем крови - количество крови, которое остается в сердце даже после самого сильного сердечного сокращения.

Минутный объем крови - количество крови, которое желудочки выбрасывают за минуту – 5-6 литров.

ЗАКОНЫ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Закон сердечного волокна, или закон О.Франка -Э.Старлинга, чем больше растянуто сердечное мышечное волокно, тем сильнее оно сокращается.(чем больше в сердце скапливается крови во время диастолы, тем сильнее растягивается сердечная мышца и тем энергичнее она сокращается при следующей систоле)

ЗАКОНЫ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.Закон сердечного ритма, или рефлекс Ф.Бейнбриджа, при повышении кровяного давления в устьях полых вен происходит рефлекторное увеличение частоты и силы сердечных сокращений

Законы относят к механизмам саморегуляции, обеспечивающим приспособление работы сердца к изменяющимся условиям существования.

Способы регуляции

```
graph TD; A[Способы регуляции] --> B[Нервная регуляция]; A --> C[Гуморальная регуляция];
```

The diagram features a central anatomical illustration of a human heart with glowing blue and red vessels. Two arrows point from a top box to two side boxes. Each side box has a corresponding text box below it. The background is a light purple gradient with faint circular patterns.

Нервная регуляция

Нервная система постоянно контролирует работу сердца посредством нервных импульсов.

Гуморальная регуляция

Деятельность сердца регулируется химическими веществами, постоянно поступающими в кровь.

РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Нервная регуляция осуществляется сосудодвигательным центром, симпатическими и парасимпатическими волокнами вегетативной нервной системы.

Сосудодвигательный центр – это совокупность нервных образований, расположенных в спинном, продолговатом мозге, гипоталамусе и коре большого мозга.

Основной *сосудодвигательный центр* находится в продолговатом мозге и состоит из двух отделов: *прессорного и депрессорного*.


ИННЕРВАЦИЯ

- ◉ Симпатические волокна от ЯДЕР расположенных в боковых рогах I-IV грудных сегментов СМ
- ◉ Парасимпатические волокна от блуждающего нерва - X пара ЧН, ядра расположены в продолговатом мозге
- ◉ Чувствительные волокна от рецепторов стенок сердца и его сосудов в составе нервов к спинному и головному мозгу

Иннервация

- ◉ Возбуждение блуждающих нервов (парасимпатические волокна)
 - Тормозит и ослабляет деятельность сердца
 - Понижает возбудимость и проводимость миокарда
- ◉ Возбуждение симпатических нервов
 - Учащает и усиливает ритм сердечных сокращений
 - Повышает возбудимость и проводимость миокарда

ГОЛОВНОЙ МОЗГ



Раздражение прессорного центра

вызывает сужение артерий и подъема АД.

Раздражение депрессорного центра –

расширение артерий и падение АД.

Тонус сосудодвигательного центра продолговатого мозга зависит от нервных импульсов, идущих постоянно к нему от рецепторов различных рефлексогенных зон.

Рефлексогенная зона - участок сосудистой стенки, содержащий наибольшее количество рецепторов.


РЕЦЕПТОРЫ

- 1) механорецепторы** (баро-, или прессорецепторы – греч. baros – тяжесть; лат. pressus – давление), воспринимающие колебания давления крови в сосудах в пределах 1-2 мм рт.ст.;
- 2) хеморецепторы**, воспринимающие изменения химического состава крови (CO₂, O₂, СО и др.);
- 3) волюморецепторы** (франц. volum – объем), воспринимающие изменение объема крови;
- 4) осморецепторы** (греч. osmos – толчок, проталкивание, давление), воспринимающие изменение осмотического давления крови

РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ

- 1) аортальная зона (дуга аорты);*
- 2) синокаротидная зона (общая сонная артерия в месте бифуркации, т.е. деления на наружную и внутреннюю сонные артерии);*
- 3) само сердце;*
- 4) устье полых вен;*
- 5) область сосудов малого круга кровообращения.*

Информация от рецепторов поступает в ЦНС и в соответствии с полученной информацией изменяется работа сердца и кровеносных сосудов.





Гуморальная регуляция – на работу сердца влияют различные биологически активные вещества. Например, **гормон адреналин** и **соли кальция** увеличивают силу и частоту сердечных сокращений, а вещество **ацетилхолин** и **ионы калия** уменьшают их. По приказу **гипоталамуса** мозговое вещество надпочечников выделяет в кровь большое количество **адреналина – гормона** широкого спектра действия: суживает кровеносные сосуды внутренних органов и кожи, расширяет венечные сосуды сердца, повышает частоту и силу сердечных сокращений. Стимулы выбрасывания адреналина: стресс, эмоциональное возбуждение. Частое повторение этих явлений может вызвать нарушение деятельности сердца.

СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) адреналин – гормон мозгового слоя надпочечников;
- 2) норадреналин – медиатор симпатических нервов и гормон надпочечников;
- 3) вазопрессин – гормон задней доли гипофиза;
- 4) серотонин – биологически активное вещество, образуемое в слизистой оболочке кишечника, мозге, тромбоцитах, соединительной ткани

СОСУДОРАСШИРЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) гистамин – биологически активное вещество, образующееся в стенке желудочно-кишечного тракта и других органах;
- 2) ацетилхолин – медиатор парасимпатических и других нервов;
- 3) тканевые гормоны: кинины, простагландины др.;
- 4) молочная кислота, углекислый газ, ионы калия, магния и т.д.
- 5) аурикулин – гормон, вырабатываемый кардиомиоцитами предсердий

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

1. Верхушечный толчок
2. Сердечные тоны
3. Электрические явления в сердце.

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

Верхушечный толчок, во время систолы желудочков сердце поворачивается слева направо и изменяет свою форму (становится круглым), верхушка сердца поднимается и надавливает на грудную клетку в области V межреберья слева.

Сердечные тоны - звуковые явления, возникающие в работающем сердце.

I тон (систолический) низкий, глухой, продолжительный (колебание створок при закрытии створчатых клапанов, колебание натягивающихся сухожильных нитей - хорд);

II тон (диастолический) короткий и более высокий (момент закрытия полулунных клапанов).

ФОНОКАРДИОГРАФИЯ

III тон обусловлен колебаниями стенок сердца вследствие быстрого притока крови в желудочки в начале диастолы.

IV тон обусловлен колебаниями стенок сердца, вызванными сокращением предсердий и нагнетанием крови в желудочки.


Каждое сокращение сердца
сопровождается возникновением
электрических явлений в сердечной мышце.

Первая регистрация биопотенциалов -
1903г. В. Эйнтховен, прибор - струнный
гальванометр

Россия - А.Ф.Самойлов.

*Регистрация биотоков сердца
называется электрокардиографией,
полученная кривая ЭКГ.*

ЭКГ здорового человека



Спасибо за
внимание!