# ДВС-СИНДРОМ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Быковская Кира Владимировна 401 группа

#### ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

1	Что такое ДВС-
•	синдром?
2	Этиология
	Патогенез
3	Классификац
	RN
4	Диагностик
	a
5	Лечени
	е

#### <u>ЧТО ТАКОЕ ЛВС-СИНЛРОМ?</u>

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром) - приобретённая, вторичная острая коагулопатия потребления сопутствующая критическому состоянию и при которых потребляются как компоненты свертывающей, так и противосвертывающей системы крови приводя, с одной стороны, к коагулопатическому кровотечению, с другой - к диссеминированному внутрисосудистому микротромбозу и развитию полиорганной недостаточности

#### <u>ЧТО ТАКОЕ ЛВС-СИНЛРОМ?</u>

В настоящее время ДВС-синдром рассматривается только как острая патология, а этиологическими факторами являются критические состояния

- ДВС-синдром сопровождает критические состояния в акушерстве как связанные с кровотечением (первое место в структуре материнской смертности), так и с развитием полиорганной недостаточности
- В целом, ДВС-синдром сопровождает критические состояния в акушерстве в 30-40% случаев.

 При массивном акушерском кровотечении исходные нарушения в системе гемостаза, как этиологический фактор, занимают не более 1,5%, а ведущее место принадлежит гипотоническим кровотечениям - до 60-70%.

юке, тромботической микроангиопатии рма ДВС-синдрома встречается до 90%

#### Факторы, провоцирующие ДВС-синдром:

- Врожденные дефекты системы гемостаза.
- Анемия тяжелой степени.
- Заболевания крови.
- Массивная кровопотеря.
- Тромбоцитопения.
- Декомпенсированные болезни печени.
- Преэклампсия, HELLP-синдром.
- Применение дезагрегантов и антикоагулянтов.
- Инфузия плазмозаменителей.

- Аномалии расположения плаценты.
- Опухоли матки.
- Воспалительный (инфекционный) процесс в матке, хориоамнионит.
- Гипотермия.
- Ацидоз.
- Задержка с трансфузией компонентов крови (эритроциты, плазма, тромбоциты, факторы свертывания крови).
- Неэффективный консервативный гемостаз.

### ПАТОГЕНЕЗ ДВС-СИНДРОМА



#### <u>КЛАССИФИКАЦИЯ</u>

NB! В настоящее время ДВС-синдром не классифицируют по стадиям как это было принято ранее, а выделяют «явный» ДВС-синдром или геморрагическая (фибринолитическая) форма и «неявный» ДВС-синдром - без кровотечения (тромботическая форма

#### <u>ЛИАГНОСТИКА</u>

## Для диагностики ДВС-синдрома рекомендуется использовать три основных критерия:

- •клиника критического состояния
- •проявления в виде кровотечения и/или полиорганной недостаточности
- лабораторные показатели

Без соответствующей клиники критического состояния только на основании лабораторных изменений диагноз ДВС-синдрома <u>не</u> выставляется

#### <u>ЛИАГНОСТИКА</u>

#### Жалобы:

 На повышенную кровоточивость при травматизации, кровотечение из мест вколов и других повреждений.

- Носовое кровотечение.
- Образование подкожных гематом
- Наружное кровотечение из родовых пу
- Красное окрашивание мочи

#### Физикальное обследование:

- Оценка объема кровопотери более 1500 мл (30% ОЦК)
- Массивная кровопотеря
- Наружное кровотечение из родовых путей без образования сгустков крови.
- Петехиальная сыпь на кожных покровах и слизистых.

- Нарастающие подкожные гематомы, кровоточивость из мест вколов, операционной раны
- Артериальная гипотония, тахикардия
- Желудочно-кишечное кровотечение
- Гематурия
- Носовое кровотечение
- При неявном ДВС-синдроме (тромботическая форма) помимо признаков основной патологии нарастают проявления полиорганной недостаточности

#### Лабораторная диагностика:

Помимо стандартизированных лабораторных тестов:

- □ количество тромбоцитов
- концентрация фибриногена
- MHO
- АПТВ
- □ ПДФ

Для диагностики ДВС синдрома рекомендуется использовать *тромбоэластометрию* (ТЭГ/ROTEM), обеспечивающую мониторинг

состояния системы гемостаза во время кровотечения

#### ОСНОВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЬ ЕМОСТАЗА ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОШИ

1. Количество тромбоцитов	150-350 тыс в мкл	Критическое снижение - менее 50 тыс. в мкл
2. Концентрация фибриногена	2-4 г/л	Критическое снижение - менее 1 г/л
3. Протромбиновое время МНО -международное нормализованное отношение	= 1,0	Критическое увеличение - более 1,5
4. Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время -АПТВ, АЧТВ	28-32 c	Критическое увеличение - более чем в 1,5-2 раза выше нормы
5. D-димер или другие показатели ПДФФ		Увеличение

6. Тромбоэластография: графическая регистрация гипо-нормо-или гиперкоагуляции

Так же, для диагностики ДВС-синдрома в акушерстве целесообразно использовать шкалу **Japanese Society of Obstetrics and Gynecology**, которая учитывает особенности основного заболевания, клинических симптомов, органной недостаточности и лабораторных исследований

#### Шкала диагностики ДВС-синдрома в акушерстве (Japanese Society of Obstetric and Gynecology, 2014)

Критерии	Баллы
1. Основные заболевания	
А. Отслойка плаценты	
Напряжение матки, гибель плода	5
Напряжение матки, живой плод	4
Подтверждение диагноза отслойки плаценты по данным ультразвукового исследования	4
Б. Эмболия амниотической жидкостью	
Острое легочное сердце	4
Искусственная вентиляция легких	3
Вспомогательная вентиляция	2
Голько ингаляция кислорода	1
В. Послеродовое кровотечение, связанное с ДВС-синдромом	4
Кровь из матки вытекает с низкой свертываемостью	4
Кровотечение более 2000 мл (в течение 24 ч после начала)	3
Кровотечение 1000-2000 мл (в течение 24 ч после начала)	1
Г. Эклампсия	
Приступ эклампсии	4
Д. Тяжелая инфекция	
Пихорадка, сопровождающаяся шоком, бактериемией и наличием в крови эндотокси- нов	4
Продолжительная или перемежающаяся лихорадка	1
Е. Другие основные заболевания	

2. Клинические симптомы	
А. Острая почечная недостаточность	
Анурия (<5 мл/ч)	4
Олигурия (5-20 мл/ч)	3
Б. Острое нарушение дыхания (исключая эмболию амниотической	жидкостью)
Искусственная или вспомогательная вентиляция легких	4
Только ингаляция кислорода	1
В. Органная недостаточность	
Сердце (хрипы или пенистая мокрота и т.д.)	4
Печень (видимая желтуха)	4
Мозг (нарушения сознания, судороги и т.д.)	4
Пищеварительный тракт (некротический энтерит и т.д.)	4
Другая тяжелая органная недостаточность	4
Г. Геморрагический диатез	
Микроскопическая гематурия и мелена, пурпура и т.д.	4
Д. Симптомы шока	
Частота пульса более 100/мин	1
Систолическое артериальное давление <90 мм рт.ст. или снижение на 40% и более	1
Холодный пот	1
Бледность	1

3. Результаты лабораторных исследований	
Уровень ПДФ более 10 лг/мл	1
Количество тромбоцитов менее 100×10°/л	1
Уровень фибриногена менее 1,5 г/л	1
Протромбиновое время более 15 с (или более 50% от нормы)	1
Реакция оседания эритроцитов менее 4 мм/15 мин или менее 15 мм/ч	1
Время кровотечения более 5 мин	11
Другие компоненты гемостаза	
Содержание антитромбина менее 18 мг/дл или снижение до 60%, плазминогена – снижение на 50%	1
Диагноз	
Подозреваемый ДВС	8-12 баллов
Определенный ДВС	≥ 13 баллов

#### <u>ЛИАГНОСТИКА</u>

Даже при отсутствии лаборатории и тромбоэластографа в неотложной ситуации врач анестезиолог-реаниматолог и/или акушер-гинеколог могут получить информацию о наличии гипокоагуляции:

- •Оценить объем кровопотери (более 1500 мл или 30% ОЦК)
- •Оценить диффузную кровоточивость мест вколов, шва, мест установки дренажей, катетеров.
- •Провести пробирочный тест времени свертывания цельной крови по R. I. Lee и P.D. White (более 10 мин.).
- •Оценить нарастание петехиальной сыпи на коже.

При коагулопатическом кровотечении рекомендуется максимально быстро провести хирургический гемостаз одновременно с консервативными мероприятиями по устранению ДВС-синдрома (коагулопатии)

#### Консервативное лечение

- Для коррекции нарушений системы гемостаза рекомендуется максимально рано использовать компоненты крови (СЗП, криопреципитат, тромбоцитарная масса (тромбоконцентрат)
- Для предотвращения лизиса фибрина рекомендуется раннее (еще на догоспитальном этапе) применение транексамовой кислоты







При массивной кровопотере необходимо максимально быстро реализовать «протокол массивной трансфузии» и ввести компоненты крови в соотношении «эритроциты: СЗП: тромбоциты: криопреципитат» в соотношении 1:1:1:1. Соотношение эритроцитов и СЗП также может варьировать от 1,4:1 до 2:1

- Также необходимо соблюдать следующие правила для достижения эффективного консервативного гемостаза:
- Устранение анемии (целевое значение гемоглобина: более 70 г/л).
- Согревание пациентки.
- Устранение гипоксии, ацидоза.
  - Коррекция гипокальциемии (ионизированный Ca2+ должен быть более 1,1-1,3 ммоль/л).

Рекомендуется максимально быстро достичь целевых параметров при реализации хирургического и консервативного:

- Отсутствует кровотечение любой локализации и любой интенсивности
- Гемоглобин в пределах 70-90 г/л
- Фибриноген более 2,0 г/л. 25
- Тромбоциты более 50\*109 / л.
- МНО, АПТВ менее 1,5 от нормы.
- Нормо- или гиперкоагуляция на ТЭГ.

#### **JEYEHIJE**

- У пациенток с ДВС-синдромом в связи с выраженными нарушениями системы гемостаза возможно проведение только общей анестезии.
- Нейроаксиальные методы анестезии противопоказаны при нарушениях свертывания крови в сторону гипокоагуляции (АПТВ более чем в 1,5 раза от нормы, МНО более 1,5), тромбоцитопении - менее 75\*109, приобретенных или врождённых коагулопатиях.
- При тромбоцитопении от 75 до 100\*109 и при отсутствии гипокоагуляции возможно применение только спинальной анестезии (малый диаметр игл -27-29G)
- Показания к общей анестезии и ИВЛ у пациенток с ДВСсиндромом возникают и при критических состояниях независимо от степени повреждения системы гемостаза (геморрагический, септический шок, ОРДС, острая церебральная, почечная, печеночная недостаточность и т.д.).

#### СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

