

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ**

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ



Презентацию выполнила:
Студентка 2 курса, 293 группы
Специальность «Сестринское дело»
Козицина Кристина Сергеевна
Руководителей: Кирюхина Е.А.

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?

- ВИЧ ИНФЕКЦИЯ - это заболевание вызванное вирусом иммунодефицита человека, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к ее медленному и неуклонному разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).



ИСТОРИЯ ВИЧ


- История ВИЧ-инфекции
1978 год – первое обнаружение симптомов СПИДа.
- 1983 год – открытие вируса иммунодефицита человека.
- 1987 год – зарегистрирован первый случай ВИЧ инфекции в России.
- 1991 год – от СПИДа умер Фредди Меркьюри, лидер группы Квин.
- История ВИЧ-инфекции
1995 год – в России зарегистрировано 1200 человек с ВИЧ инфекцией.
- 1996 год – ВИЧ попадает в среду наркоманов, число больных стремительно растет (за год в 6 раз)
- 2001 год – в России объявлено начало эпидемии, зарегистрировано более 150000 случаев ВИЧ инфекции. 2009 год – в России ежедневно заражаются ВИЧ инфекцией более 100 человек.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ



Кровь

Главным образом при переливании или использовании не одноразовых инструментов. Сегодня вся донорская кровь и органы обязательно проверяются на ВИЧ, гепатиты и т. д. Используются разовые медицинские и косметологические инструменты.



Половым Путем

При незащищённом (без презерватива) половом акте с инфицированным партнером; Вагинальные выделения и сперму. В этих жидкостях количество вируса меньше, чем в крови. Поэтому в парах, где один зараженный а второй – нет, не всегда передаётся болезнь



От матери к ребёнку

Грудное молоко. У взрослого человека ферменты в слюне и желудке уничтожают вирус. Но у младенцев таких ферментов нет, поэтому ВИЧ-позитивным мамам нельзя кормить грудью ребёнка.

Меры профилактики ВИЧ-инфекции

Основные способы:

- ❖ Отказываться от незащищённых половых контактов с малознакомыми партнёрами.
- ❖ Использовать стерильные, одноразовые медицинские расходные материалы – иглы, шприцы.
- ❖ Требовать дезинфекции инструментов и приборов во время косметологических процедур, связанных с риском занесения инфекции, татуажа, пирсинга.
- ❖ Использовать индивидуальные средства личной гигиены и утилизировать (дезинфицировать) те предметы, которыми хотя бы однократно воспользовался другой человек.
- ❖ Избегать контакта с чужими биологическими материалами вне сферы профессиональной деятельности. При необходимости использовать защитные, дезинфицирующие, бактерицидные средства.




Признаки ВИЧ

К наиболее распространенным и типичным признакам ВИЧ относятся:

- ❖ потеря веса, снижение мышечной массы, а более на поздних этапах даже дистрофия;
- ❖ постоянные простудные заболевания;
- ❖ сильные головные боли;
- ❖ затрудненное дыхание;
- ❖ боли в области грудной клетки;
- ❖ ухудшение зрения;
- ❖ заболевание вирусным гепатитом;
- ❖ депрессивные состояния.





Не гадай!
Узнай свой ВИЧ-статус

- Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства. Кроме того, существует возможность анонимного обследования с предварительной (до тестирования) и последующей (по получении результата) консультацией врача.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ**

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ



Презентацию выполнила:
Студентка 2 курса, 293 группы
Специальность «Сестринское дело»
Козицина Кристина Сергеевна
Руководителей: Кирюхина Е.А.