

ОГАПОУ «Валуйский медицинский колледж» Мастер-класс «кормление пациента»

Выполнила:

Студентка группы


ЛД-11

Лаппа Елена

Руководитель: Томарева И.Н.

Преподаватель, зав. мастерской «медицинский и социальный уход»

ПАССИВНОЕ ПИТАНИЕ



АЛГОРИТМ И ТЕХНИКА КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ИЗ ЛОЖКИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Подготовка к кормлению

- Уточнить у пациента любимые блюда и согласовать меню с лечащим врачом или диетологом.
- Предупредить пациента за 15 мин о приеме пищи и получить его согласие.
- Проветрить помещение, освободить место на тумбочке и протереть ее или придвинуть прикроватный столик, протереть его.
- Помочь пациенту занять положение Фаулера.
- Помочь пациенту вымыть руки и прикрыть салфеткой его грудь.
- Вымыть руки.

Кормление тяжелобольного пациента

Кормление тяжелобольного в постели:



• Пища (температура горячих блюд - 50°С).

- Кормить медленно: называть каждое блюдо, предлагаемое пациенту; наполнить на 2/3 ложку мягкой пищей; коснуться ложкой нижней губы, чтобы пациент открыл рот; прикоснуться ложкой к языку, оставив пищу в полости рта; извлечь пустую ложку; дать время прожевать и проглотить пищу.
- Предложить питье после нескольких ложек мягкой пищи; приложить "носик" поильника к нижней губе; вливать питье небольшими порциями.
- Вытирать (при необходимости) губы пациента салфеткой.
- Предложить пациенту прополоскать рот водой из поильника



после приема пищи.



Обязательно нужно сообщить
пациенту чем его будут кормить



Питание и кормление пациентов



Кормление тяжелобольных.

- ❖ Тяжелобольным пища привозится в палату в теплом виде на специальных передвижных столиках с подогревом.
- ❖ Перед приемом пищи должны быть закончены все лечебные процедуры.
- ❖ Одним больным нужно только помочь сесть, грудь прикрыть клеенкой или фартуком, другим – придвинуть прикроватный столик и придать полусидящее положение, приподняв подголовник, третьих нужно кормить.
- ❖ При кормлении тяжелобольного медицинская сестра левой рукой немного приподнимает голову больного, а правой подносит ему ложку или специальный поильник с пищей ко рту.
- ❖ В том случае, когда больной не может поднять голову, чтобы он не захлебнулся, можно пользоваться следующим способом кормления. На носик поильника надевают прозрачную трубку (8–10 мм диаметром и 25 см длиной), которую вводят в рот. После введения трубки в рот ее снимают пальцами, затем слегка поднимают и наклоняют поильник, одновременно разжимая пальцы на несколько секунд, чтобы в рот больного попала пища в объеме одного глотка (прозрачность трубки позволяет контролировать количество пропущенной пищи).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!