


# Назначить нитроглицерин

- в/в (10 мг нитроглицерина разводят в 100 мл физ. раствора) с начальной скоростью 6-8 капель в минуту до 30 в мин под контролем АД
- сублингвально 0,5 мг
- аэрозоль 0,4 мг (1 доза)



# Повторно назначить нитраты

- Повторно используют нитраты через 3-5 мин при неэффективности и при отсутствии противопоказаний под контролем АД

# Назначить наркотические анальгетики

- При интенсивном длительном болевом синдроме в грудной клетке возможно применение морфина 1% 1,0 мл (в/в или п/к)\*



\* Клинический протокол №5 диагностики и лечения «Острый коронарный синдром» от «23» июня 2016 года

# Назначить первый антиагрегантный препарат

- Ацетилсалициловая кислота в нагрузочной дозе 150–300 мг\*



\*Клинический протокол №5 диагностики и лечения «Острый коронарный синдром» от «23» июня 2016 года

# Назначить второй антиагрегантный препарат\*

- Тикагрелор 180 мг или при отсутствии
- Клопидогрел 300 мг или 600 мг



\*Клинический протокол №5 диагностики и лечения «Острый коронарный синдром» от «23» июня 2016 года

# Назначить антикоагулянтную терапию\*

- Фондапаринукс 2,5 мг/сут п/к
- Низкомолекулярный гепарин  
(эноксапарин 0,2 или 0,4 мл в/в болюс или п/к)
- НФГ 5000 МЕ только в/в



\*Клинический протокол №5 диагностики и лечения «Острый коронарный синдром» от «23» июня 2016 года