


Движение. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос.




Выполнил:
учащийся 11А класса
МБОУ Школы №16
Шестаков Данил.

Центральная симметрия

Движение пространства – это отображение пространства на себя, при котором любые две точки A и B переходят (отображаются) в какие-то точки $A_1 B_1$ так, что $A_1B_1 = AB$.

Центральная симметрия – отображение пространства на себя, при котором любая точка M переходит в симметричную ей точку M_1 относительно данного центра O .



Центральная симметрия

В случае **центральной симметрии** относительно начала координат все координаты точки меняют знак на противоположный. Рассмотрим несколько примеров:


$$A (-8; 5; 27) \rightarrow A_1 (8; -5; -27)$$

$$B (4; 0; -9) \rightarrow B_1 (-4; 0; 9)$$

$$C (2; -15; 0) \rightarrow C_1 (-2; 15; 0)$$

Осевая симметрия

Осевая симметрия – такое отображение пространства на себя, при котором любая точка M переходит в симметричную ей точку M_1 относительно оси a .



Осевая симметрия

В случае **осевой симметрии** относительно координатной оси, все координаты, кроме той, которая соответствует данной оси, меняют свой знак на противоположный. Рассмотрим несколько примеров:

1) для оси Ox :

$$A (-8; 5; 27) \rightarrow A_1 (-8; -5; -27)$$

$$B (4; 0; -9) \rightarrow B_1 (4; 0; 9)$$

$$C (2; -15; 0) \rightarrow C_1 (2; 15; 0)$$

2) для оси Oy :

$$A (-8; 5; 27) \rightarrow A_1 (8; 5; -27)$$

$$B (4; 0; -9) \rightarrow B_1 (-4; 0; 9)$$

$$C (2; -15; 0) \rightarrow C_1 (-2; -15; 0)$$

3) для оси Oz :


$$A (-8; 5; 27) \rightarrow A_1 (8; -5; 27)$$

$$B (4; 0; -9) \rightarrow B_1 (-4; 0; -9)$$

$$C (2; -15; 0) \rightarrow C_1 (-2; 15; 0)$$

Зеркальная симметрия

Зеркальная симметрия (симметрия относительно плоскости α) – такое отображение пространства на себя, при котором любая точка M переходит в симметричную ей относительно плоскости α точку M_1 .



Зеркальная симметрия

В случае зеркальной симметрии относительно координатной плоскости, меняется только та координата, которая не принадлежит данной плоскости. Рассмотрим несколько примеров:

1) для плоскости xOy :

$$A (-8; 5; 27) \rightarrow A_1 (-8; 5; -27)$$

$$B (4; 0; -9) \rightarrow B_1 (4; 0; 9)$$

$$C (2; -15; 0) \rightarrow C_1 (2; -15; 0)$$

2) для плоскости yOz :

$$A (-8; 5; 27) \rightarrow A_1 (8; 5; 27)$$

$$B (4; 0; -9) \rightarrow B_1 (-4; 0; -9)$$

$$C (2; -15; 0) \rightarrow C_1 (-2; -15; 0)$$

3) для плоскости xOz :


$$A (-8; 5; 27) \rightarrow A_1 (-8; -5; 27)$$

$$B (4; 0; -9) \rightarrow B_1 (4; 0; -9)$$

$$C (2; -15; 0) \rightarrow C_1 (2; 15; 0)$$

Параллельный перенос

Параллельным переносом на вектор p называется отображение пространства на себя, при котором любая точка M переходит в такую точку M_1 , что вектор MM_1 равен вектору p .



Каждая вершина пирамиды перенесена в одном и том же направлении и в одном и том же расстоянии