

Диспепсический синдром при заболеваниях печени

определение

- ◆ **Диспепсия** – нарушение пищеварения, обусловленное причинами органического и функционального характера. Симптомами диспепсии являются боли в верхней части живота неясной локализации, тошнота, изжога, чувство переполненности желудка, быстрое насыщение после еды и др.

жалобы

Диспепсические жалобы:

1. снижение аппетита
2. горечь во рту
3. отрыжка
4. тошнота
5. рвота
6. запоры или поносы

ЭТИОЛОГИЯ

- ◆ Диспепсический синдром наблюдается при многих заболеваниях печени, особенно при острых гепатитах, циррозе печени, холелитиазе..Анорексия, тошнота, тяжесть в эпигастрии, отрыжка, упорное вздутие, живота, запоры могут быть обусловлены печеночно-клеточной недостаточностью и портальной гипертензией. Похудание достигающее иногда до кахексии, возможно при циррозе печени и опухолях.

патогенез

1. Горечь во рту.

Нарушение синтеза желчных кислот при гепатитах, циррозе, замедленное или слишком быстрое выведение порции желчи в кишечник при дискинезии желчевыводящих путей и холецистите, камнях в проходах) вызывает общее нарушение переработки пищи. Горечь чаще беспокоит по утрам или после приема острой, жирной и жареной пищи. Из-за того, что нарушается нормальное функционирование печени, ухудшается моторика в желчевыводящих путях, и возникают застойные процессы. Когда переполняется желчный пузырь, он стремительно отбрасывает желчь. После такого сокращения 12-перстной кишки и желудка, желчь попадает в пищевод и ротовую полость.

◆ 2) Тошнота .

- ◆ возникает вследствие раздражений блуждающего и чревного нервов, передающихся в рвотный центр с последующей эфферентной патологической импульсацией, вызывающей дискинезию верхних отделов пищеварительного тракта. При тошноте тонус желудка снижен, перистальтика или отсутствует или сильно замедлена. В то же время тонус двенадцатиперстной кишки и проксимальных отделов тощей кишки повышается, происходят дуоденогастральные рефлюксы.

- ◆ 3.отрыжка.
- ◆ при циррозе печени определяется *рефлюкс-эзофагит*. Его основными симптомами являются отрыжка воздухом, желудочным содержимым, изжога, чувство жжения за грудиной. Рефлюкс-эзофагит обусловлен повышением внутрибрюшного давления за счет асцита и забросом содержимого из желудка в пищевод.

- ◆ 4 .анорексия, ощущение полноты в желудке
- ◆ при циррозе печени развиваются симптомы *хронического гастрита* (обычно поверхностный и гипертрофический). Он проявляется тупыми болями в эпигастрии, появляющимися после еды, тошнотой, ощущением полноты и тяжести в подложечной области, отрыжкой, снижением аппетита.
- ◆

◆ 5.диарея

- ◆ Поражение поджелудочной железы проявляется симптомами *хронического панкреатита* с внешнесекреторной недостаточностью, поражение кишечника - симптомами *хронического энтерита* с нарушением всасывательной способности (синдром мальабсорбции).

Диспепсический синдром наиболее выражен при циррозе печени (внутрипеченочном блоке), а также усиливается после приема пищи.