

Дарлингтония калифорнийская



- Дарлингтония калифорнийская – редкий гость в домах любителей комнатных цветов, потому что это довольно привередливое растение и для него нужно создавать особые условия.



- Дарлингтония калифорнийская (*Darlingtonia californica*) - многолетнее травянистое насекомоядное растение семейства Саррацениевые (*Sarraceniaceae*) с корневищем и розеткой листьев-ловушек.



- Это эффектное растение является единственным представителем рода *Darlingtonia* и обладает чрезвычайно необычным внешним видом, состоит в близком родстве с саррацениями и гелиамфорой.



- Распространена дарлингтония в восточных штатах США от северной Калифорнии до Юго-Западного Орегона и Сиэтла. Растение произрастает на бедных почвах, но богатых магнием и железом, зачастую поблизости от быстротекущих холодных ручьев.



- Красноватая окраска частей насекомоядных растений часто вызвана наличием пигмента антоцианина. Форма дарлингтонии калифорнийской, лишенная антоцианина, была впервые обнаружена в единственном местобитании в 1997 году, и названа Отелло (Othello



- Эта форма представляет интерес для садоводства, но к сожалению, она также привлекательна для несанкционированных сборщиков растений. Обнаруженные необычные растения были вручную опылены, а затем у них были собраны семена с надеждой, что выращенные из них растения позволят удовлетворить спрос



- Лилия-кобра (Cobra Lily) или растение-кобра (Cobra Plant) - такое популярное название получила дарлингтония благодаря выростам, напоминающим красные перекрученные языки змеи, и действительно, листья напоминают приготовившуюся к нападению кобру с распущенным капюшоном. В благоприятных для жизни условиях капюшон вырастает до 60 см и более.



- Растения привлекают добычу ко входу в ловчий аппарат с помощью нектара, выделяющего вдоль "языков" кувшина.



- Свет проходящий в окошко, - истончения в стенке капюшона кувшина сбивает добычу, и она падает внутрь кувшина, где и тонет. Бактерии и другие микроорганизмы переваривают добычу и выделяют питательные вещества в виде жидкости.



- Цветки дарлингтонии желтоватые или красно-коричневые, которые развиваются весной, затем растения формируют шиповатые семена. Растения-кувшины высотой 10-13 см развиваются на третий год.



- В культуре поддерживается единственный вид - дарлингтония калифорнийская. В диком состоянии эти растения могут достигать 90 см в высоту, но в условиях культивирования достигают только до 45 см.



- Теплый или умеренный климат с холодными летними ночами; солнечное местоположение или частичное притенение (важнее более в теплых условиях произрастания); прохладная влажная почва. Температура: летом 18-20 градусов, зимой 16-18, выдерживает зимнее понижение температуры до -10 градусов. Полив: летом - обильный, зимой умеренный и только мягкой водой. Влажность высокая, но растение лучше не опрыскивать.









