



# **Місцеве застосування тіотриазоліну в комплексній терапії доброякісних процесів матки**

**В.В. Сімрок**  
ДЗ «Луганський державний  
медичний університет»

В останні роки результати експериментальних та клінічних досліджень свідчать, що виникнення доброякісного процесу в матці тісно пов'язано з гормональними порушеннями в організмі жінки. Непрямим свідченням цього може бути виявлення патологічних змін в органах-мішенях, зокрема, ендометрії.

Особливо важливим є безпосередній вплив на ендометрій. З цією метою нами застосований вітчизняний препарат – **тіотриазолін**.

# Тіотриазолін:

**При проявляє наступні дії:**

- протиішемічна
- антиоксидатна
- мембраностабілізуюча
- імуномодулювальну

Підвищує дію базисної терапії

Протизапальна дія

Запобігає розвитку ускладнень

Скорочує термін лікування

Прискорює загоєння ран і виразок

# Під спостереженням знаходилися 127 жінок з ДПМ – поєднанням міоми й ендометріозу

Основна група 65 жінок, крім основного лікування, одержували препарат тіотризолін **“Далмаксін”** у формі вагінальних супозиторіїв, двічі на добу, протягом 28 днів

Група порівняння 62 жінки, які одержували комплексну протизапальну і гормональну терапію основного захворювання


# Результати цитологічного дослідження стану ендометрія у хворих з ДПМ на тлі місцевого застосування Далмаксину

| Стан ендометрія                 | Кількість хворих за групами  |                 |                  |                 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                 | Основна, n=65<br>(Далмаксін) |                 | Порівняння, n=63 |                 |
|                                 | До лікування                 | Після лікування | До лікування     | Після лікування |
| Проста GE                       | 39                           | 5               | 38               | 8               |
| Комплексна Ge<br>(аденоматозна) | 8                            | 1               | 7                | 2               |
| Поліпи                          | 6                            | -               | 5                | 2               |
| Атипова Ge                      | 2                            | -               | 3                | -               |
| Атрофія ендометрія              | 3                            | 13              | 2                | 6               |
| Гіперплазія+запальні зміни      | 41                           | 1               | 39               | 10              |
| Запальні зміни                  | 7                            | -               | 7                | 5               |

# Основні клінічні показники хворих з ДПМ та після лікування Далмаксіном

| Основні клінічні показники              | Кількість хворих за групами  |                 |                   |                 |
|---|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   | Основна, n=65<br>(Далмаксін) |                 | Порівняння , n=63 |                 |
|   | До лікування                 | Після лікування | До лікування      | Після лікування |
| Тазовий біль (наявність)                | 54                           | 15              | 55                | 29              |
| Реперкусивний біль (наявність)          | 45                           | 11              | 41                | 19              |
| Інфільтрація м'яких тканин              | 26                           | 10              | 24                | 16              |
| Стан бічних склепінь піхви (скорочення) | 21                           | 9               | 22                | 15              |
| Рухливість матки (обмежена)             | 21                           | 12              | 21                | 15              |
| Чіткість контурів матки (визначені)     | 28                           | 41              | 27                | 34              |

# Динаміка основних клінічних показників



# Зникнення потовщення крижово-маткових зв'язок відзначено:





# Об'єм матки в процесі лікування

| Клінічний показник           | Кількість хворих за групами |                 |                  |                 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                              | Основна, n=65 (Далмаксін)   |                 | Порівняння, n=63 |                 |
|                              | До лікування                | Після лікування | До лікування     | Після лікування |
| Об'єм матки, см <sup>3</sup> | 273±41                      | 112±27          | 271±37           | 176±24          |

# ВИСНОВКИ

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать **про високу ефективність місцевого застосування тіотриазоліну** та необхідність використання **Далмаксіну** в комплексній терапії ДПМ, а також інших гінекологічних захворювань.

У процесі лікування у жінок **основної групи відзначено суттєву зворотню динаміку проявів, які характеризують ДПМ.** Комплексна терапія є ефективною щодо усунення гіперпластичного стану ендометрія, підвищуючи ефективність гормонотерапії.