



# **Місцеве застосування тіотриазоліну в комплексній терапії доброякісних процесів матки**

**В.В. Сімрок**  
ДЗ «Луганський державний  
медичний університет»

В останні роки результати експериментальних та клінічних досліджень свідчать, що виникнення доброякісного процесу в матці тісно пов'язано з гормональними порушеннями в організмі жінки. Непрямим свідченням цього може бути виявлення патологічних змін в органах-мішенях, зокрема, ендометрії.

Особливо важливим є безпосередній вплив на ендометрій. З цією метою нами застосований вітчизняний препарат – **тіотриазолін**.

# Тіотриазолін:

**При проявляє наступні дії:**

- протиішемична
- антиоксидатна
- мембраностабілізуюча
- імуномодулювальну

Підвищує дію базисної терапії

Протизапальна дія

Запобігає розвитку ускладнень

Скорочує термін лікування

Прискорює загоєння ран і виразок

# Під спостереженням знаходилися 127 жінок з ДПМ – поєднанням міоми й ендометріозу

Основна група 65 жінок, крім основного лікування, одержували препарат тіотризолін **“Далмаксін”** у формі вагінальних супозиторіїв, двічі на добу, протягом 28 днів

Група порівняння 62 жінки, які одержували комплексну протизапальну і гормональну терапію основного захворювання


# Результати цитологічного дослідження стану ендометрія у хворих з ДПМ на тлі місцевого застосування Далмаксину

Стан ендометрія	Кількість хворих за групами			
	Основна, n=65 (Далмаксін)		Порівняння, n=63	
	До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
Проста GE	39	5	38	8
Комплексна Ge (аденоматозна)	8	1	7	2
Поліпи	6	-	5	2
Атипова Ge	2	-	3	-
Атрофія ендометрія	3	13	2	6
Гіперплазія+запальні зміни	41	1	39	10
Запальні зміни	7	-	7	5

# Основні клінічні показники хворих з ДПМ та після лікування Далмаксіном

Основні клінічні показники	Кількість хворих за групами			
	Основна, n=65 (Далмаксін)		Порівняння , n=63	
	До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
Тазовий біль (наявність)	54	15	55	29
Реперкусивний біль (наявність)	45	11	41	19
Інфільтрація м'яких тканин	26	10	24	16
Стан бічних склепінь піхви (скорочення)	21	9	22	15
Рухливість матки (обмежена)	21	12	21	15
Чіткість контурів матки (визначені)	28	41	27	34

# Динаміка основних клінічних показників



# Зникнення потовщення крижово-маткових зв'язок відзначено:





# Об'єм матки в процесі лікування

Клінічний показник	Кількість хворих за групами			
	Основна, n=65 (Далмаксін)		Порівняння, n=63	
	До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
Об'єм матки, см <sup>3</sup>	273±41	112±27	271±37	176±24

# ВИСНОВКИ

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать **про високу ефективність місцевого застосування тіотриазоліну** та необхідність використання **Далмаксіну** в комплексній терапії ДПМ, а також інших гінекологічних захворювань.

У процесі лікування у жінок **основної групи відзначено суттєву зворотню динаміку проявів, які характеризують ДПМ.** Комплексна терапія є ефективною щодо усунення гіперпластичного стану ендометрія, підвищуючи ефективність гормонотерапії.